

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018

A U T O R I

Prof.univ.dr. Vasile Câmpian	Conf.univ.dr. Daniela Inoan
Prof.univ.dr. Iuliu Crivei	Conf.univ.dr. Adela Carmen Novac
Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea	Conf.univ.dr. Ioan Radu Peter
Prof.univ.dr. Ioan Gavrea	Conf.univ.dr. Vasile Pop
Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan	Conf.univ.dr. Teodor Potra
Prof.univ.dr. Nicolaie Lung	Conf.univ.dr. Mircea Dan Rus
Prof.univ.dr. Vasile Miheșan	Conf.univ.dr. Silvia Toader
Prof.univ.dr. Alexandru Mitrea	Lect.univ.dr. Marius Birou
Prof.univ.dr. Viorica Mureșan	Lect.univ.dr. Adela Capătă
Prof.univ.dr. Dorian Popa	Lect.univ.dr. Luminița Ioana Cotîrlă
Prof.univ.dr. Ioan Rașa	Lect.univ.dr. Daria Dumitraș
Prof.univ.dr. Daniela Roșca	Lect.univ.dr. Mircia Gurzău
Prof.univ.dr. Alina Sîntămărian	Lect.univ.dr. Adrian Holhoș
Prof.univ.dr. Gheorghe Toader	Lect.univ.dr. Vasile Ile
Prof.univ.dr. Neculae Vornicescu	Lect.univ.dr. Tania Angelica Lazăr
Conf.univ.dr. Lucia Blaga	Lect.univ.dr. Daniela Marian
Conf.univ.dr. Maria Câmpian	Lect.univ.dr. Rozica Moga
Conf.univ.dr. Alexandra Ciupa	Lect.univ.dr. Constantin Cosmin Todea
Conf.univ.dr. Dalia Cîmpean	Lect.univ.dr. Floare Ileana Tomuța
Conf.univ.dr. Eugenia Duca	Asist.univ.dr. Alina-Ramona Baias
Conf.univ.dr. Ovidiu Furdui	Asist.univ.dr. Mihaela Bercheșan
	Asist.univ.dr. Liana Timboș

U. T. PRESS
Cluj-Napoca 2018

ISBN 978-606-737-281-6

Coordonator

Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan

Referenți: Prof.univ.dr. Ioan Gavrea
Prof.univ.dr. Alexandru Mitrea
Conf.univ.dr. Vasile Pop
Prof.univ.dr. Dorian Popa
Prof.univ.dr. Neculae Vornicescu

Prefață

Culegerea de probleme *Teste grilă de matematică* continuă tradiția Universității Tehnice din Cluj-Napoca de a selecta viitorii studenți printr-un concurs de admitere pe baza subiectelor sub formă de grilă. Prezenta culegere a fost elaborată cu scopul de a contribui la o mai bună pregătire a candidaților la admitere și de a-i familiariza cu noua tipologie a subiectelor.

Structurată pe patru capitole: Algebră, Analiză matematică, Geometrie analitică și Trigonometrie, culegerea contribuie la recapitularea materiei din programa pentru bacalaureat.

Parcurgând toate gradele de dificultate, de la probleme foarte simple care necesită un minim de cunoștințe, până la probleme a căror rezolvare presupune cunoștințe temeinice, lucrarea este utilă tuturor categoriilor de elevi care se pregătesc pentru un examen de matematică.

Fiecare problemă propusă este urmată de cinci răspunsuri dintre care numai unul este corect. La sfârșit se dau răspunsurile corecte.

Testul care se va da la concursul de admitere va conține probleme cu grade diferite de dificultate, alcătuite după modelul celor din culegere.

Autorii

* * *

1	Algebră	1
2	Analiză matematică	23
3	Geometrie analitică	47
4	Trigonometrie	51
5	Exemplu Test Admitere	59
6	Simulare admitere (13 mai 2017)	62
7	Admitere (16 iulie 2017)	65
8	Răspunsuri	73
9	Indicații	77

* * *

- 1 Mulțimea soluțiilor ecuației $z^2 = 3 - 4i$, $z \in \mathbb{C}$, este:
 A $\{1, 2\}$ B $\{i, 2 - i\}$ C $\{2 - i, -2 + i\}$ D $\{3, -2 + i\}$ E $\{2 - i, 3 + i\}$.
- 2 Soluția ecuației $x(1 - \lg 5) = \lg(2^x + x - 1)$ este:
 A $x = \frac{1}{5}$ B $x = -1$ C $x = 1$ D $x = \frac{1}{2}$ E $x = -5$
- 3 Mulțimea soluțiilor ecuației $\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & 2x & 3 \\ -1 & -2 & x \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} x & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 3 = 0$ este:
 A $\{-1\}$ B $\{-1, 1, -i, i\}$ C $\{-1, 0, 1 - i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}\}$
 D $\{-1, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\}$ E $\{-1, \frac{1-i}{2}, \frac{1+i}{2}\}$
- 4 Mulțimea soluțiilor reale ale sistemului: $\begin{cases} 2(x-1) \geq 4(x+1) \\ x^2 + 4x > 0 \end{cases}$ este:
 A $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ B $(-\infty, -4) \cup (2, \infty)$ C $(-\infty, -4)$ D $(2, \infty)$ E $(-1, 1)$.
- 5 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (m+1)x^2 + 2(m+2)x + m+3$, intersectează axa Ox în două puncte distincte este:
 A \mathbb{R} B \emptyset C $\{-3\}$ D $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ E $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Fie $f \in \mathbb{R}[X]$, $f = X^{100} + aX^{99} + bX + 1$.
- 6 Valorile coeficienților a și b pentru care $x = 1$ este rădăcină dublă sunt:
 A $a = -1; b = -1$ B $a = 2; b = -4$ C $a = -2; b = 0$ D $a = 0; b = -2$ E $a = 4; b = -2$
- 7 Valorile coeficienților a și b pentru care f se divide cu $X^2 + X + 1$ sunt:
 A $a = 1; b = 1$ B $a = -1; b = -1$ C $a = -1; b = 0$ D $a = 1; b = -1$ E $a = 0; b = -1$
- 8 Valorile coeficienților a și b pentru care restul împărțirii polinomului f la $X^3 - X^2 - X + 1$ este $X^2 + X + 1$ sunt:
 A $a = 2; b = -1$ B $a = 0; b = 1$ C $a = -1; b = 2$ D $a = -1; b = 1$ E $a = 1; b = 0$

Se dă funcția $f(x) = mx^2 + 2(m+1)x + m^2 - 1$, unde $m \neq 0$ este parametru real.

9

Pentru ce valori ale lui m , $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$?

- A $m \in (0, +\infty)$ B $m \in (1 + \sqrt{2}, +\infty)$ C $m \in (0, 1 + \sqrt{2})$
 D $m \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ E $m \in (-1, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$

10

Pentru ce valori ale lui m , $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$?

- A $m \in (-\infty, 0)$ B $m \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ C $m \in (-1, 1 - \sqrt{2})$
 D $m \in (-\infty, 1 - \sqrt{2})$ E $m \in (-1, 1 - \sqrt{2}) \cup (0, \infty)$

11

Pentru ce valori ale lui m funcția admite rădăcină dublă?

- A $m \in \{\pm 1\}$ B $m \in \{1, \pm\sqrt{2}\}$ C $m \in \{\pm\sqrt{2}\}$
 D $m \in \{-1, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$ E $m \in \{0, 1, \pm\sqrt{2}\}$

Se consideră ecuația $2x^2 - 2mx + m^2 - 2m = 0$, unde $m \in \mathbb{R}$, iar x_1 și x_2 sunt rădăcinile reale ale ecuației.

12

Suma rădăcinilor $x_1 + x_2$ aparține intervalului

- A $[0, 1]$ B $[0, 4]$ C \mathbb{R} D $[0, 2]$ E $[-1, 4]$

13

Suma pătratelor rădăcinilor $x_1^2 + x_2^2$ aparține intervalului

- A $[0, 4]$ B $[-2, 4]$ C $[0, 8]$ D \mathbb{R} E $[0, 3]$

14

Produsul rădăcinilor $x_1 x_2$ aparține intervalului

- A $[-2, 0]$ B $[0, 4]$ C $[-\frac{1}{2}, 4]$ D \mathbb{R} E $(0, 2)$

Fie funcțiile $f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = mx^2 + 2(m-1)x + m - 1$, $m \in \mathbb{R}$.

15

Mulțimea valorilor parametrului m pentru care ecuația $f_m(x) = 0$ are cel puțin o rădăcină reală este:

- A $(-\infty, 1)$ B $(-\infty, 1]$ C \mathbb{R} D alt răspuns E $[0, \infty)$

16

Vârfurile parabolilor asociate funcțiilor f_m , $m \neq 0$ se găsesc pe:

- A parabola $y = x^2 + 2$ B dreapta $x + 2y = 0$ C dreapta $y = x$ D dreapta $y = -x$
 E o paralelă la Ox .

Fie funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $g(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{dacă } x \leq 0 \\ 3x + 2, & \text{dacă } x > 0. \end{cases}$

17

Soluția inecuației $g(x) \geq 0$ este:

- A $[-2, \infty)$ B $[-2, 0]$ C $[-\frac{2}{3}, \infty)$ D $[-2, -\frac{2}{3}]$ E $[0, \infty)$

18

Funcția $g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este dată de:

- A $g^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{3}, & \text{dacă } x \geq 2 \\ \frac{x-2}{4}, & \text{dacă } x < 2 \end{cases}$ B $g^{-1}(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$
 C $g^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{3}, & \text{dacă } x \leq 2 \\ 2x - 3, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$ D $g^{-1}(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x+2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$
 E $g^{-1}(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x+2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$

19

Se dau funcțiile $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \geq 0 \\ 5x + 1, & x < 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq -2 \\ 2x - 1, & x > -2 \end{cases}.$$

Funcția $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h = f \circ g$ este definită prin:

$$\begin{aligned} \text{[A]} \quad h(x) &= \begin{cases} 1 - x^4, & x \leq -2 \\ 4x(1 - x), & x > -2 \end{cases} & \text{[B]} \quad h(x) &= \begin{cases} 1 - x^4, & x \leq -2 \\ 4x(1 - x), & x \geq \frac{1}{2} \\ 2(5x - 2), & -2 < x < \frac{1}{2} \end{cases} \\ \text{[C]} \quad h(x) &= \begin{cases} 4x(1 - x), & x \leq \frac{1}{2} \\ 2(5x - 2), & x > \frac{1}{2} \end{cases} & \text{[D]} \quad h(x) &= \begin{cases} 1 - x^4, & x < -2 \\ 2(5x - 2), & x > \frac{1}{2} \\ 4x(1 - x), & -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ \text{[E]} \quad h(x) &= \begin{cases} 2(5x - 2), & x \geq -2 \\ 1 - x^4, & x < -2 \end{cases} \end{aligned}$$

20

Fie $P \in \mathbb{R}[X]$, $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, un polinom cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 distincte două câte două. Pentru $Q \in \mathbb{R}[X]$ polinom de grad 1,suma $\frac{Q(x_1)}{P'(x_1)} + \frac{Q(x_2)}{P'(x_2)} + \frac{Q(x_3)}{P'(x_3)}$ este egală cu

$$\text{[A]} \quad x_1 + x_2 + x_3 \quad \text{[B]} \quad x_1 x_2 x_3 \quad \text{[C]} \quad P(x_1 + x_2 + x_3) \quad \text{[D]} \quad 1 \quad \text{[E]} \quad 0$$

21

Să se găsească numărul complex z dacă $|z| - z = 1 + 2i$.

$$\text{[A]} \quad z = \frac{3}{2} - 2i; \quad \text{[B]} \quad z = \frac{3}{2} + 2i; \quad \text{[C]} \quad z = \frac{1}{2} - 3i; \quad \text{[D]} \quad z = \frac{1}{2} + 3i; \quad \text{[E]} \quad z = -\frac{1}{2} + 3i.$$

22

Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^2 + z - \bar{z}$.Soluțiile ecuației $f(z) = 0$ sunt:

$$\text{[A]} \quad \{0, 1 + 2i, 1 - 2i\} \quad \text{[B]} \quad \{0, 1 + i, 1 - i\} \quad \text{[C]} \quad \{0, i, -i\} \quad \text{[D]} \quad \{0, 2 + i, 2 - i\} \quad \text{[E]} \quad \{0, -1 + i, -1 - i\}$$

23

Se consideră ecuația $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2(3^{x-1} + 1)$. Mulțimea soluțiilor ecuației are:

$$\begin{aligned} \text{[A]} & \text{ un element} & \text{[B]} & \text{ două elemente} & \text{[C]} & \text{ nici un element} & \text{[D]} & \text{ trei elemente} \\ \text{[E]} & \text{ o infinitate de elemente} \end{aligned}$$

24

Soluția S a sistemului $\begin{cases} 2^x 5^y = 250 \\ 2^y 5^x = 40 \end{cases}$ este:

$$\begin{aligned} \text{[A]} \quad S &= \emptyset & \text{[B]} \quad S &= \{(1, 3)\} & \text{[C]} \quad S &= \{(1, 0), (1, 3)\} & \text{[D]} \quad S &= \{(1, 0)\} \\ \text{[E]} \quad S &= \{(-1, 1), (1, 0)\} \end{aligned}$$

25

Să se rezolve în \mathbb{R} ecuația $\log_{1+x}(2x^3 + 2x^2 - 3x + 1) = 3$.

$$\text{[A]} \quad x = 0; \quad \text{[B]} \quad x = -2; \quad \text{[C]} \quad x = 3; \quad \text{[D]} \quad x = \frac{1}{2}; \quad \text{[E]} \quad x = \frac{1}{3}.$$

26

Ecuația $\frac{2 \lg x}{\lg(5x - 4)} = 1$ are ca mulțime a soluțiilor pe:

$$\text{[A]} \quad \{1, 4\} \quad \text{[B]} \quad \{4\} \quad \text{[C]} \quad \{10\} \quad \text{[D]} \quad \emptyset \quad \text{[E]} \quad \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{4}{5}\}$$

27

Se consideră mulțimea tripletelor de numere reale (a, b, c) care verifică relația $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Atunci $\min(ab + bc + ac)$ pentru această mulțime este:

$$\text{[A]} \quad -1 \quad \text{[B]} \quad -\frac{3}{4} \quad \text{[C]} \quad -\frac{1}{2} \quad \text{[D]} \quad -\frac{1}{3} \quad \text{[E]} \quad \text{nu există minim}$$

Fie mulțimea $A = A_2 \setminus A_1$, unde $A_1 = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid x = \frac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$ și
 $A_2 = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x = \frac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$.

28 Mulțimea A_1 este:

- A $A_1 = \{1, 2, 3\}$ B $A_1 = \mathbb{N}$ C $A_1 = \{-2, 1, 4\}$ D $A_1 = \{1, 3, 5\}$ E $A_1 = \emptyset$

29 Mulțimea A_2 este:

- A $A_2 = \{-1, 1, 3, 5\}$ B $A_2 = \{3, 5\}$ C $A_2 = \{3\}$ D $A_2 = \emptyset$ E $A_2 = \{-1\}$

30 Mulțimea soluțiilor inecuației $\log_{\frac{1}{3}}(\log_3 x) \geq 1$ este:

- A $[3, \infty)$ B $(0, \sqrt[3]{9})$ C $(1, \sqrt[3]{3})$ D $(\frac{1}{3}, 1]$ E $(0, 1) \cup (\sqrt[3]{3}, +\infty)$

Restul împărțirii polinomului X^{10}

31 la $X + 1$ este: A -1 B 0 C 1 D 9 E Alt răspuns

32 la $(X + 1)^2$ este: A -10 B $-10X$ C $10X + 9$ D $-10X - 9$ E $X - 9$

33 la $(X + 1)^3$ este: A $-9X^2 + 22$ B $45X^2 + 80X + 36$ C $X + 2$ D 1 E 0

34 Mulțimea soluțiilor ecuației $2A_n^{n-3}x^2 + 4A_n^{n-2}x + 3P_n = 0, n \geq 3$, este:

- A $\{n, \frac{n}{2}\}$ B $\{1, A_n^2\}$ C $\{-3\}$ D $\{A_n^3\}$ E \emptyset .

35 Să se determine primul termen a_1 și rația q a unei progresii geometrice $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ dacă:

$$\begin{cases} a_4 - a_2 = 6, \\ a_3 - a_1 = 3. \end{cases}$$

- A $a_1 = -1; q = 3$ B $a_1 = 3; q = \frac{1}{2}$ C $a_1 = 2; q = -2$
 D $a_1 = 1; q = 2$ E $a_1 = 1; q = 3$.

36 Care sunt valorile coeficienților reali a și b din ecuația

$$x^3 - ax^2 + bx + 1 = 0,$$

dacă acești coeficienți sunt rădăcini ale ecuației?

- A $a = 1, b = 0$ B $a = 1, b \in \mathbb{R}$ C $a = 1, b = -1$ D $a \in \mathbb{R}, b = -1$ E $a \in \mathbb{R}, b = 1$.

37 Coeficientul lui x^{99} din dezvoltarea polinomului

$$(x-1)(x-2)(x-3) \dots (x-99)(x-100)$$

este: A -4950 B -5050 C 99 D -100 E 3450 .

38 Cel mai mare divizor comun al polinoamelor $(x+1)^{4n+3} + x^{2n}, n \in \mathbb{N}^*$ și $x^3 - 1$ este:

- A $x^3 - 1$ B $x - 1$ C $x^2 + x + 1$ D sunt prime între ele E $(x+1)^{4n+3} + x^{2n}$

39 Valoarea lui $(1-\alpha)(1-\alpha^2)(1-\alpha^4)(1-\alpha^5)$, unde $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, \alpha^3 = 1$, este:

- A -1 B 9 C 0 D $9i$ E $3i$.

40 Fie numerele reale $a, b, c, d \in (0, 1) \cup (1, \infty)$. Dacă $\log_a b \log_b c \log_c d = 1$ atunci:

- A $a = b \in (0, 1)$ și $c = d \in (1, \infty)$ B $a = b \in (1, \infty)$ și $c = d \in (0, 1)$ C $a = c \in (0, 1)$ și $b = d \in (1, \infty)$ D $a = d$ E $a = c \in (1, \infty)$ și $b = d \in (0, 1)$.

41 Suma $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$ este: A $n(n+1)$ B $n \cdot n!$ C $(n+1)! - 1$ D $n!$ E $2n \cdot n!$

Se consideră matricea $U(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{pmatrix}$.

42 Matricea $U(a, b)$ este singulară dacă și numai dacă

- A $a = b$ B $a \neq -3b$ C $(a - b)(3b + a) = 0$ D $a + 3b = 0$ E alt răspuns

43 $U^{11}(1, 1)$ este A $U(1, 1)$ B $4^{100}U(1, 1)$ C $2^{22}U(1, 1)$ D $2^{20}U(1, 1)$ E $4^8U(1, 1)$

44 Inversa matricei $U(1, 2)$ este:

- A $U(1, 2)$ B $U(1, 2) - U(1, 1)$ C $\frac{U(1, 2) - 6I_4}{7}$ D nu există E alt răspuns

45 Dacă $a^2 + b^2 = 1$, atunci inversa matricei $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ este:

- A $\begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ D $\begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{1}{b} \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$.

46 Inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ este matricea:

- A $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ D $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
 E $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$.

47 Matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & a & 3 \end{pmatrix}$ are rangul minim pentru:

- A $a = 0$ B $a = 1$ C $a = 7$ D $a = 21$ E $a = -21$

48 Sistemul de ecuații cu parametrul real m , $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 6x - 8y = 1 \\ 5x + 2y = m \end{cases}$, este compatibil numai dacă:
 A $m = 0$ B $m = 1$ C $m = 2$ D $m = 3$ E $m = 4$.

49 Sistemul de ecuații cu parametrii $m, n \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} mx + y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ (2m - 1)x + 2y + z = n \end{cases}$$

este compatibil nedeterminat pentru:

- A $m = 3; n \neq 3$ B $m \neq 3; n = 3$ C $m = 3; n = 3$ D $m \neq 3; n \neq 3$ E $m = 5; n = 3$

50 Dacă $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n & 44 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}$, atunci:

- A $n = 1$ B $n = 2$ C $n = 4$ D $n = 8$ E $n = 16$.

51 Fie $m, n \in \mathbb{R}$, x_1, x_2, x_3 rădăcinile ecuației $x^3 + mx + n = 0$ și matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix}$. Determinantul matricei A^2 este:

- A $-4m^3 - 27n^2$ B $4m^3 - 27n^2$ C $-4m^3 + 27n^2$ D $-2n^3 - 27m^2$ E $-3n^3 - 27m^2$

52 Mulțimea valorilor $a \in \mathbb{R}$ pentru care rangul matricei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ -2 & -1 & -5 & -4 \\ 2 & 0 & 4 & a \end{pmatrix}$$

este egal cu 2, este

- A \emptyset B $\{0\}$ C $\{2\}$ D $\{-2, 2\}$ E $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

Se consideră sistemul

$$(S) : \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + az = -3 \\ 3x + y + 4z = b \end{cases}$$

53 (S) este compatibil determinat dacă și numai dacă

- A $a = 0$ B $a \neq 1, b \in \mathbb{R}$ C $a = 1, b = -2$

54 (S) este compatibil nedeterminat dacă

- A $a = 1, b = -2$ B $a = 1, b = 2$ C $a \neq 1, b \in \mathbb{R}$ D $a = 2, b = 1$

55 (S) este incompatibil dacă și numai dacă

- A $a = 1, b = 2$ B $a \neq 2, b = 1$ C $a \neq 1, b \neq -2$ D $a \neq 0, b = 2$ E $a = 1, b \neq -2$

56 Sistemul de ecuații $\begin{cases} 2x + 2y + mxy = 5 \\ (m - 1)(x + y) + xy = 1 \\ 3x + 3y - xy = m + 1 \end{cases}$, $m \in \mathbb{R}$,

este compatibil pentru m aparținând mulțimii:

- A $[-1, 1]$ B $[-3, -2]$ C $[2, 4]$ D $\{-\frac{1}{2}\}$ E $\{1, 2, 4\}$.

57 Dacă sistemul de ecuații
$$\begin{cases} 2x + ay + 4z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ 3x - 2y - z = 0 \end{cases}; \quad a \in \mathbb{R}$$
 este compatibil determinat, atunci:

- A $a = 1$ B $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ C $a \in \mathbb{R}^*$ D $a \in (0, \infty)$ E $a \in (1, \infty)$

58 Dacă $A = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R}$, atunci:

- A $A^n = \begin{pmatrix} \cos^n t & -\sin^n t \\ \sin^n t & \cos^n t \end{pmatrix}$ B $A^n = \begin{pmatrix} \cos t^n & -\sin t^n \\ \sin t^n & \cos t^n \end{pmatrix}$
 C $A^n = \begin{pmatrix} \cos nt & -\sin nt \\ \sin nt & \cos nt \end{pmatrix}$ D $A^n = \begin{pmatrix} \sin nt & -\cos nt \\ \cos nt & \sin nt \end{pmatrix}$
 E $A^n = \begin{pmatrix} \cos^n t - \sin^n t & -n \sin t \cos t \\ n \sin t \cos t & \cos^n t - \sin^n t \end{pmatrix}$

59 Dacă $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, atunci A^{12} este:

- A $\begin{pmatrix} 3^6 & 1 \\ 1 & 3^6 \end{pmatrix}$ B $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ C $\begin{pmatrix} 12\sqrt{3} & -12 \\ 12 & 12\sqrt{3} \end{pmatrix}$ D $2^{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 E $\begin{pmatrix} (\sqrt{3})^{12} & (-1)^{12} \\ 1 & (\sqrt{3})^{12} \end{pmatrix}$.

Se dă mulțimea $M = [5, 7]$ și operația $*$ definită prin $x * y = xy - 6x - 6y + \alpha$.

60 Valoarea parametrului real α pentru care mulțimea M este parte stabilă în raport cu operația $*$ este:

- A $\alpha = 42$ B $\alpha = 36$ C $\alpha = -36$ D $\alpha = 6$ E $\alpha = -6$.

61 În monoidul $(M, *)$, elementul neutru este:

- A $e = 7$ B $e = 6$ C $e = 5$ D $e = 1$ E nu există.

62 În monoidul $(M, *)$, mulțimea elementelor simetrizabile este:

- A $[5, 7] \setminus \{6\}$ B $\{6\}$ C $\{5, 7\}$ D $[5, 7]$ E $\mathbb{R} \setminus \{6\}$.

Definim pe $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ legea de compoziție $(x, y) * (a, b) = (xa, xb + ya)$.

63 Elementul neutru al legii $*$ este: A $(0, 1)$ B $(1, 0)$ C $(0, 0)$ D $(1, 1)$ E $(-1, 1)$

64 Fie legea de compoziție $*$ definită prin $x * y = \frac{x-y}{1-xy}, \forall x, y \in (-1, 1)$. Elementul neutru pentru această lege este: A $e = 0$ B nu există C $e = 1$ D $e = -1$ E $\frac{1}{2}$.

65 Pe mulțimea \mathbb{Z} a numerelor întregi se definește legea $*$ prin $x * y = x + y - 2, \forall x, y \in \mathbb{Z}$. Să se determine simetricul x' al lui x .

- A x' nu există B $x' = 1 - x$ C $x' = 4 - x$ D $x' = \frac{1}{x}$ E $x' = -x$

Pe mulțimea \mathbb{C} a numerelor complexe definim legea de compoziție $*$ prin $z_1 * z_2 = z_1 + z_2 - z_1 z_2$.

- 66 Numărul $2 * i$ este: A $2 - i$ B $2i$ C $2 + i$
- 67 Elementul neutru față de $*$ este: A 1 B 0 C i D -1
- 68 Elementul simetric al lui i față de $*$ este: A $-i$ B $1 - i$ C $\frac{1-i}{2}$ D $\frac{1+i}{2}$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - (m - 1)x + 3m - 4$, $m \in \mathbb{R}$.

- 69 Mulțimea valorilor lui m pentru care f se anulează în $(0, 1)$ și $f(x) \geq 0$, $\forall x \in (0, 1)$ este:
 A $(-\infty, 7 - 4\sqrt{2})$ B $(-\infty, 7 - 4\sqrt{2}) \cup (7 + 4\sqrt{2}, \infty)$ C $\{7 - 4\sqrt{2}, 7 + 4\sqrt{2}\}$ D $\{7 - 4\sqrt{2}\}$
 E $[7 - 4\sqrt{2}, 7 + 4\sqrt{2}]$
- 70 Mulțimea valorilor lui m pentru care $f(x) < 0$, $\forall x \in (0, 1)$ este
 A $(0, 1)$ B $(2, \infty)$ C $(-\infty, 1]$ D \emptyset E $(0, \infty)$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - mx + 2$, $m \in \mathbb{R}$.

- 71 Mulțimea valorilor lui m pentru care f este strict crescătoare pe intervalul $[-1, 1]$ este
 A $[-2, 2]$ B $(-\infty, -2)$ C $(-\infty, -2]$ D \mathbb{R} E Alt răspuns
- 72 Mulțimea valorilor lui m pentru care f este injectivă pe $[-1, 1]$ este:
 A \mathbb{R} B $(-1, 1)$ C $(-\infty, -2] \cup (2, \infty)$ D $(-2, 2)$ E Alt răspuns

- 73 Familia de parabole asociate funcțiilor

$$f_m(x) = (m + 1)x^2 - 3mx + 2m - 1, \quad m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\},$$

- A are un punct fix pe axa Oy
 B are un punct fix situat pe prima bisectoare
 C are două puncte fixe
 D are trei puncte fixe
 E nu are puncte fixe.

Fie parabolele de ecuații: $P_1 : y = x^2 + 5x + 4$

și $P_2 : y = (m - 1)x^2 + (4m + n - 4)x + 5m + 2n - 4$, unde $m, n \in \mathbb{R}$, $m \neq 1$.

- 74 Parabolele se intersectează în $A(-2, -2)$ și $B(0, 4)$ dacă:
 A $m = -2, n = 9$ B $m = 2, n = -9$ C $m = 5, n = 4$ D $m = \frac{1}{2}, n = 3$
 E $m = \frac{1}{3}, n = -2$.
- 75 Parabolele au singurul punct comun $C(1, 10)$ dar nu sunt tangente dacă:
 A $m = -\frac{2}{3}, n = \frac{1}{3}$ B $m = 2, n = -\frac{1}{3}$ C $m = -\frac{1}{3}, n = 3$ D $m = -2, n = \frac{1}{2}$
 E $m = n = 2$
- 76 Parabolele sunt tangente în punctul $T(-2, -2)$ dacă:
 A $m = 0, n = -3$ B $m = 2, n = -1$ C $m = -2, n = -1$ D $m = -2, n = 1$
 E $m = \frac{1}{2}, n = -4$.

77 Fie $E(x) = \frac{x^2 - 2(m-1)x + m + 1}{mx^2 - mx + 1}$. Mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care E este bine definită oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, este:
 A \mathbb{R} B $\{4\}$ C $\{-1\}$ D $(0, 4)$ E alt răspuns.

78 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care

$$(m-1)x^2 + (m-1)x + m - 3 < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
este:
 A \emptyset B $(-\infty, 1) \cup (\frac{11}{3}, \infty)$ C $(-\infty, 0)$ D $(-\infty, 1)$ E alt răspuns.

79 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}^*$, pentru care parabolele asociate funcțiilor $f_a(x) = ax^2 - (a+2)x - 1$ și $g_a(x) = x^2 - x - a$ sunt tangente, este:
 A $\{-1, 2\}$ B $\{3, -1\}$ C $\{3\}$ D $\{\frac{1}{3}, 3\}$ E \emptyset .

80 Ecuația $x^4 + (2m-1)x^2 + 2m + 2 = 0$, cu necunoscuta x și parametrul real m , are toate rădăcinile reale dacă:
 A $m = 0$ B $1 \leq m \leq 2$ C $-1 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ D $m \in \emptyset$ E $m > \frac{1}{2}$.

81 Se dă ecuația $x^3 - 3x^2 + 2x - a = 0$. Rădăcinile ei sunt în progresie aritmetică dacă și numai dacă
 A $a = 0$ B $a \in \{0, 1\}$ C $a \in \{-1, 1\}$

Fie x_1, x_2, x_3 rădăcinile ecuației $x^3 - 2x + 3 = 0$. Notăm $S_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k, k \in \mathbb{Z}$.

82 S_{-1} este: A 0 B $\frac{2}{3}$ C $-\frac{2}{3}$
83 S_{-2} este: A $\frac{4}{9}$ B $-\frac{4}{9}$ C $\frac{2}{3}$ D $-\frac{3}{2}$
84 S_4 este: A 4 B $\frac{4}{9}$ C -4 D 8 E -8

85 Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifică egalitățile:

$$P(0) + \dots + P(n) = n^5, \quad n = 0, 1, \dots,$$
atunci:
 A $P(0) = 0$ B $P(0) = 1$ C $P(0) = 2$ D $P(0) = 3$ E alt răspuns

86 Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface egalitățile:

$$P(n) = \sum_{k=1}^n k^{10}, \quad n = 1, 2, \dots,$$
atunci $P(-2)$ este:
 A 0 B -1 C 1023 D -1025 E nu are sens

Se dă ecuația $x^3 - px^2 + qx - r = 0$.

87 Ecuația admite două rădăcini opuse, dacă
 A $p + q = r$ B $r^2 - pq = 0$ C $rp - q = 1$ D $q^2 - rp = 0$ E $pq - r = 0$
88 Rădăcinile sunt în progresie geometrică dacă:
 A $p^2r - q = 0$ B $p^3 - rq = 0$ C $q^2 - rp = 0$ D $q^3 + p + q = 0$ E $p^3r - q^3 = 0$

89 Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației

$$\sqrt{x+2} - 4\sqrt{x-2} + \sqrt{x+7} - 6\sqrt{x-2} = 1$$

este:

- A $\{5, 12\}$ B $\{7, 10\}$ C $[2, \infty)$ D $[6, 11]$ E $\{8, 12\}$.

90 Mulțimea soluțiilor reale ale inecuației $\sqrt{x+2} - \sqrt{x+3} < \sqrt{2} - \sqrt{3}$ este:

- A $(-\infty, 0)$ B $[-2, 0)$ C $[-2, \infty)$ D \emptyset E $(0, \infty)$

Se consideră funcția $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x-11}$.

91 Mulțimea de definiție a funcției este:

- A \mathbb{R} B $[0, \infty)$ C $(-\infty, 0)$ D $[11, \infty)$ E $(-\infty, 11)$

92 Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $f(x) = 7$ este

- A $\{27\}$ B $\{0\}$ C $\{11\}$ D $\{1\}$ E conține cel puțin două elemente

93 Câte soluții întregi are ecuația

$$8(4^x + 4^{-x}) - 54(2^x + 2^{-x}) + 101 = 0?$$

- A 2 B 4 C 1 D nici una E 3

94 Mulțimea valorilor reale ale lui a , pentru care funcția

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + ax + 1,$$

este injectivă, este:

- A $(-\infty, 0)$ B $[0, \infty)$ C \emptyset D $\{1\}$ E \mathbb{R} .

95 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația

$$(m-2)x^2 - (2m+1)x + m - 3 = 0$$

are rădăcinile în $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ cu partea reală negativă este:

- A $(-\frac{1}{2}, \frac{23}{24})$ B $(-\infty, \frac{23}{24})$ C $[-\frac{1}{2}, \infty)$ D $[\frac{23}{24}, \infty)$ E \emptyset

96 Valoarea minimă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$$

unde $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, se obține pentru:

- A $x = 0$ B $x = a_1$ C $x = a_2$ D $x = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ E $x = \frac{a_1 + a_n}{2}$.

97 Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2mx - 1 & ; x \leq 0 \\ mx - 1 & ; x > 0 \end{cases}$, $m \in \mathbb{R}^*$, este injectivă dacă:

- A $m \in (-\infty, 1)$ B $m \in (1, \infty)$ C $m \in (-\infty, 0)$ D $m \in (0, \infty)$ E $m \in (-1, 1)$.

98 Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x + m, & x \leq 1 \\ 2mx - 1, & x > 1 \end{cases}$. Funcția f este surjectivă dacă și numai dacă:

- A $m \in (0, 1)$; B $m \in (-\infty, 2]$; C $m = 2$; D $m \in (0, 2]$; E $m \in (-\infty, 1]$.

99 Sistemul $\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ x + y + z = a \end{cases}$, are o singură soluție $(x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, dacă:

- A $a = -\frac{1}{2}$ B $a = \frac{1}{2}$ C $a = 2$ D $a = \frac{1}{4}$ E $a = -\frac{1}{4}$.

100 Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $x = \sqrt{2-x}$ este:

- A \emptyset B $\{1, -2\}$ C $\{1\}$ D $[1, 2]$ E $\{2\}$

101 Pentru ca funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow B$, $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x^2+x+1}$ să fie surjectivă, trebuie ca:

- A $B = \mathbb{R}$ B $B = \left[\frac{9-2\sqrt{21}}{3}, \frac{9+2\sqrt{21}}{3}\right]$ C $B = [1, 2]$ D $B = (1, 2)$ E $B = [-3, 3]$.

102 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care valorile funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2 + 1}$, sunt cuprinse în intervalul $(0, 3)$, este:

- A $(-4, 4)$ B $(-\infty, -4)$ C $(0, 3)$ D $(-2, 2)$ E $\{-2, 2\}$.

103 Numărul soluțiilor $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ale ecuației

- $2|x-2| + 3|y-3| = 0$ este: A 0 B 1 C 2 D 4 E o infinitate.

104 Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $\sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 4x + 4} = 2x$ este:

- A $[-1, 3]$ B $(0, \infty)$ C $[2, \infty)$ D $[-2, 2]$ E $(-\infty, 2]$

105 Soluția ecuației $(3 - 2\sqrt{2})^x - 2(\sqrt{2} - 1)^x = 3$ este:

- A -1 B $\ln 2$ C 2 D $\log_2(3 - 2\sqrt{2})$ E $\frac{1}{\log_3(\sqrt{2}-1)}$.

106 Soluția ecuației $\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{6}\right)^x + \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^x = 1$ este:

- A orice număr real B 1 C 0 D $-\frac{1}{2}$ E ecuația nu are soluție.

107 Ecuația $(5 + \sqrt{24})^{\sqrt{x+1}} + (5 - \sqrt{24})^{\sqrt{x+1}} = 98$ are mulțimea soluțiilor:

- A $\{3\}$ B $\{-3; 3\}$ C $\{-3\}$ D $\{\sqrt{3}; 3\}$ E $\{\frac{1}{3}; 3\}$.

Fie $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\log_x 2 \log_x 4} + \frac{1}{\log_x 4 \log_x 8} + \dots + \frac{1}{\log_x 2^n \log_x 2^{n+1}}$, unde $n \geq 5$ este un număr întreg.

108 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ este: A $\frac{n}{n+1}$ B 1 C $\frac{n+1}{n}$ D $\frac{1}{2} \frac{n+1}{n}$ E $2 \frac{n+1}{n}$

109 Soluția ecuației $f(x) = \frac{4n}{n+1}$ este: A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D 4 E $\frac{1}{2^n}$

110 Mulțimea soluțiilor sistemului de ecuații $\begin{cases} x^2 + y^2 = 425 \\ \lg x + \lg y = 2 \end{cases}$ este:

- A $\{(1; 1)\}$ B $\{(1; 1); (10; 10)\}$ C $\{(20; 5); (5; 20)\}$ D $\{(1; 10); (10; 1)\}$ E $\{(20; 5)\}$.

111 Soluțiile ecuației $\log_{2x} 4x + \log_{4x} 16x = 4$ aparțin mulțimii:

- A $\{3\}$ B $\{2\}$ C $\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}, 2\right]$ D $\{\log_2 3\}$ E $(2, \infty)$.

112) Mulțimea soluțiilor inecuației $\lg((x^3 - x - 1)^2) < 2 \lg(x^3 + x - 1)$ este:
 A \mathbb{R} B $(0, \infty)$ C $(1, \infty)$ D $(0, 1)$ E alt răspuns.

Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 9^x - 5^x - 4^x$.

113) Numărul de soluții reale ale ecuației $f(x) = 0$ este: A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

114) Numărul de soluții reale ale ecuației $f(x) - 2\sqrt{20^x} = 0$ este:
 A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

115) Mulțimea soluțiilor ecuației $\log_3 x^2 - 2 \log_{-x} 9 = 2$ este:
 A $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0, x \neq -1\}$ B $\{-9\}$ C \emptyset D $\{9\}$ E $\{-\frac{1}{3}, -9\}$.

Se consideră funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln(x+a)}{\sqrt{x}}$, $a \in \mathbb{R}$.

116) Domeniul de definiție al funcției este:
 A $(0, \infty)$ B $(0, \infty) \setminus \{1\}$ C $x \in (a, \infty)$ D $x \in (-a, \infty)$ E $x \in (\frac{-a+|a|}{2}, \infty)$

117) Mulțimea valorilor lui a pentru care $f(x) > 0$, pentru orice $x \in D$ este:
 A $(-\infty, 0)$ B $(-1, 1)$ C $[1, \infty)$ D $(2, \infty)$ E alt răspuns

118) Dacă $\log_6 2 = a$, atunci valoarea lui $\log_6 324$ este:
 A $a + 3$ B $5a - 2$ C $4 - 2a$ D $a^2(2 - a)^4$ E $3 + 2a$.

119) Fie $a = \lg 2$ și $b = \lg 3$. Dacă $x = 3^{\log_{27}(\lg 150)^3}$ atunci:
 A $x = 3 - 2b + a$ B $x = 2 + b - a$ C $x = 1$ D $x + 1 = a + b$ E $x = 81ab$.

120) Valoarea expresiei $\sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$ este: A 1 B 3 C 2 D $\sqrt{5}$ E $2\sqrt{5}$

121) Valoarea expresiei $\sqrt[3]{\sqrt{50} + 7} - \sqrt[3]{\sqrt{50} - 7}$ este: A $2\sqrt{50}$ B 2 C 1 D 3 E $\sqrt{50}$

122) Mulțimea valorilor parametrului real m , pentru care ecuația $X^4 - mX^2 - 4 = 0$ admite rădăcina reală $\sqrt[4]{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt[4]{3 + 2\sqrt{2}}$, este: A \emptyset B $\{0\}$ C $\{4\}$ D $\{1\}$ E $\{-4, 4\}$

123) Știind că a este rădăcina reală a ecuației $x^3 + x + 1 = 0$, să se calculeze

$$\sqrt[3]{(3a^2 - 2a + 2)(3a^2 + 2a)} + a^2.$$

A $a + 1$ B 1 C 3 D 2 E a

124) Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care

$$m9^x + 4(m - 1)3^x + m > 1$$

oricare ar fi x real este: A $(-\infty, 1)$ B $[1, \infty)$ C $[-1, 1]$ D $(1, \infty)$ E \emptyset

125) Mulțimea soluțiilor inecuației $\lg((x-1)^{10}) < 10 \lg x$ este:

- A \mathbb{R} B $(0, \infty)$ C $(0, 1) \cup (1, \infty)$ D $(\frac{1}{2}, 1) \cup (1, \infty)$ E \emptyset .

126) Mulțimea soluțiilor inecuației

$$\log_x(1+x) + \log_{x^2}(1+x) + \log_{x^4}(1+x) \geq \frac{7}{4}$$

- este: A $(0, 1) \cup (1, \infty)$ B $(1, \infty)$ C $(0, \infty)$ D \emptyset E \mathbb{R} .

127) Valoarea sumei $S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este:

- A $\frac{n}{3n+1}$ B $\frac{3n}{3n+1}$ C $\frac{n+1}{3n+1}$ D $\frac{n-1}{3n+1}$ E $\frac{n}{3(3n+1)}$.

128) Suma $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A $\frac{1}{n+1}$ B $\frac{2n-1}{2}$ C $\frac{(n+1)!-1}{(n+1)!}$ D $\frac{n^2}{(n+1)!}$ E $\frac{n}{n+1}$.

129) Suma $\sum_{k=3}^n A_k^3 C_n^k$ are valoarea: A $8C_n^3$ B $2^n A_n^3$ C $A_n^3 2^{n-3}$ D $2^{n-2} C_{n+1}^3$ E 3^n

130) Suma $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + nC_n^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A $n2^{n-1}$ B $n2^n - 1$ C n D $\frac{n(n+1)}{2}$ E alt răspuns.

131) Suma $\sum_{k=1}^n \frac{kC_n^k}{C_n^{k-1}}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A $\frac{n(n+1)}{2}$ B $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ C $\frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$ D $n(2n-1)$ E $n^3 - n^2 + n$.

132) Soluția ecuației $A_x^6 - 24xC_x^4 = 11A_x^4$ aparține mulțimii:

- A $[5, 7]$ B $[8, 10]$ C $\{10\}$ D $\{4\}$ E $\{6\}$.

133) Să se determine termenul independent de a al dezvoltării $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}} + \sqrt[4]{a^3}\right)^{17}$.

- A C_{17}^6 B C_{17}^7 C C_{17}^8 D C_{17}^{10} E C_{17}^{11} .

134) O progresie aritmetică crescătoare $(a_n)_{n \geq 1}$ verifică relațiile $a_9 + a_{10} + a_{11} = 15$ și $a_9 a_{10} a_{11} = 120$. Suma primilor 20 de termeni din progresie este:

- A 150 B 100 C 120 D 110 E 160

135) Ecuația $x^3 - (4-i)x^2 - (1+i)x + a = 0$, $a \in \mathbb{R}$, are o rădăcină reală dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

- A $\{1, 2\}$ B $\{0, 1\}$ C $\{-1, 4\}$ D $\{0, 4\}$ E \mathbb{R}

136 Pentru ce valori ale parametrului real b ecuația

$$x^3 + a(a+1)x^2 + ax - a(a+b) - 1 = 0$$

admite o rădăcină independentă de a ?
 $x = 1, b = 2.$

A 0 B 1 C 2 D a E $-1.$

137 Numerele reale nenule a, b, c sunt rădăcinile ecuației

$$x^3 - ax^2 + bx + c = 0. \text{ În acest caz tripletul } (a, b, c) \text{ este:}$$

A $(1, 1, 1)$ B $(-1, -1, -1)$ C $(1, -1, 1)$ D $(1, -1, -1)$ E alt răspuns.

138 Care este valoarea parametrului rațional m , dacă ecuația

$$x^4 - 7x^3 + (13 + m)x^2 - (3 + 4m)x + m = 0$$

admite soluția $x_1 = 2 + \sqrt{3}$ și soluțiile x_3 și x_4 verifică relația $x_3 = 2x_4$?

A -1 B $\frac{3}{4}$ C $\frac{5}{3}$ D 2 E 4.

139 Soluțiile ecuației $z\bar{z} + 2(z - \bar{z}) = 20 + 8i, z \in \mathbb{C}$, sunt:

A $\pm 2 + 4i$ B $\pm 4 + 2i$ C $4 + 2i$ D $4 - 2i$ E alt răspuns.

140 Fie x_1, x_2, \dots, x_n rădăcinile ecuației $x^n - 3x^{n-1} + 2x + 1 = 0$. Valoarea sumei

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x_k - 1} \text{ este:}$$

A $3n - 5$ B $2n + 1$ C $\frac{n}{n-1}$ D $\frac{n(n+1)}{n^2+n-1}$ E 0

141 Valoarea lui m pentru care ecuația $x^3 - 6x^2 + 11x + m = 0$ are rădăcinile în progresie aritmetică aparține mulțimii:

A $[-1, 1]$ B $[2, 4]$ C $[-4, -2]$ D $[-7, -5]$ E $[5, 6]$.

142 Dacă ecuația $2x^3 + mx^2 + 4x + 4 = 0$ admite o rădăcină dublă, atunci m aparține mulțimii:

A $[-5, 0]$ B $[0, 2]$ C $[-8, -5]$ D $\{3\}$ E $(6, \infty)$.

143 Mulțimea valorilor lui $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $x^3 - 28x + m = 0$ are o rădăcină egală cu dublul altei rădăcini este:

A $\{48\}$ B $\{-48\}$ C $\mathbb{R} \setminus \{48\}$ D $\mathbb{R} \setminus \{-48\}$ E $\{-48, +48\}$.

144 Sistemul de ecuații
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \end{cases}$$
 are:

A o soluție B două soluții C trei soluții D patru soluții E șase soluții.

Se consideră ecuația $x^4 - 5x^3 + ax^2 - 7x + 2 = 0$ cu a parametru real.

145 Valoarea sumei $\sum_{i=1}^4 \frac{1}{x_i}$, unde x_i sunt rădăcinile ecuației, este

- A $-\frac{7}{2}$ B $-\frac{3}{2}$ C 0 D $\frac{3}{2}$ E $\frac{7}{2}$

146 Valoarea parametrului a pentru care ecuația are rădăcină triplă este

- A $\{\frac{63}{64}\}$ B $\{\frac{7}{5}, 3\}$ C $\{9\}$ D $\{3, 7, 9\}$

147 Valorile parametrului $m \in \mathbb{R}$ pentru care suma a două rădăcini ale ecuației $x^4 + 10x^3 + mx^2 + 50x + 24 = 0$ este egală cu suma celorlalte două rădăcini aparțin mulțimii:

- A $[0, 10]$ B $[-4, -1]$ C $\{5\}$ D $[30, 40]$ E $[-1, 1]$.

Fie $(x+1)(x^2+2)(x^2+3)(x^2+4)(x^2+5) = \sum_{k=0}^9 A_k x^k$.

148 $\sum_{k=0}^9 A_k$ este: A 720 B 724 C 120 D 600 E alt răspuns

149 $\sum_{k=0}^4 A_{2k}$ este: A 360 B 120 C 100 D 240 E 300

150 Fie polinomul $P \in \mathbb{C}[X]$, $P = X^3 + pX + q$, cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 . Să se determine polinomul cu rădăcinile x_1^2, x_2^2, x_3^2 .

- A $X^3 + 2pX^2 + p^2X - q^2$ B $X^3 + 2pX^2 - 4pX + q$
 C $X^3 + 2pX^2 + p^2X + q^2$ D $X^4 + qX^2 + 5$ E $X^3 - pX^2 + qX + q^2$.

151 Restul împărțirii polinomului $1 + X + X^2 + \dots + X^{1998}$ la $1 + X$ este egal cu:

- A 0 B -1 C 1 D 1997 E 1999.

152 Polinomul $(X^2 + X - 1)^n - X$ este divizibil cu polinomul $X^2 - 1$ dacă și numai dacă:

- A $n = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ B $n = 3k, k \in \mathbb{N}^*$ C $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}^*$ D $n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}^*$
 E $n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}^*$

153 Polinomul $(X^2 + X + 1)^n - X$ este divizibil cu polinomul $X^2 + 1$ dacă și numai dacă:

- A $n = 3k, k \in \mathbb{N}^*$ B $n = 4k, k \in \mathbb{N}^*$ C $n = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ D $n = 4k + 2, k \in \mathbb{N}^*$
 E $n = 4k + 3, k \in \mathbb{N}^*$.

154 Mulțimea valorilor parametrului real a , pentru care ecuația $x^3 + ax + 1 = 0$ are toate rădăcinile reale și ele verifică relația $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 18$, este:

- A $\{-12\}$ B $\{3\}$ C $\{-3\}$ D $\{-3, 3\}$ E \emptyset .

155 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația

$$x(x-1)(x-2)(x-3) = m$$

are toate rădăcinile reale este: A $[-1, 9/4]$ B $[-1, 9/16]$ C $[-1, 9]$ D $[1, 1/16]$ E \emptyset

156 Restul împărțirii polinomului $P(X) = X^{100} + X^{50} - 2X^4 - X^3 + X + 1$ la polinomul $X^3 + X$ este: A $X + 1$ B $2X^2 + 1$ C $2X^2 - 2X - 1$ D $2X^2 + 2X + 1$ E $X^2 + 1$.

157 Se consideră polinoamele cu coeficienți complecși $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ și $Q(X) = b_0 + b_1X + \dots + b_mX^m$. Știind că polinomul $Q(X)$ se divide cu $X - 1$, să se determine suma coeficienților polinomului $P(Q(X))$.

A $\sum_{i=0}^n a_i$ B $\left(\sum_{i=0}^n a_i\right) \left(\sum_{i=0}^m b_i\right)$ C a_nb_m D a_0 E a_0b_0 .

158 Un polinom de grad mai mare sau egal cu 2, împărțit la $X - 1$ dă restul 3 și împărțit la $X + 1$ dă restul -5 . Restul împărțirii la $X^2 - 1$ este:

A -15 B $3X - 5$ C $-3X + 5$ D $4X - 1$ E nu se poate determina din datele problemei.

159 Restul împărțirii polinomului $X^{400} + 400X^{399} + 400$ la polinomul $X^2 + 1$ este:

A $400X + 401$ B $400X - 399$ C $-400X + 401$ D $-400X + 399$ E 0

Fie numărul complex $z = 1 + i$.

160 Numărul complex $\frac{1}{z}$ este: A $-1 - i$ B $1 - i$ C $\frac{1-i}{2}$ D $\frac{1+i}{2}$ E Alt răspuns

161 Dacă z^n este real, pentru o anumite valoare $n \in \mathbb{N}^*$, atunci numărul complex z^{2n} este:

A i^n B -1 C 1 D 2^n E $(\sqrt{2})^n$

162 Fie $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Dacă $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$ și $|z_1| = |z_2| = 1$, atunci $|z_1 - z_2|$ este:

A 2 B 1 C $\sqrt{3}$ D $\sqrt{2}$ E $\sqrt{3} - 1$.

163 Valoarea parametrului $m \in \mathbb{R}$ pentru care rădăcinile x_1, x_2, x_3 ale ecuației $x^3 + x + m = 0$, $m \in \mathbb{R}$, verifică relația $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 = 10$ este:

A 1 B -1 C 3 D 2 E -2 .

164 Dacă $a < b < c$ și $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+2 & b+2 & c+2 \\ (a+1)^2 & (b+1)^2 & (c+1)^2 \end{vmatrix}$, atunci:

A $D = 0$ B $D \leq 0$ C $D < 0$ D $D > 0$ E $D = -a^2 - b^2 - c^2$.

165 Există matrice nenule $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel ca $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

dacă și numai dacă:

A $a = \sqrt{2}$ B $a \in \{-3, 2\}$ C $a \in \{-1, 1\}$ D $a \in \mathbb{R}^*$ E $a \in \{-2, 2\}$.

166 Dacă x_1, x_2, x_3 sunt rădăcinile ecuației $x^3 - 2x^2 + 2x + 6 = 0$, atunci valoarea determinatului

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}$$

este:

A 6 B 4 C 2 D 0 E -2 .

167 Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ este o matrice inversabilă astfel ca $A + A^{-1} = 2I_n$, atunci are loc egalitatea:

- A $A = 3I_n$ B $A^3 + A^{-3} = 2I_n$ C $A = -A$ D $A^2 + A^{-2} = I_n$ E $A - A^{-1} = 2I_n$.

Fie x_1, x_2, x_3, x_4 rădăcinile polinomului $P = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

168 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$ este: A -1 B 1 C -2 D $1/2$ E 0

169 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ este: A 1 B -1 C -2 D -4 E 0

170 $x_1^8 + x_2^{18} + x_3^{28} + x_4^{38}$ este: A 1 B -2^3 C 2^4 D -1 E $4(1+i)$

Se consideră matricea: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$.

171 Determinantul matricei A este: A $16i$ B $-16i$ C 16 D -16 E 0

172 A^4 este: A I_4 B $2I_4$ C $4I_4$ D $16I_4$ E $256I_4$

173 Numărul soluțiilor $n \in \mathbb{Z}$ ale ecuației matriceale $16A^{8n} + 16I_4 = 257A^{4n}$ este:

- A 16 B 8 C 4 D 2 E 1

Se dă matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

174 $\det A$ este: A 1 B 0 C -1 D 2 E ∞

175 Numărul de soluții în $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ale ecuației $X^2 = A$ este:

- A 10 B 1 C 2 D 0 E ∞

176 Numărul soluțiilor ecuației $X^2 = I_2$ în $\mathcal{M}_2(\mathbb{N})$ este:

- A 1 B 2 C 3 D 4 E 16 .

177 Fie $A \in M_{3,2}(\mathbb{C})$. Atunci $\det(A \cdot A^T)$ este:

- A strict pozitiv B strict negativ C zero D de modul 1 E 1

Se dă ecuația: $X^n = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $X \in M_2(\mathbb{R})$.

178 Determinantul matricei $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ este: A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

179 Câte soluții are ecuația pentru n impar? A 0 B 1 C 2 D n E o infinitate

180 Câte soluții are ecuația pentru n par? A 0 B 1 C 2 D n E o infinitate

181 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul $x + y + z = 0$, $x + 2y + az = 0$, $x + 4y + a^2z = 0$ are soluție nebanală, este:

- A \mathbb{R} B $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ C $\{1, 3\}$ D $\{1, 2\}$ E $\{2, 3\}$

182) Dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $n \in \mathbb{N}^*$, atunci:

- A $A^n = (a^2 + bc)I_2$ B $A^n = (a^2 + bc)^n I_2$ C $A^{2n} = (a^2 + bc)^n I_2$
 D $A^{2n+1} = (a^2 + bc)^n I_2$ E $A^{2n} = (a^2 + bc)^n A$.

183) Mulțimea valorilor parametrului real a pentru care sistemul de ecuații

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

este compatibil este: A \mathbb{R} B \emptyset C $\{-2, 1\}$ D $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ E $\{-2\}$.

184) Matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ verifică relația $A^3 = pA^2 + qA$ pentru:

- A $p = -2, q = 3$ B $p = -2, q = 2$ C $p = 3, q = -2$ D $p = -3, q = 2$ E $p = 1, q = 1$.

185) Mulțimea valorilor reale ale lui m , pentru care sistemul

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + 2my + z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

este compatibil determinat și soluția (x, y, z) verifică relația $x + y \geq z$, este:

- A $(-\infty, 1]$ B $[-1, \infty)$ C $(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \cup (1, \infty)$ D $(0, 1)$ E $(-1, 1)$.

186) Mulțimea valorilor lui $x \in \mathbb{R}$, pentru care determinantul

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & -1 & 2 \\ 1 & x^3 & -1 & 8 \\ 1 & x^2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

este nul, este: A $\{-1, 1, 2\}$ B $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1, -2\}$ C $\{-1, 1, -2\}$ D \emptyset E $\{1\}$.

187) Rangul matricei $\begin{pmatrix} b & 1 & 2 & 4 \\ 1 & a & 2 & 3 \\ 1 & 2a & 2 & 4 \end{pmatrix}$ este egal cu 2, dacă și numai dacă:

- A $a = 1, b = 1$ B $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ C $a = \frac{1}{2}, b = 1$ D $a = 2, b = 1$ E $a = 1, b = 3$.

188) Pe \mathbb{R} se definește legea de compoziție: $x * y = xy - ax + by$. Numerele $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care $(\mathbb{R}, *)$ este monoid sunt:

- A $a = b \neq 0$ B $a = 0, b = 1$ C $a = b = 0$ sau $a = -1, b = 1$ D $a = -1, b = 0$ E nu există astfel de numere.

Pe intervalul $(1, \infty)$ definim legea: $x * y = x^{\ln y}$

189 Această lege este: A) necomutativă B) comutativă C) neasociativă

190 Elementul unitate este: A) 1 B) e C) 10 D) 11 E) -1

191 Simetricul lui x este: A) $x' = e^x$ B) $x' = e^{\frac{1}{\ln x}}$ C) $x' = e^{-x}$ D) $x' = x$ E) $x' = \frac{1}{x}$

192 Fie grupurile (\mathbb{C}^*, \cdot) și (\mathbb{R}^*, \cdot) . Să se determine $a \in \mathbb{R}^*$ și $b \in \mathbb{R}$ astfel ca funcția $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$, $f(z) = a|z| + b$, să fie morfism de grupuri.

A) $a = 2, b = 1$ B) $a = -1, b = 1$ C) $a = 1, b = 0$ D) $a = -2, b = 3$ E) $a = 0, b = 2$.

193 Mulțimea elementelor inversabile ale monoidului $(\mathbb{Z}[i], \cdot)$ este:

A) $\{-2, 2\}$ B) $\{-1, 1, -i, i\}$ C) $\{1 - i, 1 + i\}$ D) $\{1, i, 2i, -2\}$ E) \emptyset .

194 Fie $m \in \mathbb{Z}$ și operația $*$ definită prin $x * y = xy + mx + my + a$. Valoarea lui a pentru care operația $*$ definește o structură de monoid pe \mathbb{Z} este:

A) $1 - m$ B) m^2 C) $m - 1$ D) 0 E) $m^2 - m$.

Pe mulțimea numerelor reale \mathbb{R} se definește legea de compoziție " $*$ " prin $x * y = xy - 2x - 2y + \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

195 Legea " $*$ " este asociativă pentru:

A) $\lambda = 1$ B) $\lambda = 2$ C) $\lambda = -1$ D) $\lambda = -3$ E) $\lambda = 6$

196 Mulțimea $M = (2; \infty)$ este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea " $*$ " pentru:

A) $\lambda = 2$ B) $\lambda = 3$ C) $\lambda < 3$ D) $\lambda \geq 6$ E) $\lambda > 6$

197 Legea " $*$ " are element neutru pentru:

A) $\lambda = 4$ B) $\lambda = 6$ C) $\lambda = -6$ D) $\lambda = 1$

198 Legea de compoziție $x * y = \sqrt{x^n + y^n}$, determină pe \mathbb{R} o structură de grup, dacă și numai dacă:

A) $n = 1$ B) $n = 3$ C) $n = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ D) $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}^*$ E) $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

199 În monoidul $(\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}), \cdot)$ mulțimea elementelor inversabile este:

A) $\{A \mid \det A \neq 0\}$ B) $\{A \mid \det A = 1\}$ C) $\{-I_2, I_2\}$
 D) $\{A \mid \det A^2 = 0\}$ E) $\{A \mid \det A \in \{-1, 1\}\}$.

200 Să se determine grupul $(G, *)$, știind că funcția

$$f: (0, \infty) \rightarrow G, \quad f(x) = x + 1,$$

este un izomorfism al grupurilor $((0, \infty), \cdot)$ și $(G, *)$.

A) $G = (0, \infty)$ și $x * y = xy$ B) $G = (1, \infty)$ și $x * y = xy$
 C) $G = (1, \infty)$ și $x * y = xy - x - y + 2$ D) $G = \mathbb{R}$ și $x * y = x + y$
 E) $G = (1, \infty)$ și $x * y = x + y - 1$.

- 201** Se consideră grupurile $G = (\mathbb{R}, +)$ și $H = (\mathbb{R}, *)$, unde $x*y = x+y+1$. Funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = ax + b$ este izomorfism de la G la H , dacă și numai dacă:
- A $a = b = 1$ B $a = -1, b = 1$ C $a \neq 0, b = -1$ D $a = 1, b \neq 0$
 E $a = 1$, și $b = 0$.

Fie funcția $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ între grupurile $((-1, 1), *)$ și $((0, \infty), \cdot)$, unde $x * y = \frac{x+y}{1+xy}$.

202 Funcția f păstrează unitățile grupurilor dacă:

- A $b = d$ B $a = c$ C $c = 0$

203 Funcția f este izomorfism între cele două grupuri dacă:

- A $a = b = d = 1, c = -1$ B $a = b = c, d = -1$ C $a = b = 1$ D $d = c = -1$

Fie monoidul (M, \cdot) unde $M = \{A_a \mid a \in \mathbb{R}\}$ cu $A_a = \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}$.

204 Matricea $A_1 \cdot A_1$ este:

- A A_1 B A_2 C A_3

205 Elementul unitate este:

- A I_3 B A_1 C A_0 D $A_{\frac{1}{2}}$

206 Inversul elementului A_1 este:

- A $A_{\frac{1}{4}}$ B A_{-1} C $A_{\frac{1}{2}}$ D A_2

Pe \mathbb{R} se consideră legea de compoziție $x * y = ax + by + c$, $a \neq 0, b \neq 0$.

207 $*$ este asociativă dacă și numai dacă

- A $a = b, c = 0$ B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$ C $a = b = c = 2$

208 $*$ este asociativă și admite element neutru dacă și numai dacă

- A $a = b = 1, c = 0$ B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$ C $a = b = c = 2$
 D $a = b = 2, c = 0$.

209 $(\mathbb{R}, *)$ este grup dacă și numai dacă

- A $a = b = 1, c = 0$ B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$ C $a = b = c = 2$
 D $a = b = 2, c = 0$ E alt răspuns

210 Funcția $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = ax$ este automorfism al grupului $(\mathbb{Z}, +)$ dacă și numai dacă:

- A $a = 1$, B $a = -1$ C $a \in \{-1, 1\}$ D $a \in \mathbb{Z}^*$ E $a \in \{0, 1\}$.

211 Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Mulțimea perechilor $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care imaginea funcției f este $\text{Im } f = [-3, 1]$ este:

- A $\{(0, 0)\}$ B $\{(1, -\sqrt{2})\}$ C $\{(2\sqrt{3}, -2), (-2\sqrt{3}, -2)\}$ D $\{(\frac{1}{2}, \sqrt{2}), (-\frac{1}{2}, \sqrt{2})\}$
 E $\{(0, 1), (1, 0)\}$.

212 Imaginea funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1}$, $a \in \mathbb{R}$, este inclusă în intervalul $[0, 2]$, dacă:

- A $a \geq 3$ B $a \leq -2$ C $a \in [-1, 0)$ D $a \in [0, 2]$ E $a \in (-2, -1)$.

213 Mulțimea valorilor lui x , pentru care este definit radicalul ${}^{6-x^2}\sqrt{x}$, conține:
 A 5 elemente B 7 elemente C un interval D 4 elemente E nici un element

214 Mulțimea numerelor complexe z care verifică ecuația $z^2 - 2|z| + 1 = 0$ este:
 A $\{-1, 1\}$ B $\{1 - i, i + 1\}$ C $\{-1, 1, (\sqrt{2} - 1)i, (1 - \sqrt{2})i\}$
 D $\{-1, 1, 1 - i\}$ E \emptyset .

215 Se consideră ecuația $ax^2 + bx + c = 0$, unde a, b, c sunt numere întregi impare. Care din următoarele afirmații este adevărată?
 A ecuația are o rădăcină pară B ecuația are o rădăcină impară
 C ecuația are două rădăcini pare D ecuația nu are rădăcini întregi
 E ecuația are două rădăcini impare.

216 Ecuația $\sqrt{mx^2 + x + 1} + \sqrt{mx^2 - x + 1} = x$ are soluții reale dacă și numai dacă: A $m = 0$ B $m = 1$ C $m = \frac{1}{2}$ D $m = \frac{1}{4}$ E $m > 0$.

217 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația
$$x^4 + 4x^3 + ax^2 + 4x + 1 = 0$$
are toate rădăcinile reale este:
 A $(-\infty, -10]$ B $(-\infty, -10] \cup \{6\}$ C $[4, \infty)$ D $\{0\}$ E \emptyset .

218 Soluțiile ecuației $1 - 3^{x-1} + 2^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{x}{2}} 3^{\frac{x-1}{2}} = 0$ aparțin mulțimii:
 A $[-3, 0]$ B $[0, 2]$ C $\{0; -2\}$ D $[3, \infty)$ E $\{\frac{1}{2}\}$.

219 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care $\log_a(x^2 + 4) \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}$, este:
 A $(1, 2]$ B $[-2, 0)$ C $(0, 4]$ D $[2, 3]$ E $(1, 3)$.

220 Soluția x a ecuației $\log_x(x+1) + \log_{x^3}(x^3+1) = 2\log_{x^2}(x^2+1)$ verifică:
 A $x \in [0, 1)$ B $x \in \emptyset$ C $x \in (2, 3)$ D $x \in (3, 4)$ E $x \in (1, 2)$

221 Cel mai mare termen al dezvoltării binomului $(1 + \sqrt{2})^{100}$ este:
 A T_{57} B T_{58} C T_{59} D T_{60} E T_{61} .

222 Fie m, n, p numere naturale nenule, $m \neq n$. Dacă într-o progresie aritmetică avem $a_n = m$, și $a_m = n$, atunci a_p este egal cu:
 A $m + n - p$ B $p - m - n$ C $m + n - 2p$ D $2p - m - n$ E $m + n + p$.

Fie polinomul $P(x) = x^3 - x^2 - x + a$, unde a este un parametru real.
223 Valoarea lui a pentru care polinomul are o rădăcină dublă întreagă este:
 A $a = 1$ B $a = -1$ C $a = 2$ D $a = \frac{1}{2}$ E $a = -\frac{3}{2}$

224 Valoarea lui a pentru care polinomul are o rădăcină triplă întreagă este:
 A $a = 1$ B nu există un astfel de a C $a = -1$ D $a = 2$ E $a = -2$

Fie $x_n = (2 + \sqrt{3})^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- 225** Câte perechi $(a_n, b_n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ cu proprietatea $x_n = a_n + b_n\sqrt{3}$ există pentru n fixat?
 A 0 B 1 C 2 D 3 E o infinitate
- 226** Valoarea lui $a_n^2 - 3b_n^2$ este: A 0 B 1 C 2 D 3 E $\sqrt{3}$
- 227** Câte soluții are ecuația $x^2 = 3y^2 + 1$ în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?
 A 1 B 3 C 5 D 6 E o infinitate

228 Fie x_1, x_2, x_3, x_4 și x_5 rădăcinile ecuației $x^5 + x^4 + 1 = 0$.

Valoarea sumei $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i^4}$ este: A -4 B -3 C -2 D -1 E 0

Ecuația $x^4 - 8x^3 + ax^2 - bx + 16 = 0$ are toate rădăcinile pozitive, $a, b \in \mathbb{R}$.

- 229** Media aritmetică a rădăcinilor x_1, x_2, x_3, x_4 este A 1 B 2 C 0 D 4 E 8
- 230** Media geometrică a rădăcinilor x_1, x_2, x_3, x_4 este A 2 B 1 C 4 D 0 E 16
- 231** Valorile parametrilor $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația are toate rădăcinile reale și pozitive sunt:
 A $a = 1, b = 0$ B $a = 24, b = 32$ C $a = 24, b = 1$ D $a = 32, b = 24$ E $a = 1, b = 32$

Fie $x_1, x_2 \in \mathbb{C}$ rădăcinile ecuației $x^2 + x + 1 = 0$.

- 232** Valoarea sumei $x_1 + x_2$ este: A -1 B 0 C 1 D 2 E ∞
- 233** Valoarea sumei $x_1^3 + x_2^3$ este: A -2 B 3 C 0 D 2 E -3
- 234** Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o matrice, $A \neq O_2$ astfel încât

$$\det(I_2 - A) \cdot \det(x_1 I_2 - A) = x_1^2.$$

Valoarea lui $\det(I_2 + x_1 A + x_1^2 A^2)$ este: A -1 B 0 C 2 D x_1 E 1

235 Dacă $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A \neq O_2$ și există $n \geq 6$ astfel ca $A^n = O_2$, atunci valoarea minimă a lui $p \in \mathbb{N}^*$ pentru care $A^p = O_2$ este: A 2 B 3 C 4 D 5 E 6.

236 Mulțimea $G = \{z \in \mathbb{C} \mid az^n = b\}$, $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$, este un subgrup al grupului (\mathbb{C}^*, \cdot) dacă: A $b = 0$ B $a = b$ C $|a| = |b|$ D $a = -b$ E $a^n = b$.

237 Câte elemente inversabile are monoidul $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], \cdot)$?

A 0 B 1 C 2 D 4 E o infinitate

238 Funcția $f(x, y) = \frac{ax + by}{1 + xy}$, $a, b \in \mathbb{R}$, este o lege de compoziție pe intervalul $(-1, 1)$ dacă:

A $a = b = 2$ B $a + b \in (-1, 1)$ C $a \in (-1, 1)$ și $b \in (-1, 1)$ D $a = b \in [-1, 1]$
 E $a + b = 1$.

239 Fie $x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$, $x, y \in (-1, 1)$. Numărul $\frac{1}{2} * \frac{1}{3} * \dots * \frac{1}{1000}$ este:

A $\frac{500499}{500502}$; B $\frac{500499}{500501}$; C $\frac{500500}{500501}$; D $\frac{500501}{500502}$; E $\frac{500400}{500501}$.

240 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$ este: A $\frac{1}{2}$ B 4 C 1 D ∞ E 0

241 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{x}{2^n} \right)^{2^n}$ este: A e B $\frac{2}{x}$ C e^x D e^{-x} E $\frac{1}{e}$

242 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (\sqrt[n]{n} - 1)$ este: A 1 B e C ∞ D 0 E $\frac{1}{e}$

243 Se dă șirul cu termeni pozitivi $(a_n)_{n \geq 0}$ prin relațiile:
 $a_0 = 2; a_1 = 16; a_{n+1}^2 = a_n a_{n-1}, \quad \forall n \geq 1.$
 Limita șirului $(a_n)_{n \geq 0}$ este: A 1 B 2 C 4 D 8 E ∞

244 Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin: $x_{n+1} - a x_n + 2 = 0, \quad x_0 = a.$
 Mulțimea valorilor parametrului real a pentru care șirul (x_n) este strict descrescător este:
 A \emptyset B $(-1, 2)$ C $(-1, 1)$ D $(0, \infty)$ E $(0, 2).$

245 Fie $a \in \mathbb{R}, a > 0$ un număr fixat. Se consideră șirurile $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ definite prin
 $x_{n+1} = a^{\frac{1}{(n+1)!}} \cdot x_n^{\frac{1}{n+1}}, \quad n \geq 1, x_1 = 1, \quad b_n = \prod_{k=1}^n x_k.$
 Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ este: A \sqrt{a} B a C a^2 D ∞ E 0

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = x_n + \frac{2}{x_n}, \quad x_0 = 1.$
 246 Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ este: A 0 B 1 C e D ∞ E nu există

247 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}}$ este egală cu: A 1 B 2 C 3 D π E ∞

248 Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, definit prin relația de recurență

$$x_{n+1} = e^{x_n} - 1, \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

Numărul valorilor lui x_0 pentru care șirul este constant este:

- A 0 B 1 C 2 D 5 E 10

249 Șirul este crescător dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:

- A $(-\infty, 0)$ B $[0, \infty)$ C $(-\infty, 0]$ D $(0, \infty)$ E \mathbb{R}

250 Dacă $x_0 > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este: A ∞ B 0 C nu există D 1 E $2e$

251 Șirul este convergent dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:

- A \emptyset B $\{0\}$ C $(-\infty, 0]$ D $(-\infty, 0)$ E $(0, \infty)$

252 Pentru $x_0 = -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ este: A -2 B -1 C 0 D 1 E nu există

Valorile limitelor următoare sunt:

253 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2}$ A 1 B 0 C $\frac{1}{2}$ D 2 E ∞

254 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt[n]{2})^n$ A $\frac{1}{2}$ B 0 C 1 D 2 E ∞

255 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt{2})(2 - \sqrt[3]{2}) \cdots (2 - \sqrt[n]{2})$ A 0 B 1 C 2 D $\sqrt{2}$ E e

256 Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere reale, astfel ca șirul

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - a_n \ln n,$$

$n \geq 1$, să fie mărginit. Limita șirului $(a_n)_{n \geq 1}$ este: A e B 0 C ∞ D 1 E $\frac{1}{e}$

257 Fie $a \in \mathbb{R}$ astfel încât șirul $(x_n)_{n \geq 1}$,

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - a \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right),$$

să fie mărginit. Limita lui este: A 0 B $\ln 2$ C 2 D $-\ln 2$ E $\frac{1}{2}$

258 Valoarea limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+(-1)^n}{3n-(-1)^n}$ este:

- A 3 B 0 C ∞ D 1 E nu există, conform teoremei Stolz-Cesaro.

259 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n^3 + 2n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - 1}$ este: A 0 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{3}$ D 1 E $\frac{4}{3}$

260 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 3n + 1}{n^2 + 1}\right)^{\frac{n^2 + n + 1}{n+1}}$ este: A e^6 B e^{-1} C e^{-3} D e^{-2} E e^9

261 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{2n})}{\ln(1 + e^{3n})}$ este: A 1 B $\frac{1}{3}$ C 2 D $\frac{2}{3}$ E $\ln 2$

262 Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2n}{3n + 1}$ este: A $\frac{1}{3}$ B -2 C ∞ D $\frac{2}{3}$ E $-\frac{1}{3}$

263 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 1} \right)^{\frac{n+1}{n^2+1}}$ este: A 0 B 1 C 2 D e E ∞

264 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{(k+1)^2}{k(k+2)}$ este: A 5 B 4 C 1 D 2 E 3

265 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)\sqrt{k} + k\sqrt{k+1}}$ A 1 B $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ D ∞ E nu există

266 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k-1}}{(1+2^k)(1+2^{k+1})}$ este: A $-\frac{1}{3}$ B $-\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{6}$ E $\frac{1}{2}$

267 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$ este: A 0 B $\frac{1}{3}$ C $\frac{2}{3}$ D 1 E $\frac{4}{3}$

268 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}}$, unde (a_k) , $k \in \mathbb{N}^*$, $a_1 > 0$, formează o progresie aritmetică cu rația $r > 0$, este: A ∞ B $\frac{1}{a_1 r}$ C 1 D a_1 E 0

269 Fie $S = \sum_{k=2}^n \frac{k^2 - 2}{k!}$, $n \geq 2$. Alegeți afirmația corectă:
 A $S < 3$ B $S > 3$ C $S = e$ D $S < 0$ E $S = e - \frac{1}{2}$

270 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$ A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{2}$ C 0 D -1 E nu există

271 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{6}{k(k+1)(k+3)}$ A $\frac{2}{3}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{7}{6}$ D 1 E $\frac{3}{2}$

272 Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = \cos(\pi\sqrt{4n^2 + n + 1})$, este:
 A $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B $\frac{1}{2}$ C 0 D nu există E 1.

273 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{2^n n^n}$ A 0 B ∞ C 1 D e E 2

274 Fie $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $q > 0$. Se cere valoarea limitei:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{qn+1}{qn} \frac{qn+p+1}{qn+p} \dots \frac{qn+np+1}{qn+np}.$$

A $\sqrt[p]{\frac{p}{q}}$ B $\sqrt[p]{\frac{p+q}{q}}$ C $\sqrt[p]{\frac{q}{p+q}}$ D $p \sqrt[p]{\frac{p}{q}}$ E $p^2 \sqrt[p]{\frac{p}{q}}$

275 Fie x_0 un întreg pozitiv. Se definește șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin

$$x_{n+1} = \begin{cases} \frac{x_n}{2}, & \text{dacă } x_n \text{ este par,} \\ \frac{1+x_n}{2}, & \text{dacă } x_n \text{ este impar,} \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots$$

Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ este:

A 0 B 1 C ∞ D e E Nu există pentru unele valori ale lui x_0

276 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a} + \sqrt[3]{a} + \dots + \sqrt[n]{a} - n}{\ln n}$, $a > 0$, este:

A 0 B $\ln a$ C ∞ D e E a

277 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \right)$ este:

A 1 B $\frac{7}{2}$ C $\frac{8}{3}$ D $\frac{3}{2}$ E 0

278 Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{(2n)^k}$ este

A 0 B 1 C $e^{\frac{1}{2}}$ D e^2 E ∞ .

279 Fie $p_n = \prod_{k=1}^n \cos(2^{k-1}x)$, $x \neq k\pi$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ este:

A 1 B $\frac{\cos x}{x}$ C 0 D $\frac{\sin x}{x}$ E nu există

280 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n2^n + k}$ este:

A 0 B 1 C $\frac{1}{2}$ D 2 E ∞ .

281 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{kC_n^k}{n2^n + k}$ este:

A 0 B 1 C $\frac{1}{2}$ D 2 E ∞ .

282 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\cos n\pi}{n} \right)^n$ este:

A ∞ B 0 C 1 D e E nu există

283 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^n(x^2 + 4)}{x(x^n + 1)}$, $x > 0$ este:

A $\frac{1}{x}$ B ∞ C x D $\frac{x^2+4}{x}$ E alt răspuns

284 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arcsin \frac{k}{n^2}$ este:

A 0 B 1 C ∞ D $\frac{1}{2}$ E 2π

285 Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 2}$, $x_n = \sqrt[n]{1 + \sum_{k=2}^n (k-1)(k-1)!}$.

Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ este:

A ∞ B $\frac{1}{e}$ C 0 D 1 E e .

286 Fie $x \in \mathbb{R}$. Notăm cu $[x]$ partea întregă a numărului x . Limita șirului

$$x_n = \frac{[x] + [3^2x] + \dots + [(2n-1)^2x]}{n^3}, \quad n \geq 1,$$

este:

- A $\frac{x}{2}$ B 1 C 0 D $\frac{3x}{4}$ E $\frac{4x}{3}$

287 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln (a^{\frac{1}{n}} + a^{\frac{2}{n}} + \dots + a^{\frac{n}{n}})$, unde $a \in (1, \infty)$, este:

- A $1 - \ln a$ B $1 + \ln a$ C $2 + \ln a$ D $-\ln a$ E $\ln a$

288 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n}}{\ln^2 n}$ este:

- A 1 B 0 C $\frac{1}{2}$ D 2 E nu există

289 Șirul $a_n = 1^9 + 2^9 + \dots + n^9 - a n^{10}$, $a \in \mathbb{R}$, este convergent dacă:

- A $a = 9$ B $a = 10$ C $a = 1/9$ D $a = 1/10$
 E nu există un astfel de a .

290 Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = ac + (a+ab)c^2 + \dots + (a+ab+\dots+ab^n)c^{n+1}$. Atunci, pentru orice $a, b, c \in \mathbb{R}$ cu proprietățile $|c| < 1$, $b \neq 1$ și $|bc| < 1$, avem:

- A (x_n) nu este convergent B $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ C $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$
 D $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a+bc}{(1-ab)c}$ E $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{ac}{(1-bc)(1-c)}$.

291 Pentru numărul natural $n \geq 1$, notăm cu x_n cel mai mare număr natural p pentru care este adevărată inegalitatea $3^p \leq 2008 \cdot 2^n$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ este:

- A 0 B 1 C $\log_3 2$ D 2008 E Limita nu există.

Fie $0 < b < a$ și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unde $x_0 = 1$, $x_1 = a + b$,

$$x_{n+2} = (a+b)x_{n+1} - abx_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

292 Dacă $0 < b < a$ și $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ atunci

- A $l = a$ B $l = b$ C $l = \frac{a}{b}$ D $l = \frac{b}{a}$ E nu se poate calcula

293 Dacă $0 < b < a < 1$ și $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x_k$ atunci:

- A $L = 1$ B $L = \frac{1}{(1-a)(1-b)}$ C $L = \frac{2-a-b}{(1-a)(1-b)}$ D $L = \frac{a+b}{(1-a)(1-b)}$
 E $L = \frac{a+b-1}{(1-a)(1-b)}$

294 Mulțimea tuturor valorilor lui a pentru care șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin recurența $x_0 = a$, $x_{n+1} = x_n^2 - 4x_n + 6$, este convergent este:

- A $\{1\}$ B $[-1, 2]$ C $\{0\}$ D $(0, 1)$ E $[1, 3]$.

295 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(p+n)!}{n!n^p} \right)^n$, $p \in \mathbb{N}$ este:

- A ∞ B 0 C e D $e^{1/6}$ E $e^{\frac{p(p+1)}{2}}$.

296 Câte șiruri convergente de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ verifică relația

$$\sum_{k=1}^{10} x_{n+k}^2 = 10,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$?

A 1 B 10 C 0 D o infinitate E 2

297 Șirul (x_n) , $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ are limita $\frac{\pi^2}{6}$. Să se calculeze limita șirului (y_n) ,
 $y_n = 1 + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2}$.

A $\frac{\pi^2}{8}$ B $\frac{\pi^2}{3}$ C $\frac{\pi^2}{16}$ D $\frac{\pi}{3}$ E $\frac{\pi^2}{12}$.

298 Fie x_n soluția ecuației $\operatorname{tg} x = x$ din intervalul $(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$, $n \in \mathbb{N}$. Valoarea limitei

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n \right)$$

este:

A 1 B 0 C $\frac{1}{\pi}$ D $\frac{\pi}{2}$ E $\frac{\pi}{4}$

299 Mulțimea valorilor funcției $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ este:

A $[-1, e^{\frac{1}{e}}]$ B \mathbb{R} C $[0, 1]$ D $(0, \frac{1}{e}) \cup [1, e]$ E $(0, e^{\frac{1}{e}}]$

300 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x^{x^2}}{(1-x)^2}$.

A e B -1 C 1 D $-e$ E 0

301 $\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x$

A 0 B 1 C e D ∞ E nu există

302 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \overbrace{\sin(\sin(\dots(\sin x)\dots))}^{\text{de } n \text{ ori sin}}}{x^3}$

A 0 B $n/2$ C $n/3$ D $n/4$ E alt răspuns

303 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \sqrt{2})^{\sqrt{2}} - (x - \sqrt{2})^{\sqrt{2}}}{x^{\sqrt{2}-1}}$.

A $\sqrt{2}$ B $2\sqrt{2}$ C 4 D 0 E alt răspuns.

304 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax)^{\frac{1}{x}} - (1+x)^{\frac{a}{x}}}{x}$, $a \in \mathbb{R}$.

A $\frac{a(1-a)}{2}$ B $a(1-a)$ C 0 D ae E $\frac{a(1-a)}{2}e^a$

305 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arcsin(\sin x)}{x}$

A 0 B 1 C ∞ D $-\infty$ E nu există

306 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ este:

A 0 B ∞ C nu există D -1 E 1.

307 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(ax^2 + bx + c)}{x^2 - 1}$, unde $a, b, c \in \mathbb{R}$ astfel încât $a + b + c = \pi$, este:

- A $a + b$ B $\pi - a - b$ C $2a + b$ D $-\frac{2a+b}{2}$ E $2(a + b)$.

308 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}$ este: A 0 B 1 C nu există D $\frac{1}{2}$ E ∞ .

309 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{\sqrt[3]{x+8} - 2}$ A 3 B $\frac{1}{3}$ C $\frac{2}{3}$ D nu există E 0

310 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx}{x}$
 A $n(n+x)$ B n^2 C $\frac{n(n+1)}{2}$ D $(n+1)(n+2)$ E $n(n+3)$

311 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^m \operatorname{arctg} k^2 x}{\sum_{k=1}^m \ln(1 + k^3 x)}$ A $\frac{m(m+1)}{m+2}$ B $\frac{2}{3} \frac{2m+1}{m(m+1)}$ C $\frac{(m+1)(2m+1)}{2m^2}$ D 0 E $\frac{\pi}{2e}$

312 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x a_2^{2x} \dots a_n^{nx} - 1}{x}$, $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$.
 A $\ln(a_1 a_2 \dots a_n)$ B $\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n$ C $\ln(a_1 a_2^2 \dots a_n^n)$ D $e^{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}$
 E $e^{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$

313 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (2x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{x^n}$ A 2^n B $2^n - 3^n$ C 1 D $3^n + 1$ E 0

314 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$ A ∞ B $-\infty$ C 0 D 1 E $\frac{1}{2}$

315 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + x + 1} \right)$ A -1 B 0 C $\frac{1}{2}$ D $-\frac{1}{2}$ E 1

316 $\lim_{x \rightarrow 0} x e^{-\frac{1}{x}}$ A 0 B e C $-\infty$ D nu există E 1

317 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - ex \right)$ A $-\frac{e}{2}$ B e C 0 D ∞ E $2e$

Valoarea limitelor:

318 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^n - \sin^n x}{x^{n+2}}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$; A ∞ B 0 C $-\frac{n}{6}$ D $\frac{n}{6}$ E 1

319 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$. A e B $\frac{1}{2}$ C $\frac{e}{2}$ D $-\frac{1}{2}$ E 0

320 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(\sin x) - x}{x^3}$ A $1/3$ B $1/6$ C ∞ D -1 E $\pi/2$

321 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$, $a, b, c > 0$, A $\sqrt[3]{abc}$ B nu există C $\ln abc$ D $\frac{a+b+c}{3}$ E 1

322 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$ A 1 B 0 C e D \sqrt{e} E $\frac{1}{\sqrt{e}}$

323 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ A 1 B e^2 C $e^{\frac{3}{2}}$ D $e^{\frac{1}{2}}$ E e^3

324 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$ A $\sqrt[3]{2}$ B $\sqrt[3]{e}$ C e D e^{-1} E $e^{\frac{3}{2}}$

325 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + x + 1} \frac{\ln(e^x + x)}{x} \right)$ este: A 0 B 1 C -1 D $-\frac{1}{2}$ E ∞

326 $\lim_{x \rightarrow 0} (a^x + x)^{\frac{1}{\sin x}}$, $a > 0$, este: A ae B $e^{\ln a}$ C a D 1 E e^a

327 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x^2)^{\frac{1}{\ln x}}$ A 2 B e^2 C 1 D 2 E nu există

328 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \left(e^{\frac{1}{n+1}} - e^{\frac{1}{n}} \right)$: A -1 B 1 C $-\infty$ D Limita nu există E e .

329 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2(x) + \operatorname{tg}^2(2x) + \dots + \operatorname{tg}^2(nx)) \right)^{\frac{1}{n^3 x^2}}$ este:
 A $e^{\frac{1}{3}}$ B e^3 C $\frac{1}{e}$ D 1 E ∞

330 Dacă $|a| > 1$, atunci limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + a^n}$ are valoarea:
 A 0 B 1 C 2 D ∞ E limita nu există, pentru $a < -1$.

331 Pentru ce valori ale parametrilor reali a și b avem
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 2} - ax - b \right) = 0$?
 A $a = b = 1$ B $a = b = -1$ C $a = 2, b = 1$ D $a = 1, b = 2$ E $a = 2, b = \frac{3}{2}$.

Se consideră funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arcsin(x - \sqrt{1 - x^2})$, unde D este domeniul maxim de definiție.

332 Mulțimea punctelor de continuitate ale funcției este:
 A $[-1, 1]$ B $(-1, 1)$ C $(0, 1)$ D $[0, 1]$ E alt răspuns.

333 Mulțimea punctelor de derivabilitate ale funcției este:
 A $[-1, 1]$ B $[0, 1]$ C $(0, 1)$ D $(0, 1)$ E alt răspuns.

334 Mulțimea punctelor în care funcția are derivată este:
 A $[-1, 1]$ B $[0, 1]$ C $(0, 1)$ D $(0, 1)$ E alt răspuns.

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Ce concluzie se poate trage asupra funcției f dacă:

335

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ și } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- A f este strict crescătoare B f este injectivă C f este surjectivă D f este inversabilă
 E f nu este injectivă

336

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- A f este descrescătoare B f este injectivă C f este surjectivă D f este inversabilă
 E f nu este injectivă

337

f este injectivă.

- A f este surjectivă B f este strict monotonă C f are cel puțin două zerouri
 D f este inversabilă E f este o funcție impară

338

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^x + x)^{n+1} - e^{(n+1)x}}{xe^{nx}} \text{ este: } \quad \text{A } 1 \quad \text{B } n+1 \quad \text{C } 0 \quad \text{D } \infty \quad \text{E } e.$$

339

$$\text{Funcția } f \text{ definită prin } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{nx} + x}{e^{nx} + 1}$$

- A este definită numai pentru $x \leq 0$ B este definită și continuă pe \mathbb{R}
 C este definită și derivabilă pe \mathbb{R}
 D este definită pe \mathbb{R} dar nu este continuă pe \mathbb{R}
 E este definită numai pentru $x = 0$.

340

$$\text{Fie funcția } f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + x}{x^{2n} + 1}.$$

Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- A f nu e bine definită pe $(-\infty, -1)$ căci limita nu există.
 B f este continuă în 1.
 C singurul punct de discontinuitate este $x = 1$.
 D f are limită în $x = -1$ E f continuă pe $(-\infty, 1)$.

341

Mulțimea punctelor de continuitate ale funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^{2n}}{1 + x + x^2 + \dots + x^{2n}}$$

este:

- A \mathbb{R} B $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ C \mathbb{R}^* D $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ E $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

342

Ecuția $x^2 + 1 = me^{-\frac{1}{x}}$, unde m este un parametru real, are trei soluții reale și distincte dacă:

- A $m = -1$ B $m = 2e$ C $m = \pi$ D $m = 3\sqrt{2}$ E $m = 7$

343

Ecuția $m e^{\frac{2}{x-1}} = x$, $m \in \mathbb{R}$, are două rădăcini reale și distincte dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A $(0, \infty)$ B $(1, \infty)$ C $(-\infty, 1)$ D $(0, 1)$ E $(-1, 1)$

344

Fie funcția $f(x) = \frac{|x^3 - 1|}{ax^2 + bx}$. Valorile numerelor reale a și b pentru care dreapta $y = x + 4$ este asimptotă la ∞ sunt:

- A $a = 4; b = 1$ B $a = 1; b = -4$ C $a = -4; b = 1$ D $a = 1; b = 4$ E $a = -1; b = -4$

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x+1)^3}{x^2 - x + 1}$.

345 Ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul în care graficul funcției intersectează axa Oy este:

A $y - 2x + 1 = 0$ B $2y - 2x + 1 = 0$ C $y - 4x - 1 = 0$ D $4y - x + 1 = 0$ E $4y - 4x + 1 = 0$

346 Ecuația normalei la graficul funcției f în punctul în care graficul funcției intersectează axa Oy este:

A $2y - 2x + 1 = 0$ B $\frac{1}{4}y - 2x + 1 = 0$ C $y - x + 1 = 0$ D $y + \frac{1}{4}x - 1 = 0$ E $4y - x + 1 = 0$

347 Fie polinomul $P(x) = ax^3 + x^2 - bx - 6$, $a, b \in \mathbb{R}$. Valorile lui a și b pentru care polinomul $P(x+1) + P'(x)$ este divizibil cu $(x-1)$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{x(bx+1)(x-1)} = \frac{1}{3}$ sunt:

A $a = -1, b = 2$ B $a = 1, b = 0$ C $a = 3, b = \frac{1}{2}$ D $a = 0, b = 0$
 E nu există astfel de a și b

348 Funcția $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}}$, $x \in (0, \infty)$, admite asimptota oblică de ecuație:

A $y = -x - 1$ B $y = -x + \frac{1}{2}$ C $y = -x + 1$ D $y = -x$ E $y = x$.

349 Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + bx + 2}{x^2 + 2x + c}$, D -domeniul maxim de definiție al lui f . Mulțimea tuturor valorilor $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ pentru care funcția f are o singură asimptotă verticală și graficul lui f nu intersectează asimptota orizontală este:

A $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | b \neq 0, c = 1\}$ B $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | c = 1\}$
 C $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | b = 3, c = 1\}$ D $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | c = 1, b = 2 \text{ sau } c = 1, b = 3\}$
 E nici unul din răspunsurile anterioare nu e corect.

350 Graficul funcției $f : \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x - 3}$ admite:

A o asimptotă verticală și una orizontală
 B o asimptotă verticală și una oblică
 C o asimptotă orizontală și una oblică
 D o asimptotă verticală și două oblice
 E o asimptotă verticală și două orizontale.

351 Valorile lui $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(m-1)^2 x^2 + 1}}{3x + 2} = -1$ sunt:

A $-2, 4$ B $-1, 3$ C $2, 3$ D $-1, 4$ E $-2, 2$

352 Funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x-a}{x^2-b}$, $a, b \in \mathbb{R}$, are pe domeniul maxim de definiție două asimptote verticale dacă și numai dacă:

A $a = b = 0$ B $a = 1, b = -1$ C $a = b = 1$ D $a = 2, b = 1$ E $b > 0, a^2 - b \neq 0$.

353 Abscisele punctelor în care graficele funcțiilor $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = x^6 \quad \text{și} \quad g(x) = 2x^5 - 2x - 1$$

sunt tangente sunt:

- A $\frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$ B $\frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$ C $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ D nu există E 0

354 Egalitatea

$$\operatorname{arctg} a + \operatorname{arctg} b = \operatorname{arctg} \frac{a + b}{1 - ab}$$

are loc dacă și numai dacă numerele reale a și b satisfac condiția:

- A $ab > 1$ B $ab < 1$ C $ab \neq 1$ D $ab > 0$ E $b = 0, a \in \mathbb{R}$.

355 Numărul de valori ale parametrului real $a \in [0, 1]$ pentru care funcția $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - |x - a|$, este convexă pe $[0, 1]$ este:

- A 0 B 1 C 2 D 4 E infinit.

356 Fie $Q(x)$ câtul împărțirii polinomului $99(x^{101} - 1) - 101x(x^{99} - 1)$ la $(x - 1)^3$. Valoarea $Q(1)$ este:

- A 9999 B 18000 C 5050 D 3333 E alt răspuns.

357 Funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă și sunt verificate condițiile:

$f(0) = 2, f'(x) = 3f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Valoarea $f(\ln 2)$ este: A 2 B 4 C 6 D 16 E 32

358 Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru orice funcție $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ care are derivată strict pozitivă?

- A f este crescătoare pe $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ B f este crescătoare pe $(0, \infty)$
 C f este descrescătoare D f este mărginită E f este convexă.

359 O funcție polinomială neconstantă $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, este strict crescătoare dacă și numai dacă:

- A $P'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ B $P'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ C $P'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
 D $P''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ E $P''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

360 Să se studieze derivabilitatea funcției $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sqrt{x + 3 - 4\sqrt{x - 1}}.$$

- A f derivabilă pe $(2, \infty)$ B f are în $(5, 0)$ punct de întoarcere
 C f are în $(5, 0)$ punct unghiular D f este derivabilă în $x = 5$
 E f este derivabilă numai pe $(5, \infty)$.

361 Dacă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[5]{\frac{1}{6}x^3 - x} + \sin x$, atunci $f'(0)$ este:

- A $1/\sqrt[5]{120}$ B $-1/\sqrt[5]{120}$ C ∞ D nu există E $-\infty$

362 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

- A f nu e continuă în 0 B f este derivabilă în 0 C f nu are limită în 0 D $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$
 E f are limită la $+\infty$, egală cu 1, și la $-\infty$, egală cu -1 .

363 Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + \arcsin \frac{1}{x}$, unde D este domeniul maxim de definiție al funcției f . Mulțimea valorilor funcției f este:

- A $(-\infty, \frac{\pi}{2}]$ B \mathbb{R} C $(-\frac{\pi}{2}, \infty)$ D $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ E $(-\infty, -\frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2}, \infty)$.

Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + \sqrt{|x|} - x)$, unde D este domeniul maxim de definiție.

364 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}$ este: A 0 B 1 C -1 D e E ∞

365 $f'(\frac{1}{4})$ este: A 0 B 1 C -1 D $\frac{1}{2}$ E $-\frac{1}{2}$

366 Numărul punctelor de extrem local ale funcției f este: A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

367 Valoarea lui a pentru care funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x|x - a|$, este derivabilă pe \mathbb{R} este:

- A $a = 1$ B $a = -1$ C $a = 0$ D $a = 2$ E $a = -2$.

368 Fie g și h două funcții derivabile pe \mathbb{R} și $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = g(x)|h(x)|$. Dacă $h(x_0) = 0$, atunci funcția f este derivabilă în x_0 dacă și numai dacă:

- A $h'(x_0) = 0$ B $g(x_0) > 0$ C $g(x_0) = 0$ D $g(x_0)h'(x_0) = 0$ E alt răspuns

369 Funcția $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{x^2 + b}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x^2 - 3x + 3) + 2x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, unde $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$, este o funcție derivabilă pentru:

- A $a = 6, b = 2$ B $a = 8, b = 3$ C $a = 8, b = 30$ D $a = 10, b = 4$ E $a - 2b = 1$.

370 Derivata funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[6]{x^2}$, în punctul zero, este:

- A ∞ B 0 C $\frac{1}{3}$ D 1 E nu există.

371 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x$. Valoarea lui $(f^{-1})'(3)$ este:

- A 1 B -1 C $\frac{1}{3}$ D -2 E $\frac{1}{5}$.

372 Fie funcția $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x - 1}$, unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Valorile lui α și β pentru care f admite un extrem în punctul $M(0, 1)$ sunt:

- A $\alpha = 1, \beta = -1$ B $\alpha = 0, \beta = 1$ C $\alpha = \beta = 2$ D $\alpha = 3, \beta = -1$ E $\alpha = -1, \beta = 1$

373 Se consideră funcția $f : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -\ln(x^2 + x + 1) & ; -1 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x|x^2 - 4|} & ; x > 0 \end{cases}.$$

Notăm cu α numărul punctelor de extrem, cu β numărul punctelor unghiulare și cu γ numărul punctelor de întoarcere ale funcției f . Atunci:

- A $\alpha = 5, \beta = 0, \gamma = 2$ B $\alpha = 5, \beta = \gamma = 1$ C $\alpha = 5, \beta = 2, \gamma = 0$
 D $\alpha - \beta = 4, \beta - \gamma = 1$ E $\alpha = 4, \beta = 0, \gamma = 2$.

374 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + x^2) - x$. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

- A f e strict pozitivă pe \mathbb{R} B f e strict crescătoare pe \mathbb{R}
 C f e strict negativă pe \mathbb{R}
 D f verifică inegalitatea $f(x) > 0, \forall x \in (-\infty, 0)$
 E f verifică inegalitatea $f(x) > 0, \forall x \in (0, \infty)$.

375 Mulțimea valorilor parametrului real a pentru care ecuația $e^x - a = \ln(x + a)$ nu are nici o soluție este: A \mathbb{R} B \emptyset C $(-\infty, 1)$ D $(0, 1)$ E $(1, \infty)$

376 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 4$. Valoarea lui $(f^{-1})'(4)$ este:

- A 0 B 1 C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{116}$ E $\frac{1}{68}$.

377 Dacă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție cu derivata de ordinul al doilea continuă astfel încât $f(2) = f'(2) = f''(2) = 2$, iar funcția $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este definită prin $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 3})$, atunci:

- A $g(1) = g'(1) = 2$ B $g'(1) = \sqrt{2}$ C $g(1) + g''(1) \in \mathbb{N}$ D $g'(1) = g''(1) = 1$
 E $g'(1) = 1, g''(1) = \frac{5}{4}$.

Fie funcția f dată prin $f(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$

378 Mulțimea rădăcinilor derivatei de ordinul doi a funcției este:

- A $\{0\}$ B $\{-1; 0; 1\}$ C \emptyset D $\{0; 2\}$

379 Mulțimea rădăcinilor derivatei de ordinul trei a funcției este:

- A $\{0\}$ B $\{-1; 0; 1\}$ C \emptyset D $\{0; 2\}$

Fie $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două ori derivabilă astfel încât $f''(x) = \frac{1}{x}, \forall x > 0$ și $f(1) = f'(1) = 0$.

380 $f'(x)$ are expresia:

- A $-\frac{1}{x^2}$ B $1 - \frac{1}{x^2}$ C $\frac{1}{x^2} - 1$ D $\ln x$ E Alt răspuns

381 $f(x)$ are expresia:

- A $\frac{2}{x^3}$ B $\frac{2}{x^3} - 2$ C $x \ln x - x$ D $x \ln x + x - 1$ E Alt răspuns

382 Numărul soluțiilor reale ale ecuației $\ln x = 1 - \frac{1}{x}$ este:

- A 0 B 1 C 2 D 3 E Alt răspuns

Se dă funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^{x^4} + 2^{x^2 - 1}$.

383 Care este valoarea lui $f(-1)$?

- A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

384 Care este soluția inecuației $f(x) \leq 3$?

- A \emptyset B $[-1, 1]$ C $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ D $(-\infty, -1]$ E alt răspuns

385 Numărul punctelor de extrem local ale funcției f este:

- A 0 B 1 C 2 D 3 E 4

- Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-x^2}$
- 386** Suma pătratelor absciselor punctelor de inflexiune ale graficului funcției este egală cu:
 A 25 B 1 C $5 + \sqrt{17}$ D 5 E $5 - \sqrt{17}$
- 387** Aria mărginită de graficul funcției f' , dreptele $x = -2$, $x = 1$ și axa OX este egală cu:
 A $\frac{1}{e} - \frac{4}{e^2}$ B $\frac{4}{e^2} - \frac{1}{e}$ C $\frac{3}{e} - \frac{4}{e^4}$ D 1 E alt răspuns
- 388** Funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \alpha x^2 + 1 - \ln(1+x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, are două puncte de extrem local pentru:
 A $\alpha = -2$ B $\alpha = -1$ C $\alpha \in (-2, -1)$ D $\alpha > 2$ E $\alpha < -2$.
- 389** Se dă funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x(x^2 + 6x + m)$, unde m este un parametru real. Funcția f admite puncte de extrem pentru:
 A $m \in (-\infty, 10]$ B $m \in (10, \infty)$ C $m \in \mathbb{R}$ D $m \in (-\infty, 10)$ E $m \in [10, \infty)$
- 390** Inegalitatea $a^x \geq x + 1$ are loc pentru orice $x \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă:
 A $a = 1$ B $a = e$ C $a > 1$ D $a > e$ E $a < e$.
- 391** Dacă ecuația $a^x = x$, cu $a > 1$ are o singură soluție reală atunci:
 A $a = \frac{1}{e}$ B $a = e$ C $a = e^{\frac{1}{e}}$ D $a = e^e$ E $a = \frac{1}{e^e}$
- 392** Mulțimea valorilor pozitive ale lui a pentru care ecuația $a^x = x + 2$, are două soluții reale este:
 A $(1, \infty)$ B $(0, 1)$ C $(\frac{1}{e}, e)$ D $(\frac{1}{e^e}, e^e)$ E $(e^{\frac{1}{e}}, \infty)$
- 393** Mulțimea valorilor pozitive ale lui a pentru care inegalitatea $a^x \geq x^a$, are loc pentru orice $x > 0$ este:
 A $\{e\}$ B $(0, 1)$ C $(1, \infty)$ D $(\frac{1}{e}, 1)$ E $(1, e)$
- 394** Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}$ are proprietatea:
 A este crescătoare pe \mathbb{R}
 B este descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și crescătoare pe $[0, \infty)$
 C este impară D $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$
 E graficul funcției f intersectează axa Ox într-un punct.
- 395** Să se determine un punct $P(x_0, y_0)$ pe curba a cărei ecuație este $y = (x - 2)\sqrt{x}$, $x > 0$, în care tangenta să fie paralelă cu dreapta de ecuație $2y = 5x + 2$.
 A $P(4, 4)$ B $P(9, 21)$ C $P(1, -1)$ D $P(2, 0)$ E $P(3, \sqrt{3})$.
- 396** Valoarea parametrului real a pentru care graficul funcției $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \ln x + a x^2$, este tangent axei Ox este:
 A $-\frac{1}{e}$ B e C $2e$ D $-e$ E 1.
- 397** Funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sqrt{x^2 + a}$, $a \geq 0$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$ sunt tangente (au o tangentă comună într-un punct comun) dacă:
 A $a = 1 + e$ B $a = 0$ C $a = 1$ D $a = e - \pi$ E $a = -1$.

398 Ecuația tangentei la graficul funcției $f(x) = \ln \sqrt{\frac{2x-1}{x+1}}$ în punctul de abscisă $x = 2$ este:
 A $x - 7y - 2 = 0$ B $x - 6y - 2 = 0$ C $x - 5y - 2 = 0$ D $x - 4y - 2 = 0$ E $x - 3y - 2 = 0$.

399 Graficele funcțiilor $f(x) = ax^2 + bx + 2$ și $g(x) = \frac{x-1}{x}$ au tangentă comună în punctul de abscisă $x_0 = 1$ dacă:
 A $a + b = -1$ B $a = 0, b = 1$ C $a = 1, b = -2$ D $a = 3, b = -5$ E $a = 3, b = -4$.

400 Tangenta la graficul funcției $f(x) = (a \sin x + b \cos x)e^x$ în punctul $(0, f(0))$ este paralelă cu prima bisectoare, dacă:
 A $a = b = 1$ B $a = 2, b = 1$ C $a - b = 1$ D $a + b = 1$ E $a^2 + b^2 = 1$.

401 Fie x_1 cea mai mică rădăcină a ecuației $x^2 - 2(m+1)x + 3m + 1 = 0$. Atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} x_1$ este:
 A 1 B $\frac{3}{2}$ C 0 D $-\frac{1}{2}$ E -1

402 Mulțimea valorilor paramentului real a pentru care ecuația $ax - \ln|x| = 0$ are trei rădăcini reale distincte este:
 A $(-\infty, 0)$ B $(0, 1)$ C $(-e^{-1}, 0) \cup (0, e^{-1})$ D (e^{-1}, ∞) E \emptyset .

Fie funcția $f : (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = 2 \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}.$$

403 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ este: A π B 0 C $\frac{\pi}{2}$ D -1 E ∞

404 Mulțimea valorilor funcției este: A $\{-\pi, 0, \pi\}$ B $\{0\}$ C \mathbb{R} D $(-1, \infty)$ E $(0, \infty)$

405 Mulțimea valorilor lui $x \in \mathbb{R}$ pentru care este adevărată egalitatea

$$2 \operatorname{arctg} x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$$

este: A $(0, \infty)$ B $(-\infty, -1) \cup [1, \infty)$ C $[1, \infty)$ D $[-1, 1]$ E $[2, \infty)$.

Fie $f(x) = \frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{1+x^2} + \operatorname{arctg} |x|$.

406 Domeniul maxim de definiție al funcției este :

A $[-1, 1]$ B $(-1, 1)$ C \mathbb{R} D \mathbb{R}^* E $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

407 $f(\pi)$ este: A 1 B $\frac{\pi}{4}$ C π D $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E $\frac{\pi}{2}$.

408 Funcția este strict descrescătoare pe:

A \mathbb{R} B $(-1, 0)$ C $(0, 1)$ D $(1, \infty)$ E $(-\infty, -1]$.

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ o funcție care admite primitive și verifică relațiile $\cos f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$ și $|f(\pi) - \pi| \leq \pi$.

409 $f(100)$ este: A 16π B 8π C 4π D 2π E 0.

410) Mulțimea primitivelor funcției $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$, este:
 A $\arccos \sqrt{x} + C$ B $\arcsin \sqrt{x} + C$ C $\arccos \frac{1}{x} + C$ D $\arcsin \frac{1}{\sqrt{x}} + C$ E $\operatorname{arctg} \sqrt{x} + C$

411) Mulțimea primitivelor funcției $f : (\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$, este:
 A $x \operatorname{ctg} x + \ln \cos x + c$ B $-x \operatorname{ctg} x + \ln \cos x + c$ C $x \operatorname{tg} x + \ln \cos x + c$ D $-x \operatorname{tg} x - \ln(-\cos x) + c$ E $x \operatorname{tg} x + \ln(-\cos x) + c$.

412) Mulțimea primitivelor funcției $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin x}$, este:
 A $x + \operatorname{tg} \frac{x}{2} + c$ B $\frac{1}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$ C $x + 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + c$ D $\frac{2}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$ E $x + \frac{2}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$

413) Mulțimea primitivelor funcției $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$ este:
 A $\arcsin e^x + c$ B $\arccos e^x + c$ C $\operatorname{arctg} x$ D $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + c$ E $2\sqrt{e^{2x} - 1} + c$.

414) Mulțimea primitivelor funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x + 1}}$ este:
 A $\ln \frac{\sqrt{e^x + 1} - 1}{\sqrt{e^x + 1} + 1} + c$ B $\ln \frac{1}{\sqrt{e^x + 1} + 1} + c$ C $2\sqrt{e^x + 1} + c$
 D $\ln(\sqrt{e^x + 1} + 1) + c$ E $\ln(\sqrt{e^x + 1} - e^x) + c$.

415) Mulțimea primitivelor funcției $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x(x^3 + 1)}$ este:
 A $\ln x - \ln(x^3 + 1) + c$ B $\ln \frac{x^3}{x^3 + 1} + c$ C $\frac{1}{3} \ln \frac{x^3}{x^3 + 1} + c$
 D $\ln x + \operatorname{arctg} x + c$ E $\ln x \ln(x + 1) + c$.

416) Mulțimea primitivelor funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$ este:
 A $e^x \operatorname{arctg} x + c$ B $e^x(1 + x^2)^{-1} + c$ C $\frac{xe^x}{x^2 + 1} + c$ D $\frac{x^2 e^x}{x^2 + 1} + c$ E $\frac{(x+1)e^x}{x^2 + 1} + c$.

417) Mulțimea primitivelor funcției $f : (-\infty, -1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$ este:
 A $\arccos \frac{1}{x} + c$ B $\arcsin \frac{1}{x} + c$ C $-\operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + c$ D $\ln \sqrt{x^2 - 1} + c$ E $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + c$.

418) Mulțimea primitivelor funcției $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{e^x + \cos x}{e^x + \cos x + \sin x},$$
 este:
 A $\ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$ B $x + \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$
 C $\frac{x}{2} + \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$ D $\frac{1}{2}[x + \ln(e^x + \cos x + \sin x)] + c$
 E $\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$.

419 $\int_{-2}^0 \frac{x}{\sqrt{e^x + (x+2)^2}} dx$ este: A -1 B -2 C -e D 2 - e E alt răspuns

420 $\int_0^1 \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$ A $\frac{5\pi}{6\sqrt{2}}$ B $\frac{7\pi}{6\sqrt{2}}$ C $\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$ D $\frac{4\pi}{3\sqrt{2}}$ E $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

421 Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ are primitive dacă și numai dacă: A $a = 0$ B $a = 1$ C $a = -1$ D $a > 0$ E $a < 0$.

422 Fie $F: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ astfel ca: $F'(x) = \frac{1}{x}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$, $F(-1) = 1$ și $F(1) = 0$. Atunci $F(e) + F(-e)$ este: A 0 B 1 C 2 D 3 E nu există o astfel de funcție F .

Fie F o primitivă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x^2}$.

423 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x F(x)}{e^{x^2}}$ este: A 0 B 1 C $\frac{1}{2}$ D ∞ E e .

424 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x F(x)}{e^{x^2}}$ este: A ∞ B 1 C $\frac{1}{2}$ D 0 E e .

425 Integrala $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{(x+3)\sqrt{x+3}} dx$ este: A $-\frac{1}{16} - \ln \frac{15}{16}$ B $\ln 3 - 1$ C $\ln \frac{3}{4} - 1$ D $-\frac{1}{4} + \operatorname{arctg} \frac{1}{4}$ E $\frac{1}{4}$

426 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{dt}{2 + \cos t}$ A 0 B nu există C $\frac{1}{\sqrt{3}}$ D $\frac{1}{\sqrt{2}}$ E ∞

427 $\int_{-5}^5 (2x - 1) \operatorname{sgn} x dx$ A 0 B -50 C 10 D 15 E 50.

428 $\int_0^2 \frac{2x^3 - 6x^2 + 9x - 5}{(x^2 - 2x + 5)^n} dx$ A 1 B -1 C 0 D $\frac{2}{n}$ E $\frac{n}{2}$.

429 $\int_0^1 \frac{2}{(1+x^2)^2} dx$ A $\frac{\pi}{4} + 1$ B $\pi + \frac{1}{2}$ C $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ D $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}$ E $\pi + \frac{1}{4}$

430 $\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{3-x}} dx$ este: A $\frac{3}{2}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{4}{3}$ D $\frac{3}{4}$ E $\frac{5}{3}$

431 $\int_3^8 \frac{dx}{x-1 + \sqrt{x+1}}$ A $\frac{2}{3} \ln \frac{25}{8}$ B $\ln 3$ C 5 D $\sqrt{11}$ E $3 \operatorname{arctg} \sqrt{3} - 2$.

432 $\int_{\sqrt{e}}^e \frac{\ln x}{x} dx$ este: (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{e}{2}$ (D) $\frac{2}{e}$ (E) $\frac{1}{8}$

433 Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifică egalitățile:
 $P(1) + \dots + P(n) = n^5, \quad n = 1, 2, \dots,$
 atunci integrala $\int_0^1 P(x) dx$ este: (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) 1 (E) $\frac{1}{5}$

434 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx$ (A) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2} - 1$ (E) $\frac{\pi}{8} - 2$.

435 Să se calculeze $\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx$, unde m și n sunt două numere întregi.
(A) 0 (B) $m\pi$ (C) π (D) 1 (E) $(n+m)\pi$.

436 $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ (A) $\operatorname{arctg} e$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\operatorname{arctg} e - \frac{\pi}{4}$ (D) 0 (E) $\operatorname{arctg} e + \pi$.

437 $\int_{-1}^1 (1+2x^{2015})e^{-|x|} dx$ (A) $\frac{4014}{e}(e-1)$ (B) $\frac{4016}{e}(e-1)$ (C) ∞ (D) $\frac{2}{e}(e-1)$ (E) $2006 - \frac{2006}{e}$

438 $\int_{-1}^2 \min\{1, x, x^2\} dx$ (A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{4}{3}$ (E) 0

439 Integrala $\int_1^e \ln x dx$ este: (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) $e-1$ (E) $e-2$

440 Integrala $\int_1^e \ln^2 x dx$ este: (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) $e-1$ (E) $e-2$

441 Să se calculeze $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^3 x dx$. (A) $\frac{1-\ln 2}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} \ln 2$ (D) $\ln 2$ (E) 1

442 Soluția ecuației $\int_0^x t e^t dt = 1$ este: (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) $e-1$ (E) $e-2$

443 $\int_1^{2e} |\ln x - 1| dx$ (A) $2 \ln 2$ (B) $2(e \ln 2 - 1)$ (C) $e \ln 2$ (D) 1 (E) $\ln 2 - 1$.

444 $\int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx$ (A) π (B) $2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (E) $\frac{\pi}{3} - 2\sqrt{3}$.

445 $\int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx$ (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{5}{2}$ (E) 2.

446 Să se calculeze $\int_0^a \frac{(a-x)^{n-1}}{(a+x)^{n+1}} dx$, unde $a > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$
(A) $\frac{1}{2na}$ (B) $\frac{n}{2a}$ (C) $\frac{a}{2n}$ (D) $2an$ (E) $\frac{2a}{n}$.

447 $\int_{-1}^1 \sin x \ln(2+x^2) dx$ (A) 0 (B) $\ln 2$ (C) 1 (D) $\frac{\pi}{2}$ (E) $\ln 3$.

448 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ este: (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} \ln 2$ (C) $\ln 2$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{4} \ln 2$.

449 $\lim_{a \rightarrow 1} \int_0^a x \ln(1-x) dx$, $a \in (0, 1)$: (A) 0 (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{3}{4}$ (E) -1 .

450 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 \cos x + 3}$ este: (A) 0 (B) $\frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}}$ (C) $\operatorname{arctg} \sqrt{5}$ (D) $\operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}}$ (E) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

451 $\int_0^{4\pi} \frac{dx}{5 + 4 \cos x}$ este: (A) $\frac{4\pi}{3}$ (B) 0 (C) $\frac{4}{5}\pi$ (D) $\frac{5}{4}\pi$ (E) π

452 Integrala $\int_{\frac{1}{n+2}}^{\frac{1}{n}} \left| \frac{1}{x} \right| dx$, $n \in \mathbb{N}^*$ este: (A) $\frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}$ (B) 0 (C) $3n$ (D) $\frac{4n}{5n+1}$ (E) $6n$.

453 Valoarea lui $I_n = \int_1^n \frac{dx}{x + [x]}$ este:
(A) $\ln \frac{2n-1}{2}$ (B) $\ln \frac{3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n-2)}$ (C) $\ln 2 - \ln(2n-1)$ (D) $\frac{1}{2} \ln x$ (E) $\frac{1}{2} \ln n$.

454 Fie n un număr natural nenul. Să se calculeze $\int_0^1 \{nx\}^2 dx$, unde $\{a\}$ reprezintă partea fracționară a numărului a . (A) 1 (B) $\frac{1}{n}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{1}{4}$.

- 455) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg}^{n+2} x + \operatorname{tg}^n x) dx$, unde $n > 0$, este:
 A $\frac{1}{n+1}$ B $\frac{1}{n}$ C $\pi/4$ D $n + \frac{\pi}{4}$ E 1
- 456) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg}^9 x + 5 \operatorname{tg}^7 x + 5 \operatorname{tg}^5 x + \operatorname{tg}^3 x) dx$ este:
 A $\frac{24}{25}$ B $\frac{\pi}{24}$ C $\frac{25}{24}$ D $\frac{\pi}{25}$ E 1
- 457) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx$ este: A $\frac{\pi}{4}$ B $\frac{\pi}{3}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$ E 1

- 458) $\int_0^{2\pi} \cos^2(nx) dx$, unde n este un număr natural nenul, este:
 A 0 B π C $\frac{\pi}{2}$ D $\frac{\pi}{n}$ E $n\pi$.

- 459) Dacă $a \in \mathbb{N}$ și $L(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 [ne^{ax}] dx$, atunci mulțimea soluțiilor inecuației $L(a) \leq e$ este:
 A $\{0, 1\}$ B $\{1, 2\}$ C \emptyset D $\{0\}$ E \mathbb{N}^*

- 460) Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k^2}{8} \arcsin \frac{k}{2n}$ este: A 0 B $\frac{\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9}$ D $-\frac{\pi}{3}$ E 1

- 461) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x dx$
 A $\frac{\pi^2}{4}$ B $\frac{\pi^2-4}{16}$ C $\frac{\pi^2}{4} - 1$ D $\frac{\pi}{2}$ E alt rezultat

Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $f(a) = \int_0^1 |x - a| dx$.

- 462) Valoarea $f(2)$ este: A $-\frac{5}{2}$ B 0 C $\frac{x^2}{2} - 1$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{3}{2}$
- 463) Valoarea $f'(2)$ este: A 1 B 0 C x D $-\frac{1}{2}$ E $\frac{3}{2}$
- 464) Valoarea minimă a funcției este: A 0 B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$ E $-\frac{1}{4}$

- 465) $\int_0^{\pi} \frac{\sin 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$ este: A $\frac{\pi}{4}$ B 2 C 0 D π E 1

- 466) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ A 1 B $\frac{1}{3}$ C 2 D $\frac{2}{3}$ E $\frac{4}{3}$.

- 467) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$ A 1 B $2(\sqrt{2} - 1)$ C $2\sqrt{2}$ D $2 - \sqrt{2}$ E $3 - \sqrt{2}$.

468 $\int_0^{\pi} \arcsin(\sin x) dx$ (A) $\frac{\pi^2}{4}$ (B) $8\pi^2$ (C) 1 (D) 2π (E) $\frac{\pi^2}{2}$.

469 $\int_0^{\pi} \arcsin(\cos^3 x) dx$ (A) $\frac{\pi^2}{4}$ (B) 0 (C) 1 (D) $\frac{\pi^2}{8}$ (E) $\frac{\pi^2}{6}$

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x}$, unde $n \in \mathbb{N}^*$ este fixat.

470 Funcția f este o funcție periodică având perioada principală egală cu:

(A) 2π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) $\frac{\pi}{4}$ (E) alt răspuns

471 Funcția $f + c$, $c \in \mathbb{R}$, are o primitivă periodică dacă și numai dacă c are valoarea:

(A) π (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{\pi}{4}$ (D) $-\pi$ (E) 2π

472 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$ (A) $\frac{\pi}{12}$ (B) $\frac{\pi}{8}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) 0 (E) ∞ .

473 $\int_0^{2\pi} \frac{x \sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$ (A) 0 (B) $\frac{\pi^2}{4}$ (C) $\frac{\pi^2}{2}$ (D) 2π (E) π^2 .

474 Se consideră funcțiile: $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{x(x^n + 1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$ și fie $F_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva funcției f_n al cărei grafic trece prin punctul $A(1, 0)$. Soluția inecuației $|\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)| \leq 1$ este: (A) $(0, e]$ (B) $[\frac{1}{\sqrt{e}}, e]$ (C) $[\frac{1}{e}, e]$ (D) $[\frac{1}{e}, \infty)$ (E) \emptyset

475 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x t^2 e^{-t} dt$ (A) 0 (B) $\ln 3$ (C) 2 (D) 1 (E) ∞ .

476 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^n \frac{x-1}{x+1} dx$ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) e (E) ∞ .

Fie $I_n = \int_0^1 x^{2004} \cos(nx) dx$, $n \in \mathbb{N}$.

477 Limita șirului (I_n) este: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\cos 1$ (E) nu există

478 Limita șirului $(n I_n)_{n \geq 0}$ este: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\cos 1$ (E) nu există

Să se calculeze:

479 $\int_1^2 \frac{x^3 - x - 2}{x^3 e^x} dx$; (A) $-\frac{3}{4e^2}$ (B) $\frac{3}{4e^2}$ (C) $\frac{1}{e}$ (D) $\frac{1}{e^2}$ (E) $-\frac{1}{2e^2}$

480 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_n^{n+3} \frac{x^3}{x^6 + 1} dx$ (A) 0 (B) ∞ (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$ (E) 3

- 481 Se consideră șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $a_0 = -1$, $a_{n+1} = 2 + \int_{a_n}^1 e^{-x^2} dx$, $n = 0, 1, \dots$
 Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată?
 A $(a_{n+1} - a_n)(a_n - a_{n-1}) \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ B $a_n \geq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ C $a_n \leq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$
 D șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este crescător E șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este descrescător

- 482 Fie $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^3} dt$. Atunci $F'(2)$ este:
 A $4e^{64}$ B e^8 C $12e^8$ D $3e^2$ E $12e^6$.

- Fie $f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \int_0^{x^2} t^n \cdot e^t dt$, $n \in \mathbb{N}^*$.
- 483 $f_1(x)$ este:
 A $e^{x^2}(x^2 - 1) + 1$ B $e^{x^2}(x^2 + 1) + 1$ C $e^{x^2}(x^2 + 1) - 1$ D $e^{x^2}x^2 + 1$ E $e^{x^2}(x^2 - 1) - 1$
- 484 $f'_n(1)$ este: A e B $2e$ C $2e - 1$ D $e - 1$ E $e + 1$
- 485 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1)$ este: A e B 1 C 0 D ∞ E e^2

- 486 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_t^{2t} \frac{\ln(1+x)}{\sin x} dx$ A ∞ B 0 C 1 D 2 E $\frac{\ln 2}{\sin 1}$

- 487 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 [nx] dx$ A 1 B ∞ C 0 D $\frac{1}{2}$ E 2 .

- 488 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{x^3 + x + 1}}$ este: A $\ln \pi$ B 0 C 1 D $\ln 2$ E $\ln 3$.

- 489 Aria domeniului mărginit de axa Ox , curba $y = \ln x$ și de tangenta la această curbă care trece prin origine este: A e B $\frac{e}{2} - 1$ C $\frac{e}{2}$ D $e - 1$ E $2e$.

- 490 Aria cuprinsă între axa Ox , dreptele $x = 0$ și $x = \pi$ și graficul funcției $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}$ este egală cu: A $\frac{\pi^2}{2}$ B $\frac{\pi^2}{6}$ C $\frac{\pi^2}{4}$ D $\frac{\pi^2}{8}$ E $\frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}$.

Se consideră integrala $I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx$, unde f este o funcție continuă pe un interval ce conține $[0, 1]$.

- 491 Are loc egalitatea:
 A $I = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ B $I = \pi \int_0^\pi f(\sin x) dx$ C $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ D $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$ E $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.
- 492 $I_1 = \int_0^\pi \frac{x \sin x dx}{1 + \sin^2 x}$ este:
 A $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$ B $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$ C $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 - 2\sqrt{2})$ D $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \ln(3 - 2\sqrt{2})$
 E $\frac{\pi}{2} \ln(3 + \sqrt{2})$.

493 Aria domeniului mărginit de graficul funcției $f : [0, \frac{3\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \cos x},$$

axa Ox și dreptele $x = 0$ și $x = \frac{3\pi}{4}$, este: A $\frac{\pi}{4}$ B $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{8}$ C 2π D $\frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} - 2$ E 0

Fie $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inversa funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + e^x$.

494 $g(1)$ este: A -1 B 0 C 1 D ∞ E $\frac{1}{3}$

495 Limita $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{g(e^x)}$ este: A 1 B $\frac{1}{2}$ C 2 D $\frac{3}{2}$ E 0

496 Integrala $\int_1^{1+e} g(t) dt$ este: A $\frac{1}{2}$ B $e + \frac{1}{2}$ C $2e + \frac{3}{2}$ D $\frac{3}{2}$ E $e + 1$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - e^{-x}$ și fie g inversa lui f .

497 $f'(x)$ are expresia: A $1 + e^x$ B $1 + e^{-x}$ C xe^{-x} D $1 - e^{-x-1}$ E e^{-x-1} .

498 $g'(-1)$ este: A 0 B -1 C 2 D $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{e}$.

499 $\int_0^1 f(x) dx$ este: A $\frac{1}{e} - \frac{1}{2}$ B $\frac{3}{2} - \frac{1}{e}$ C $\frac{1}{2} - \frac{1}{e}$ D $\frac{1}{e} - \frac{3}{2}$ E $\frac{3}{2} + \frac{1}{e}$.

500 $\int_{-1}^{1-1/e} g(x) dx$ este: A -1 B 0 C $\frac{3}{2} - \frac{2}{e}$ D $\frac{3}{2} + \frac{1}{e}$ E $\frac{1}{e} - \frac{1}{2}$.

501 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{x^n + (1-x)^n} dx$ este: A 0 B 1 C $\frac{3}{4}$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{4}$.

502 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{nx}) dx$ este: A 0 B e C $\frac{1}{2}$ D $\ln 2$ E $\frac{1}{3}$.

503 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-1}^0 (x + e^x)^n dx$ este: A e B 0 C ∞ D $1 + e$ E $1/2$.

504 $\int_1^3 \frac{\ln x}{x^2 + 3} dx$ A $\frac{\pi \ln 3}{3\sqrt{3}}$ B $\frac{\pi \ln 3}{12\sqrt{3}}$ C $\frac{\pi \ln 6}{6\sqrt{3}}$ D $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ E alt răspuns

505 $\int_0^2 \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 2x + 2} dx$ A π B 2π C $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ D 0 E 1

506 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + x + 1} dx$ A $\frac{\pi^2}{6\sqrt{2}}$ B $\frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}$ C $\frac{\pi^2}{6}$ D 0 E ∞

507 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{dx}{1 + n^2 \cos^2 x}$
 A 0 B π C ∞ D limita nu există E alt răspuns

Următoarele enunțuri teoretice pot fi utile pentru rezolvarea unor probleme din culegere.

508 Fie $x_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, astfel ca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^n < 1.$$

Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

509 Fie $f : [0, b-a] \rightarrow (0, \infty)$ o funcție continuă și $a < b$. Atunci

$$\int_a^b \frac{f(x-a)}{f(x-a) + f(b-x)} dx = \frac{b-a}{2}.$$

510 Fie $f : (-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^1 x^n f(x) dx = f(1), \quad -1 < a < 1.$$

511 Fie $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Atunci,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x^n) dx = \int_0^1 f(t) dt.$$

512 Dacă $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă și are perioada $T > 0$, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

513 Fie $a, b > 0$. Dacă $f : [-b, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pară, atunci

$$\int_{-b}^b \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \int_0^b f(x) dx.$$

- 514 Fie punctele $A(\lambda, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, -1)$. Să se determine λ astfel încât punctul A să se afle pe dreapta determinată de punctele B și C .
[A] 2 [B] 3 [C] $\frac{5}{2}$ [D] $\frac{1}{2}$ [E] $\frac{2}{3}$
- 515 Dreptele $4x - y + 2 = 0$, $x - 4y - 8 = 0$, $x + 4y - 8 = 0$ determină un triunghi. Centrul cercului înscris în triunghi este
[A] $(\frac{6}{5}, 0)$ [B] $(\frac{6}{5}, 1)$ [C] $(\frac{5}{6}, 0)$ [D] $(\frac{5}{6}, 1)$ [E] $(\frac{6}{5}, \frac{5}{6})$
- 516 Triunghiul ABC are latura $[AB]$ pe dreapta $4x + y - 8 = 0$, latura $[AC]$ pe dreapta $4x + 5y - 24 = 0$, iar vârfurile B și C pe axa Ox . Ecuația medianei corespunzătoare vârfului A este:
[A] $2x + 3y = 0$ [B] $3x + 2y = 0$ [C] $5x + y = 9$ [D] $4x + 3y - 16 = 0$ [E] $x + 4y - 17 = 0$
- 517 Se dau punctele $A(2, 1)$ și $B(0, -1)$. Ecuația simetricii dreptei AB față de dreapta OA este:
[A] $x + 2y - 1 = 0$ [B] $3x - 7y + 1 = 0$ [C] $2x + y + 5 = 0$ [D] $x + y + 1 = 0$ [E] $x - 7y + 5 = 0$
- 518 Fie triunghiul ABC , unde $B(-4, -5)$. Ecuația înălțimii duse din A este $5x + 3y - 4 = 0$. Ecuația dreptei BC este:
[A] $5y - 3x + 13 = 0$ [B] $3x - 5y + 37 = 0$ [C] $y = -5$ [D] $x + y - 2 = 0$ [E] $y - 2x = 3$
- 519 În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele $A(3, 4)$, $B(-3, -4)$ și $C(3, -4)$. Coordonatele centrului cercului circumscris triunghiului ABC sunt:
[A] $(1, 1)$ [B] $(-1, 0)$ [C] $(0, 0)$ [D] $(0, 1)$ [E] $(0, -1)$
- 520 Fie C simetricul punctului $A(-1, -3)$ față de punctul $B(2, 1)$. Care sunt coordonatele punctului C ?
[A] $(5, 5)$ [B] $(4, 5)$ [C] $(6, 5)$ [D] $(5, 6)$ [E] $(4, 6)$

521 Fie punctele $A(0, 2)$ și $B(3, 3)$. Notăm cu P proiecția punctului $O(0, 0)$ pe dreapta AB . Care sunt coordonatele punctului P ? Care este aria triunghiului OAB ?

- A $(-\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 3$ B $(-\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 6$ C $(\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 3$ D $(-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}); 3$ E $(-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}); 6$

522 Fie $A(0, -1)$, $d_1 : x - y + 1 = 0$ și $d_2 : 2x - y = 0$. Coordonatele punctelor $B \in d_1$ și $C \in d_2$ pentru care dreptele d_1 și d_2 sunt mediane în triunghiul ABC sunt:

- A $(0, 1), (3, 6)$ B $(0, 1), (0, 1)$ C $(-1, 0), (1, 1)$ D $(0, 0), (-1, 1)$ E $(-1, -1), (1, 1)$

523 Fie dreptele

$$(AB) : x + 2y - 1 = 0$$

$$(BC) : 2x - y + 1 = 0$$

$$(AC) : 2x + y - 1 = 0$$

care determină triunghiul ABC . Bisectoarea unghiului B are ecuația:

- A $x - 3y + 2 = 0$ B $x + y - 1 = 0$ C $3x - y + 2 = 0$ D $x - y + 1 = 0$

524 Pentru ce valori ale parametrului α ecuațiile $3\alpha x - 8y + 13 = 0$, $(\alpha + 1)x - 2\alpha y - 5 = 0$ reprezintă două drepte paralele:

- A $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = \frac{1}{3}$ B $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = -\frac{1}{3}$ C $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = \frac{2}{3}$
 D $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = -\frac{2}{3}$ E $\alpha_1 = \frac{1}{2}, \alpha_2 = 3$

525 Se consideră în plan punctele $A(0, 0)$, $B(2, 0)$ și dreapta de ecuație $d : x - 2y + 10 = 0$. Valoarea minimă a sumei $S(M) = MA + MB$, când punctul M parcurge dreapta d este:

- A 2 B 10 C $\sqrt{101}$ D $\sqrt{98}$ E $7\sqrt{2}$

526 Dreapta care trece prin $C(1, 2)$, neparalelă cu AB față de care punctele $A(-1, 1)$ și $B(5, -3)$ sunt egal depărtate, are ecuația:

- A $3x + y - 5 = 0$ B $2x + y - 4 = 0$ C $3x + 2y - 6 = 0$ D $2x + 3y - 4 = 0$ E $2x + 3y - 6 = 0$

527 Fie punctele $A(1, 1)$, $B(2, -3)$, $C(6, 0)$. Coordonatele punctului D pentru care $ABCD$ este paralelogram sunt:

- A $(4, 4)$ B $(5, 4)$ C $(3, 5)$ D $(3, 3)$ E $(4, 5)$

528 Raza cercului care trece prin punctele $A(-4, 0)$, $B(4, 4)$, $O(0, 0)$ este:

- A 6 B 7 C 8 D $2\sqrt{10}$ E $3\sqrt{5}$

529 Laturile AB , BC , CA ale triunghiului ABC au respectiv ecuațiile:

$$x + 21y - 22 = 0, \quad 5x - 12y + 7 = 0, \quad 4x - 33y + 146 = 0.$$

Distanța de la centrul de greutate al triunghiului ABC la latura BC este:

- A 1 B 2 C 3 D 4 E 5.

530 Ecuațiile dreptelor care trec prin punctul de intersecție al dreptelor de ecuații $11x + 3y - 7 = 0$ și $12x + y - 19 = 0$ și se află la egală distanță de punctele $A(3, -2)$ și $B(-1, 6)$ sunt:

- A $7x + y - 9 = 0, 2x + y + 1 = 0$ B $x + 7y - 8 = 0, 2x + y - 1 = 0$ C $7x + y - 8 = 0, 2x + y + 2 = 0$ D $7x + y - 9 = 0, 2x + y - 1 = 0$ E $x + 7y - 9 = 0, x + 2y + 1 = 0.$

Se dau punctele $A(0, 1)$, $B(-1, 0)$, $C(6, 2)$, și $D(1, 1)$.

- 531** Simetricul punctului C față de dreapta AB este:
 A $C'(-6, 2)$ B $C'(6, -2)$ C $C'(-6, -2)$ D $C'(1, 7)$ E $C'(1, 4)$.

- 532** Coordonatele punctului $M \in AB$ pentru care suma $DM + MC$ este minimă sunt:
 A $(1, -3)$ B $(1, 2)$ C $(-1, 2)$ D $(1, 3)$ E $(2, 3)$

- 533** Coordonatele punctului $M \in AB$ pentru care suma $DM^2 + MC^2$ este minimă sunt:
 A $(3, 4)$ B $(\frac{7}{4}, \frac{15}{4})$ C $(2, 3)$ D $(\frac{7}{3}, 3)$ E $(3, 5)$.

Se consideră în planul xOy punctele $S(0, 12)$, $T(16, 0)$ și $Q(x, y)$ un punct variabil situat pe segmentul $[ST]$. Punctele P și R aparțin axelor de coordonate astfel încât patrulaterul $OPQR$ să fie dreptunghi.

- 534** Ecuația dreptei ST este:
 A $3x + 4y - 48 = 0$ B $-3x - 4y + 12 = 0$ C $3y - 4x - 36 = 0$ D $3x - y + 12 = 0$
 E $y - 4x + 64 = 0$

- 535** Aria dreptunghiului $OPQR$ este:
 A $-3x^2 + 12x$ B $12x - \frac{3}{4}x^2$ C $3x^2 + 12x$ D $-4x^2 + 12x$ E $48x - \frac{3}{4}x^2$.

- 536** Valoarea maximă a ariei dreptunghiului $OPQR$ este:
 A 32 B 48 C 64 D 96 E 84

Punctul $A(-4, 1)$ este un vârf al pătratului $ABCD$ parcurs în sens trigonometric, căruia îi cunoaștem o diagonală de ecuație $3x - y - 2 = 0$.

- 537** Aria pătratului $ABCD$ este: A 45 B 15 C 90 D 30 E $\frac{45}{2}$
538 Punctul C are coordonatele: A $(4, -1)$ B $(5, -2)$ C $(6, 1)$ D $(\frac{9}{2}, -\frac{7}{2})$ E $(\frac{11}{2}, -\frac{1}{2})$

Fie în planul xOy punctele $A(4, 0)$, $B(5, 1)$, $C(1, 5)$, $D(0, 4)$.

- 539** Patrulaterul $ABCD$ este:
 A patrulater oarecare B trapez isoscel C romb D dreptunghi
 E trapez dreptunghic
- 540** Aria patrulaterului este A 4 B 8 C 1 D 16 E 2
- 541** Simetricul punctului A față de dreapta BC este punctul de coordonate
 A $(1, 5)$ B $(5, 1)$ C $(5, 2)$ D $(6, 2)$ E $(6, 4)$

- 542** În sistemul cartezian xOy , o dreaptă variabilă d care conține punctul $A(0, 5)$ intersectează dreptele $x - 2 = 0$ și $x - 3 = 0$ în punctele B , respectiv C . Să se determine panta m a dreptei d astfel încât segmentul BC să aibă lungime minimă.
 A $m = 0$ B $m = -1$ C $m \in \mathbb{R}$ D $m = 2$ E nu există.

- 543** Fie dreapta $\mathcal{D} : x + y = 0$ și punctele $A(4, 0)$, $B(0, 3)$. Valoarea minimă a sumei $MA^2 + MB^2$, pentru $M \in \mathcal{D}$ este: A $\frac{99}{4}$ B 25 C $\frac{101}{4}$ D 26 E $\frac{105}{4}$

Se consideră expresia $E(x, y) = x^2 + y^2 - 6x - 10y$.

544 Distanța de la punctul (x, y) la punctul $(3, 5)$ este:

- A $\sqrt{E(x, y) + 34}$ B $\sqrt{E(x, y) - 34}$ C $\sqrt{E(x, y)}$ D $\sqrt{E(x, y) + 1}$
 E alt răspuns

545 Valoarea minimă a lui $E(x, y)$, pentru $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, este:

- A 0 B -34 C 34 D -1 E 1

546 Se consideră mulțimea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}$. Valoarea maximă a lui $E(x, y)$, pentru $(x, y) \in D$, este:

- A 8 B 0 C 4 D 6 E 2

Fie ABC un triunghi. Notăm cu G centrul său de greutate, cu O centrul cercului circumscris, cu H ortocentrul, cu I centrul cercului înscris și $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

547 Punctul M din planul triunghiului ABC pentru care $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ este: A G
 B H C I D O E A

548 Punctul N din planul triunghiului ABC pentru care $a\overrightarrow{NA} + b\overrightarrow{NB} + c\overrightarrow{NC} = \vec{0}$ este: A G
 B H C I D O E A

549 Punctul R din planul triunghiului ABC pentru care $\overrightarrow{RA} + \overrightarrow{RB} + \overrightarrow{RC} = \overrightarrow{RH}$ este: A G B H C I D O E A

550 Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(4x) + \cos(\sqrt{2}x)$, are perioada:

- A 2 B 2π C $\sqrt{2}\pi$ D $\sqrt{2}$ E nu este periodică

551 Valoarea lui $\arcsin(\sin 3)$ este:

- A 3 B -3 C 0 D $\pi - 3$ E $-\cos 3$

552 Valoarea lui $\sin 15^\circ$ este:

- A $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ B $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}$ C $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{4}$ D $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ E $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{4}$.

Fie numerele complexe $z_k = \cos \frac{2k\pi}{5} + i \sin \frac{2k\pi}{5}$, $k = 1, 2, 3, 4$.

553 Ecuația polinomială ale cărei rădăcini sunt numerele z_k ($k = 1, 2, 3, 4$) este:

- A $x^4 + 1 = 0$ B $x^5 - 1 = 0$ C $x^5 + 1 = 0$ D $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ E $x^4 + x^2 + 1 = 0$

554 Valoarea expresiei $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \frac{8\pi}{5}$ este:

- A -1 B 0 C $\frac{1}{2}$ D 1 E 2

555 Valoarea expresiei $\cos \frac{2\pi}{5}$ este:

- A $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ B $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ C $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ D $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ E 1

556 $\cos x \cos \frac{5\pi}{4} - \sin x \sin \frac{5\pi}{4} = 1$ dacă și numai dacă:

- A $x \in \{2k\pi - \frac{\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ B $x \in \{k\pi \pm \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ C $x \in \{k\pi - \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$
 D $x \in \{2k\pi - \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ E $x \in \{2k\pi \pm \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Se consideră funcția $f(x) = \cos^{2n} x + \sin^{2n} x$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $x \in \mathbb{R}$.

557 Mulțimea soluțiilor ecuației $f(x) = 1$ este:

- A $\{2k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}}$ B $\{2k\pi + \frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ C $\{k\pi + \frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ D $\{k\frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ E \emptyset

558 Mulțimea valorilor funcției f este

- A $[0, 1]$ B $[-1, 1]$ C $[0, \frac{1}{n}]$ D $[\frac{1}{2^{n-1}}, 1]$ E Alt răspuns

Se consideră ecuația:

$$(\sin x + \cos x)^n - a \sin x \cos x + 1 = 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

- 559** Pentru $n = 2$ ecuația are soluție dacă și numai dacă
 A $a \in [2, 6]$ B $a \in (-\infty, -2] \cup [6, \infty)$ C $a \in (-2, 6)$ D $a \in (-1, 1]$ E alt răspuns

- 560** Pentru $n = 1$ și $a = 3$ mulțimea soluțiilor ecuației este:
 A $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B \emptyset C $\{(2k+1)\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{2k\pi - \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$
 D $\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{2k\pi + \frac{\pi}{4} | k \in \mathbb{Z}\}$

- 561** Dacă $x \in (\pi, 2\pi)$ și $\cos x = \frac{7}{25}$, atunci $\sin x$ este:
 A $-\frac{24}{25}$ B $-\frac{7}{8}$ C $-\frac{23}{25}$ D $\frac{7}{8}$ E $\frac{24}{25}$.

- 562** $\operatorname{tg} \frac{\pi}{12}$ are valoarea: A $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ B $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ C $\frac{\sqrt{3}}{6}$ D $\frac{2}{\sqrt{3}}$ E alt răspuns.

Fie x_1 și x_2 rădăcinile ecuației $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$.

- 563** $\operatorname{arctg} x_1 + \operatorname{arctg} x_2$ este: A $\frac{\pi}{2}$ B $\frac{\pi}{8}$ C $\frac{3\pi}{8}$ D $\frac{3\pi}{4}$ E $\frac{\pi}{4}$

- 564** $\operatorname{arctg} x_1 \cdot \operatorname{arctg} x_2$ este: A $\frac{\pi^2}{8}$ B $\frac{3\pi^2}{16}$ C $\frac{3\pi^2}{64}$ D $\frac{3\pi^2}{32}$ E $\frac{\pi^2}{16}$

- 565** Fie $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$ cu proprietatea că $\operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$. Atunci perechea $(\sin x, \cos x)$ este
 A $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ B $(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ C $(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}})$ D $(\frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}})$ E $(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$

- 566** Pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$ expresia $(\cos a + \cos b)^2 + (\sin a + \sin b)^2$ este egală cu:
 A $2 \sin^2(a+b)$ B $2 \cos^2(a+b)$ C $4 \sin^2 \frac{a-b}{2}$ D $4 \cos^2 \frac{a-b}{2}$ E 2.

- 567** Oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, suma $\sin^6 x + \cos^6 x$ este egală cu:
 A $3 - \sin^2 x \cos^2 x$ B $1 - 3 \sin^2 2x$ C 1 D $1 - 3 \sin^3 x \cos^3 x$
 E $1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$.

- 568** Dacă $E = \cos^2(a+b) + \cos^2(a-b) - \cos 2a \cdot \cos 2b$ atunci, pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$ are loc egalitatea:
 A $2E = 1$ B $E = 1$ C $2E + 1 = 0$ D $E = 0$ E $E = -1$.

- 569** Dacă numerele reale α și β satisfac egalitatea

$$(\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 2 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2},$$

atunci:

- A $\alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$ B $\alpha - \beta \in \{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\alpha - \beta \in \{(2k+1)\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\alpha - \beta \in \{\frac{\pi}{2} + 4k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\alpha - \beta \in \{\frac{\pi}{6} + 10k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

- 570** Numărul $\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8}$ este egal cu:
 A $\frac{\pi}{12}$ B $\frac{\pi}{6}$ C $\frac{\pi}{4}$ D $\frac{5\pi}{12}$ E $\frac{\pi}{2}$.

571 Inversa funcției $f : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$, este funcția $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ definită prin:

- A $f^{-1}(x) = \pi + \arcsin x$ B $f^{-1}(x) = \pi - \arcsin x$
 C $f^{-1}(x) = \arcsin x$ D $f^{-1}(x) = 2\pi - \arcsin x$ E $f^{-1}(x) = -\pi + \arcsin x$.

572 Egalitatea $\arcsin(\sin x) = x$ are loc pentru:

- A orice $x \in \mathbb{R}$ B orice $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sin x \in (-1, 1)$
 C orice $x \in [0, 2\pi)$ D \emptyset E orice $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

573 Mulțimea valorilor lui $m \in \mathbb{R}$ pentru care expresia

$$E(x) = \sqrt{\cos^4 x + m \sin^2 x} + \sqrt{\sin^4 x + m \cos^2 x}$$

este constantă pe \mathbb{R} este: A $\{0\}$ B $\{0, 4\}$ C $\{1, 4\}$ D $\{-1, 0\}$ E \emptyset .

574 Valorile minimă m și maximă M ale expresiei $E(x) = \cos^2 x - 4 \sin x$, unde $x \in \mathbb{R}$, sunt:

- A $m = -1, M = 1$ B $m = -5, M = 5$ C $m = -4, M = 3$
 D $m = -4, M = 4$ E $m = -3, M = 3$.

575 Mulțimea soluțiilor ecuației $2 \cos^2 x - 11 \cos x + 5 = 0$ este:

- A \emptyset B $\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 C $\{\pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 D $\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

576 Ecuația $4 \sin^2 x - 4 \sin x + 1 = 0$ are următoarea mulțime de soluții:

- A $\{(-1)^k \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{(-1)^k \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 C $\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $\{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{4} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

577 Ecuația $\sin x = 2 \operatorname{tg} x$ are următoarea mulțime de soluții:

- A $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C \emptyset
 D $\{0, 1, \pi, 2\pi\}$ E $\{\frac{\pi}{4} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

Fie $S_n, n \in \mathbb{N}^*$, mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x \sin 2x \dots \sin nx = 1$.

578 S_1 este:

- A $\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{(-1)^k \frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\}$ E \emptyset

579 S_{100} este:

- A $\{\frac{\pi}{101} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{\pi}{101} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C \emptyset
 D $\bigsqcup_{n=1}^{100} \{\frac{\pi}{5n} + \frac{k\pi}{n+1} | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{\frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

580 Mulțimea soluțiilor ecuației $\cos 2x = \cos x$ este:

- A $\{\frac{2k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{2k\pi}{7} | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{2k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\}$
 C $\{\frac{2k\pi}{7} | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

581 Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x = \cos 3x$ este:

- A $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\}$ D $\{-\frac{4k\pm 1}{8}\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

582 Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin 5x = \sin x$ este:

- A $\{\frac{k\pi}{5-(-1)^k} | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{k\pi}{5} | k \in \mathbb{Z}\}$
 C $\{\frac{k\pi}{10} | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{(-1)^k \arcsin \frac{1}{5} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $\{(-1)^k \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

583 Ecuația $2 \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 3$ are următoarele soluții în intervalul $[0, \frac{\pi}{2}]$:

- A $\frac{\pi}{4}$ și $\frac{\pi}{6}$ B $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg}(-5)$ C $\frac{\pi}{12}$ D $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ E $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg} 2$.

584 Dacă $\sqrt{3} \sin x + \cos x - 2 = 0$, atunci:

- A $x = (-1)^k \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ B $x = \frac{\pi}{6} + (-1)^k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z};$
 C $x = (-1)^k \frac{\pi}{2} + k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ D $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ E $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

585 Ecuația $\sin x + p \cos x = 2p, p \in \mathbb{R}$, are soluții pentru:

- A $|p| > 5$ B $p \in [-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$ C $|p| > \frac{2}{3}$ D $|p| = 3$ E $3p^2 > 1$.

586 Valoarea lui $\cos x$ care verifică ecuația

$$2 \sin^2 2x - 2 \sin x \sin 3x = 4 \cos x + \cos 2x$$

este:

- A $\frac{1}{2}$ B $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C $-\frac{1}{2}$ D $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E 0 .

587 Următoarea mulțime reprezintă soluția ecuației $\sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x = \frac{3}{2}$:

- A $\{(-1)^k \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\}$
 C $\{\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $\{\pm \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

588 Mulțimea tuturor valorilor $x \in \mathbb{R}$ care verifică egalitatea

$$3(\cos^4 x + \sin^4 x) - 2(\sin^6 x + \cos^6 x) = 1$$

este:

- A \emptyset B \mathbb{R} C $\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{2k\pi | k \in \mathbb{N}\}$.

589 Mulțimea soluțiilor ecuației

$$\left(\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} - \sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}\right) \left(\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}} - \sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}\right) = -4$$

este:

- A $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi)$ C $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ((2k-1)\frac{\pi}{2}, k\pi)$
 D $\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

590 Fie $x \in \mathbb{R}$. Valoarea expresiei

$$\left(\sin x - 2\sqrt[3]{\sin x \cos^2 x}\right)^2 + \left(\cos x - 2\sqrt[3]{\sin^2 x \cos x}\right)^2$$

este:

- A 1 B 2 C $\sin x + \cos x$ D $\sin^3 x + \cos^3 x$ E $\sqrt[3]{\sin x} + \sqrt[3]{\cos x}$

591 Ecuația $\cos^4 x - \sin^4 x = 1 + \sin 2x$ are următoarea mulțime de soluții:

- A \emptyset B $\{\frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{\frac{3\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 D $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

592 Egalitatea $\max(\sin x, \cos x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ este adevărată dacă și numai dacă:

- A $x \in \{\frac{\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $x \in \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 C $x \in \{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\}$ D $x \in \{\frac{11\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 E $x \in \{\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

593 Mulțimea soluțiilor ecuației $4 \sin x \cos^3 x - 4 \sin^3 x \cos x = 1$ este:

- A $\{(-1)^k \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{8} | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\}$
 E $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4} | k \in \mathbb{Z}\}$.

594 Soluția ecuației $2 \arcsin x = \arccos 2x$ este:

- A $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ B $\frac{\pi}{4}$ C $\frac{\pi}{6}$ D $\sqrt{2} - 1$ E $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

595 Mulțimea tuturor valorilor parametrului real m pentru care ecuația $(\sin x - m)^2 + (2m \sin x - 1)^2 = 0$ are soluții este:

- A $[-1, 1]$ B $\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\}$ C $\{-1, 0, 1\}$ D $[-\frac{1}{2}, 0) \cup (0, \frac{1}{2}]$ E $\{\frac{1}{2}\}$.

596 Dacă S este mulțimea soluțiilor ecuației $(1 - \cos x)^4 + 2 \sin^2 x^2 = 0$, atunci:

- A $S = \emptyset$ B $S \cap \mathbb{Q} = \emptyset$ C $S = \{\pi\}$ D $S = \{0\}$ E $S = \{0, 2\pi\}$.

597 Ecuația $\sin x + \cos 2x = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă:

- A $m \in [0, \frac{9}{8}]$ B $m = 1$ C $m = -3$ D $m < -2$ E $m \in [-2, \frac{9}{8}]$.

598 Mulțimea tuturor valorilor parametrului real m pentru care ecuația $\cos^2 x + (m + 1) \sin x = 2m - 1$ are soluții este:

- A $[1, 2]$ B \emptyset C $\{0\}$ D $[0, 2]$ E $[3, \infty)$.

599 Ecuația $\sin^6 x + \cos^6 x = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă:

- A $m \leq 2$ B $\frac{1}{4} \leq m \leq 1$ C $m = 1$ D $0 \leq m \leq 2$ E $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$.

600 Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x + \sin 2x = 2$ este:

- A $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{\frac{k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\}$
 D $\{\arcsin \frac{1}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ E \emptyset .

Se consideră funcția $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3 \cos^2 x - 4 \sin x$.

- 601** Soluția ecuației $f(x) = \frac{1}{4}$ este:
 A $\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$ B $\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\}$ C $\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\}$ D $\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\}$ E $\{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}$

602 Valoarea maximă a funcției f este:

- A -1 B $\frac{13}{3}$ C 3 D $\frac{11}{3}$ E $\frac{14}{3}$

603 Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție este:

- A $[-4, \frac{13}{3}]$ B $[-3, \frac{11}{3}]$ C $[-4, \frac{14}{3}]$ D $[-3, \frac{13}{3}]$ E $[-4, \frac{11}{3}]$

604 Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 5$ este:

- A 2 B 1 C 0 D 3 E 4

605 Să se arate că dacă $a = 41$, $b = 28$ și $c = 15$, atunci triunghiul ABC este:

- A dreptunghic B ascuțitunghic C obtuzunghic D isoscel
 E echilateral.

606 Să se determine unghiurile A și C ale triunghiului ABC dacă $a = \sqrt{2}$, $b = 2$, $B = \frac{\pi}{4}$.

- A $A = \frac{\pi}{4}$, $C = \frac{\pi}{2}$ B $A = \frac{\pi}{6}$, $C = \frac{7\pi}{12}$ C $A = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{5\pi}{12}$
 D $A = \frac{7\pi}{12}$, $C = \frac{\pi}{6}$ E $A = \frac{5\pi}{12}$, $C = \frac{\pi}{3}$.

607 Dacă în $\triangle ABC$ se dau $AB = 2$, $AC = 3$ și $m(\hat{A}) = 60^\circ$, atunci:

- A $\mathcal{A}(ABC) = \frac{3}{2}$ B $BC = \sqrt{7}$ C $\hat{B} \equiv \hat{C}$ D $m(\hat{B}) = \frac{1}{2}$ E $\triangle ABC$ este dreptunghic în B .

608 În triunghiul ABC avem $BC = 4$, $m(\hat{A}) = 60^\circ$, $m(\hat{B}) = 45^\circ$. Atunci AC are lungimea:

- A $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ C $\sqrt{6}$ D $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ E $\frac{5\sqrt{6}}{3}$.

Se dă un număr complex de forma $z = \left(1 + \frac{2i}{1-i}\right)^{2005}$.

609 Valoarea lui z este: A 1 B $2i$ C $-i$ D i E $-2i + 1$

610 Modulul lui $z + i$ este: A $\sqrt{2}$ B 2 C 1 D $\sqrt{3}$ E $\sqrt{5}$

611 Valoarea expresiei $\overline{2z + \bar{z}}$ este A $-i$ B $-2i$ C $2i + 3$ D 3 E i

Fie $x = \frac{1}{4}(\sqrt{3} + i)$. Atunci:

612 x^{2004} este A $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2^{2005}}$ B $-\frac{1}{2^{2004}}$ C 0 D $\frac{1}{2^{2004}}$ E $\frac{\sqrt{3}+i}{2^{2005}}$.

613 x^{2008} este A $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2^{2009}}$ B $-\frac{1}{2^{2008}}$ C 0 D $\frac{1}{2^{2008}}$ E $\frac{\sqrt{3}+i}{2^{2009}}$.

614 Dacă $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ și $S = \{z \in \mathbb{C} \mid (z+i)^n = (z-i)^n\}$, atunci:

- A S are n elemente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$;
 B $S = \{(-1)^{n-1} + \operatorname{tg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n; k \in \mathbb{N}; k \neq \frac{n}{2}\}$
 C $S = \{(-1)^{n-1} + \operatorname{ctg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n-1; k \in \mathbb{N}\}$
 D $S = \{\operatorname{ctg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n-1; k \in \mathbb{N}\}$
 E $S \cap \mathbb{R}$ are cel mult două elemente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

615 Fie triunghiul ABC pentru care $\operatorname{tg} \frac{A}{2} = \frac{a}{b+c}$. Atunci triunghiul este:

- A echilateral B dreptunghic cu $A = \frac{\pi}{2}$
 C dreptunghic cu $B = \frac{\pi}{2}$ sau $C = \frac{\pi}{2}$
 D ascuțitunghic E obtuzunghic.

616 Fie $z = \frac{(\sqrt{3} + i)^n}{(\sqrt{3} - i)^m}$, $m, n \in \mathbb{N}$. Să se determine relația dintre m și n astfel încât z să fie real.

- A $n - m = 6k$, $k \in \mathbb{N}$ B $n + m = 3k$, $k \in \mathbb{N}$ C $n - m = 3k$, $k \in \mathbb{Z}$ D $n - m = 0$
 E $n + m = 6k$, $k \in \mathbb{N}$.

617 Numărul $E = (\cos \alpha - i \sin \alpha)(\cos 5\alpha + i \sin 5\alpha)$ este real pentru

- A $\alpha = \frac{k\pi}{4}$, $k \in \mathbb{Z}$; B $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$; C $\alpha = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;
 D $\alpha = \frac{k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$; E $\alpha = \frac{2k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.

618 Fie numărul complex $u = 2 + 2i$.

Forma trigonometrică a numărului complex u este:

- A $u = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$ B $u = \sqrt{8}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ C $u = 2\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4})$
 D $u = \sqrt{8}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$ E $u = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$

619 u^{100} este: A 2^{100} B $2^{100}i$ C $-2^{150}i$ D -2^{150} E -2^{200}

620 Fie mulțimea $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq |z - i| \text{ și } |z - u| \leq 1\}$. Modulul lui $z \in A$ pentru care argumentul lui z este minim este: A 3 B $\sqrt{8}$ C $\sqrt{7}$ D 1 E $\sqrt{6}$

Se consideră numerele complexe $z_1 = \sin a - \cos a + i(\sin a + \cos a)$

$z_2 = \sin a + \cos a + i(\sin a - \cos a)$

621 Mulțimea valorilor lui a pentru care numărul complex $w = z_1^n + z_2^n$ are modulul maxim este:

- A $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{\frac{2k\pi}{n} | k \in \mathbb{Z}\}$ D $\{\frac{k\pi}{n} | k \in \mathbb{Z}\}$
 E alt răspuns

622 Mulțimea valorilor lui a pentru care $z_1 + z_2 \in \mathbb{R}$ este:

- A $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ B $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ C $\{k\pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ D \emptyset
 E $\{2k\pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

623 Valorile lui n pentru care $z_1^n z_2^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, este real și pozitiv sunt:

- A $n = 5$ B $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}^*$ C $n = 8k + 1$, $k \in \mathbb{N}^*$ D $n = 0$
 E $n = 8k + 2$, $k \in \mathbb{Z}$

Pentru n și k numere naturale nenule cu n fixat, notăm

$$a_k = \cos \frac{2k\pi}{n} - 2 + i \sin \frac{2k\pi}{n}.$$

624 Valoarea $\overline{a_n}$ este: A 1 B i C -1 D 0 E $-i$

625 Valoarea sumei $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, $n > 1$, este:

A $-2n$ B $2n$ C $1 - 2^n$ D $ni - 2n$ E $i + 2n$

626 Valoarea produsului $a_1 a_2 \dots a_n$ este:

A $2^n - 1$ B $(-1)^{n-1}(2^{n+1} - 1)$ C $(2n - 1)(-1)^n$ D $(-1)^n(2^n - 1)$

627 Să se calculeze expresia $E = (\sqrt{3} - i)^8(-1 + i\sqrt{3})^{11}$:

A $E = 2^{11}$; B $E = 2^{19}$; C $E = 2^{15}$; D $E = 2^5$; E 2^7 .

628 Dacă $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \alpha$, atunci expresia $E = z^n + z^{-n}$ are, pentru orice $n \in \mathbb{Z}$ și pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$, valoarea:

A $z i \sin n\alpha$ B $\cos n\alpha + i \sin n\alpha$ C $\operatorname{tg} n\alpha$ D $2 \cos n\alpha$ E $\sin n\alpha + \operatorname{tg} n\alpha$.

629 Câte rădăcini complexe are ecuația $z^3 = \bar{z}$? A 1 B 2 C 3 D 4 E 5.

630 Câte rădăcini complexe are ecuația $z^{n-1} = i\bar{z}$, $n > 2$, $n \in \mathbb{N}$?

A $n - 2$ B $n - 1$ C n D $n + 1$ E $n + 2$.

631 Fie numărul complex: $z = \left(\frac{\sqrt{3} - i}{1 + i}\right)^{12}$. Este adevărată afirmația:

A $z = 2^6$ B $\arg z = \pi$ C $|z| = 2^{12}$ D $z = 64i$ E $\arg z = 2\pi$

Exemplu Test Admitere

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 9, & x < 0, \\ 2x + 9, & x \geq 0. \end{cases}$

632 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ este: A 10 B $\frac{35}{4}$ C 9 D -9 E 2

633 Valoarea inversei funcției f în punctul 8 este:
 A -3 B -1 C 1 D 3 E f nu este inversabilă

Fie a o rădăcină a ecuației $x^2 + x + 1 = 0$.

634 a^3 este: A 0 B 1 C i D $1 + i\sqrt{3}$ E -1

635 $(1 + a)^{2016} + (1 + \bar{a})^{2016}$ este: A -1 B $1 + i\sqrt{3}$ C 2 D 1 E i

Se consideră sistemul de ecuații

$$\begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y + az = b \end{cases}$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$.

636 Sistemul are soluție unică dacă și numai dacă:

A $a \neq -2$ B $a \neq 0$ C $a \neq 2$ D $a > 0$ E $a \leq 0$

637 Sistemul are o infinitate de soluții dacă și numai dacă:

A $a = b = 1$ B $a = -2, b = 0$ C $a = 2, b = 1$ D $a = -1, b = 1$ E $a = -2, b = -2$

Pe \mathbb{R} se consideră legea de compoziție $x * y = ax + ay - xy$, $x, y \in \mathbb{R}$, unde a este un parametru real.

638 Mulțimea valorilor lui a pentru care legea este asociativă este:

- A $[0, \infty)$ B \mathbb{R} C $\{-1, 0, 1\}$ D $\{0, 1\}$ E $[0, 1]$

639 Mulțimea valorilor lui a pentru care intervalul $[0, 1]$ este parte stabilă a lui $(\mathbb{R}, *)$ este:

- A $[\frac{1}{2}, 1]$ B $[0, \frac{1}{2}]$ C $[0, 1]$ D $[1, \infty)$ E \mathbb{R}

640 Mulțimea perechilor $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pentru care $(\mathbb{R} \setminus \{b\}, *)$ este grup este:

- A $\{(0, 0), (1, 0)\}$ B $\{(0, 0), (1, 1)\}$ C $\{(0, 0), (0, 1)\}$ D $\{(-1, 0), (1, 0)\}$
 E $\{(-1, -1), (1, 0)\}$

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$.

641 A^2 este: A 0_2 B I_2 C A D $I_2 + A$ E $-A$

642 Numărul soluțiilor din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ale ecuației $X^{25} = A$ este:

- A 2 B 0 C 10 D 25 E ∞

Se consideră polinomul $P = X^3 + X^2 + aX + b \in \mathbb{Z}[X]$, având rădăcinile x_1, x_2, x_3 .

643 Perechea (a, b) pentru care $x = 1$ este rădăcina dublă a polinomului P este:

- A $(5, 3)$ B $(5, -3)$ C $(3, 5)$ D $(-5, 3)$ E $(0, 0)$

Să se calculeze integralele:

644 $\int_0^1 |2x - 1| dx$ A 0 B 1 C $\frac{1}{4}$ D 2 E $\frac{1}{2}$

645 $\int_0^{2\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx$ A 0 B π C π^2 D $2\pi^2$ E $4\pi^2$

Să se calculeze:

646 $\int_{-1}^1 \frac{2x + 2}{x^2 + 1} dx$ A $\frac{\pi}{4}$ B 0 C $\frac{\pi}{2}$ D π E $\ln 2 + \pi$

647 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \arctg x \cdot \cos(nx) dx$ A ∞ B 1 C $\frac{\pi}{2}$ D π E 0

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4|}$.

648 Mulțimea de derivabilitate a funcției f este:

- A $\mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$ B \mathbb{R} C \emptyset D $\{-2, 2\}$ E $(-2, 2)$

649 Numărul punctelor de extrem local a lui f este: A 0 B 3 C 1 D 2 E 4

650 Numărul asimptotelor lui f este: A 1 B 0 C 2 D 3 E 4

Să se calculeze limitele:

- 651 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 3n + 2}$ A 0 B 1 C 2 D 3 E $\frac{2}{3}$
- 652 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ A 0 B 1 C $\sqrt{2}$ D 2 E nu există
- 653 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sin n}{n + \sin n}$ A 0 B 1 C nu există D $\frac{1}{2}$ E ∞ .
- 654 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+3)!}{n!n^3} \right)^n$ A e B e^2 C e^4 D e^6 E ∞
- 655 $\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x$ A 0 B 1 C e D ∞ E nu există

Se consideră punctul $A(-1, 1)$ și dreapta $(d) : x - y = 2$.

- 656 Simetricul punctului A față de origine este:
 A $(1, 1)$ B $(-1, -1)$ C $(1, -1)$ D $(2, -1)$ E $(-1, 2)$
- 657 Distanța de la punctul A la dreapta (d) este: A $\sqrt{2}$ B 2 C $3\sqrt{2}$ D $2\sqrt{2}$ E 1.
- 658 Simetricul punctului A față de dreapta (d) este:
 A $(1, -1)$ B $(2, -2)$ C $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ D $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ E $(3, -3)$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^2 x + 4 \cos x$.

- 659 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ este: A $\frac{11}{4}$ B $\frac{5}{2}$ C π D 0 E $\frac{1}{2}$
- 660 Valoarea maximă a lui f este: A 1 B 2 C 3 D 4 E 5
- 661 Ecuația $f(x) = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă m aparține mulțimii:
 A $[0, 1]$ B $[-1, 1]$ C $[-4, 4]$ D $[-2, 0]$ E $[0, 3]$

Simulare admitere (13 mai 2017)

662 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care $x^2 + 2x + m \geq 0$ pentru orice x real este:

- A $(1, \infty)$ B $[1, \infty)$ C $[0, \infty)$ D \mathbb{R} E \emptyset

663 Mulțimea soluțiilor ecuației $\frac{2 \lg(x-2)}{\lg(5x-14)} = 1$ este:

- A \emptyset B $\{3, 6\}$ C $\{4\}$ D $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ E $\{6\}$

664 $\sin^2 \frac{\pi}{3} + \cos^2 \frac{\pi}{3}$ este:

- A $\sqrt{2}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{3}$ D 1 E $\sqrt{3}$

665 Numărul soluțiilor din intervalul $[0, 2\pi]$ ale ecuației $\sin x = \cos x$ este:

- A 4 B 0 C 1 D 3 E 2

666 Valoarea minimă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$, este:

- A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{3}{4}$ D $\frac{1}{3}$ E 0

Se consideră punctele $A(0, 3)$, $B(1, 0)$ și $C(6, 1)$.

667 Coordonatele mijlocului segmentului AC sunt:

- A $(2, 2)$ B $(3, 2)$ C $(3, 4)$ D $(3, 3)$ E $(4, 3)$

668 Coordonatele punctului D pentru care $ABCD$ este paralelogram sunt:

- A $(5, 4)$ B $(5, 5)$ C $(4, 4)$ D $(6, 4)$ E $(2, 4)$

669 Centrul de greutate al triunghiului ABC are coordonatele:

- A $\left(3, \frac{4}{3}\right)$ B $\left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)$ C $\left(4, \frac{4}{3}\right)$ D $\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ E $(1, 1)$

Se consideră sistemul
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + az = 1 \\ 3x + y + 4z = 2b^3 \end{cases}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- 670** Sistemul este compatibil determinat dacă și numai dacă:
 A $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}; b \in \mathbb{R}$ B $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}; b = 1$ C $a = b = 2$ D $a = 1; b \in \mathbb{R}$
 E $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; b \in \mathbb{R}$
- 671** Numărul perechilor $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat este:
 A 0 B 1 C 2 D 3 E infinit

Să se calculeze:

- 672** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+2}$ A ∞ B 1 C 0 D 2 E e
- 673** $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$ A nu există B 2 C 0 D ∞ E 1
- 674** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - \sin x}{x + \sin x}$ A 0 B 1 C 3 D ∞ E -1
- 675** $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n^2}} \right)$ A ∞ B -1 C e D 0 E $-\frac{1}{2}$

Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^{\frac{a}{x}}$, unde a este un parametru real.

- 676** Mulțimea valorilor lui a pentru care graficul funcției f admite asimptota $y = x + 2$ este:
 A $\{-2, 2\}$ B $\{1\}$ C $\{2\}$ D $\{-1\}$ E \emptyset
- 677** Mulțimea valorilor lui a pentru care graficul funcției f are două asimptote este:
 A $(0, 1)$ B $(1, \infty)$ C $(-\infty, 0)$ D $(0, \infty)$ E \emptyset

Se consideră polinomul

$$P(x) = (x^2 + x + 1)^{100} = a_0 + a_1x + \dots + a_{199}x^{199} + a_{200}x^{200}$$

având rădăcinile x_1, x_2, \dots, x_{200} .

- 678** Valoarea lui $P(0)$ este:
 A 30 B 0 C 200 D 100 E 1
- 679** Valoarea lui a_1 este:
 A 100 B 200 C 199 D 1 E 0
- 680** Restul împărțirii polinomului P la $x^2 + x$ este:
 A $100x - 1$ B 0 C 99 D $100x + 1$ E 1
- 681** Suma $\sum_{k=1}^{200} \frac{1}{1+x_k}$ este:
 A 100 B 200 C -100 D 0 E 1

Pe mulțimea \mathbb{Z} se definește legea de compoziție “*” prin

$$x * y = xy + mx + my + 2, \quad \text{unde } m \in \mathbb{Z}.$$

682 $0 * 0$ este:

- A 4 B 3 C 2 D 5 E 6

683 Fie $m = -1$. Știind că “*” este asociativă, $(-4) * (-3) * (-2) * (-1) * 0 * 1 * 2 * 3 * 4$ este:

- A 1 B -1 C 2 D -2 E 0

684 Mulțimea valorilor parametrului m pentru care legea “*” admite element neutru este:

- A $\{-1, 0, 2\}$ B $\{-1, 1, 2\}$ C $\{-1, 2\}$ D $\{-1\}$ E $\{2\}$

685 Dacă $m = 2$, atunci numărul elementelor simetrizabile în raport cu “*” este:

- A 1 B 2 C 0 D 4 E infinit

686 Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^1 |t - x|^3 dt$, are valoare minimă pentru x egal cu:

- A 1 B 0 C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{4}$ E -1

Să se calculeze:

687 $\int_0^1 x^9 dx$ A $\frac{1}{8}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{10}$ E 10

688 $\int_0^2 \frac{1}{4 + x^2} dx$ A $\frac{\pi}{6}$ B $\frac{\pi}{8}$ C $\frac{\pi}{4}$ D $\frac{\pi}{2}$ E π

689 $\int_0^1 \ln(x + 1) dx$ A $\ln \frac{e}{2}$ B $\ln \frac{2}{3}$ C 0 D $\ln \frac{4}{e}$ E $\ln 2$

690 $\int_0^1 \frac{1 + x^2}{1 + x^2 + x^4} dx$ A $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ B $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ C $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ D $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$ E $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$

691 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^n \frac{\arctg(x^2)}{1 + x^2} dx$ A $\frac{\pi^2}{2}$ B $\frac{\pi^2}{4}$ C $\frac{\pi^2}{8}$ D π^2 E $\frac{\pi^2}{6}$

Admitere (16 iulie 2017)

692 Fie șirul $a_n = n\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - a\sqrt{n} + \sqrt{n-1})$, $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{R}$.
Dacă șirul (a_n) este convergent, atunci limita lui este: A 0 B -1 C $-\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$ E $-\frac{1}{4}$

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{16x^2 + 1} + 4x - 5$.

693 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ este: A $-\infty$ B -5 C 4 D 8 E 0

694 Numărul asimptotelor funcției f este: A 2 B 0 C 1 D 3 E 4

Se consideră ecuația $a^x = 2x + 1$, unde $a \in (0, \infty)$ este fixat.

695 Valoarea lui a pentru care ecuația admite rădăcina $x = 1$ este:

A 2 B 1 C 3 D $\ln 2$ E e

696 Mulțimea valorilor lui a pentru care ecuația admite o singură rădăcină reală este:

A $(0, +\infty) \setminus \{e^2\}$ B $(0, 1] \cup \{e^2\}$ C $(0, e^2]$ D $[1, +\infty)$ E $(0, 1] \cup \{e\}$

697 Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[5]{x^3 - \operatorname{tg}^3 x}$. Valoarea lui $f'(0)$ este:

A -1 B $-\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{5}$ D $\sqrt[5]{\frac{1}{5}}$ E $-\sqrt[5]{\frac{1}{5}}$

Să se calculeze:

698 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 3^x}{2 \cdot 3^x + 1}$ A 2 B 0 C $+\infty$ D 3 E $\frac{1}{2}$

699 $\lim_{x \rightarrow +0} ((x+9)^x - 9^x)^x$ A nu există B 0 C e D 1 E $\ln 9$

Să se calculeze:

700 $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 + 9}$ A $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ B $\frac{\pi}{6}$ C $\frac{\pi}{4}$ D $\frac{\pi}{18}$ E $\frac{\pi}{12}$

701 $\int_1^e \ln \frac{1}{x} dx$ A -1 B 1 C $2e - 1$ D $1 - 2e$ E $e + 1$

702 $\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{1 + x^2} dx$ A 0 B $\frac{\pi}{4}$ C $\frac{\pi^2}{2}$ D $\frac{\pi}{2}$ E $\frac{\pi^2}{4}$

703 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_2^e (\ln x)^n dx$ A e B 0 C 1 D $\ln 2$ E ∞

704 Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x + 2$ și fie f^{-1} inversa funcției f .
Valoarea $(f^{-1})'(-2)$ este: A 15 B $\frac{1}{6}$ C 3 D $\frac{1}{3}$ E 2

În planul xOy se consideră punctele $A(3, 0)$ și $B(0, 4)$.

705 Distanța de la originea planului la dreapta AB este: A 2 B $\frac{4}{3}$ C $\frac{12}{5}$ D 3 E $2\sqrt{2}$

706 Ecuația mediatoarei segmentului $[AB]$ este:
 A $(x - \frac{3}{2}) + (y - 2) = 0$ B $4x + 3y + 4 = 0$ C $3x - 4y + 4 = 0$ D $6x - 8y + 7 = 0$
 E $x - y = 0$

707 Se consideră familia de funcții $f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = x^2 - (4m + 3)x + 4m + 2$, $m \in \mathbb{R}$.
Punctul din plan prin care trec toate graficele funcțiilor f_m este situat pe:
 A axa Oy B axa Ox C prima bisectoare D a doua bisectoare E alt răspuns

Fie e baza logaritmului natural. Pe intervalul $(0, +\infty)$ definim legea de compoziție $x * y = x^{2 \ln y}$, $\forall x > 0, y > 0$.

708 Elementul neutru este: A \sqrt{e} B 1 C e D $\frac{1}{\sqrt{e}}$ E e^2

709 Pentru $x \neq 1$, simetricul lui x în raport cu legea “*” este:
 A e^{-x} B $\frac{1}{x}$ C $e^{\frac{1}{4 \ln x}}$ D $x^{-2 \ln x}$ E $\frac{1}{2 \ln x}$

710 Valoarea lui $a > 0$ pentru care structura algebrică $((0, \infty) \setminus \{a\}, *)$ este grup, este:
 A e B 1 C $\frac{1}{e}$ D e^2 E \sqrt{e}

711 Numărul $e * e * e * \dots * e$, unde e apare de 10 ori, este:
 A e^{256} B e^{10} C e^{512} D $10^{\ln 10}$ E e^{1024}

Se consideră sistemul
$$\begin{cases} ax + y + z = -1 \\ x + ay + z = -a \\ x + y - z = -2 \end{cases}$$
, unde $a \in \mathbb{R}$.

712 Determinantul sistemului este:

- A a^2 B $a^2 + 2a - 3$ C $a^2 - 2a + 3$ D $-a^2 - 2a + 3$ E $2a + 3$

713 Sistemul este incompatibil dacă și numai dacă:

- A $a = -1$ B $a = 1$ C alt răspuns D $a \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$ E $a = -3$

714 Numărul valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul admite soluții (x, y, z) , cu x, y, z în progresie aritmetică în această ordine, este:

- A 0 B 3 C 1 D 2 E ∞

Se consideră funcția $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x + \cos 2x$.

715 $f(0)$ este: A 3 B -1 C 2 D $1/2$ E 1

716 Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 1$ este: A 1 B 3 C 2 D 5 E 0

717 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația $f(x) = m$ are soluții este: A $[0, \frac{9}{8}]$ B $[-2, 0]$ C $[-2, \frac{9}{8}]$ D \mathbb{R} E alt răspuns

718 Numărul soluțiilor reale ale ecuației $16^x = 3^x + 4^x$ este: A 2 B 1 C 3 D 0 E 4

Se dă ecuația $x^4 - 4x^3 + 2x^2 - x + 1 = 0$, cu rădăcinile $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$.

719 Valoarea sumei $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ este: A -2 B -4 C 2 D 4 E 1

720 Ecuația cu rădăcinile $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}, \frac{1}{x_4}$ este:

- A $x^4 + 4x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$ B $x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 1 = 0$ C $x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$
 D $x^4 - 4x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ E $x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$

721 Valoarea sumei $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2}$ este: A -3 B 3 C -2 D 2 E 1

* * *

Problemele au fost propuse/prelucrate/alese de către:

1 - Maria Câmpian	44 - Ioan Gavrea	87 - Daria Dumitraș
2 - Daria Dumitraș	45 - Daniela Roșca	88 - Daria Dumitraș
3 - Floare Tomuța	46 - Eugenia Duca	89 - Vasile Pop
4 - Maria Câmpian	47 - Eugenia Duca	90 - Silvia Toader
5 - Eugenia Duca	48 - Eugenia Duca	91 - Nicolaie Lung
6 - Liana Timboș	49 - Tania Lazar	92 - Nicolaie Lung
7 - Liana Timboș	50 - Gheorghe Toader	93 - Daniela Roșca
8 - Liana Timboș	51 - Daniela Marian	94 - Dorian Popa
9 - Dalia Cîmpean	52 - Ioan Rașa	95 - Neculae Vornicescu
10 - Dalia Cîmpean	53 - Ioan Rașa	96 - Neculae Vornicescu
11 - Dalia Cîmpean	54 - Ioan Rașa	97 - Vasile Miheșan
12 - Maria Câmpian	55 - Ioan Rașa	98 - Daria Dumitraș
13 - Maria Câmpian	56 - Alexandru Mitrea	99 - Vasile Miheșan
14 - Maria Câmpian	57 - Ioan Rașa	100 - Daniela Roșca
15 - Alexandra Ciupa	58 - Daniela Roșca	101 - Daniela Roșca
16 - Alexandra Ciupa	59 - Daniela Roșca	102 - Daniela Roșca
17 - Viorica Muresan	60 - Daniela Roșca	103 - Vasile Pop
18 - Viorica Muresan	61 - Daniela Roșca	104 - Vasile Pop
19 - Dalia Cîmpean	62 - Daniela Roșca	105 - Silvia Toader
20 - Radu Peter	63 - Alexandru Mitrea	106 - Silvia Toader
21 - Daria Dumitraș	64 - Gheorghe Toader	107 - Gheorghe Toader
22 - Daniela Inoan	65 - Eugenia Duca	108 - Rozica Moga
23 - Nicolaie Lung	66 - Silvia Toader	109 - Rozica Moga
24 - Viorica Mureșan	67 - Silvia Toader	110 - Viorica Mureșan
25 - Daria Dumitraș	68 - Silvia Toader	111 - Dorian Popa
26 - Daniela Roșca	69 - Ioan Gavrea	112 - Mircea Ivan
27 - Daniela Roșca	70 - Ioan Gavrea	113 - Iuliu Crivei
28 - Adela Novac	71 - Bogdan Gavrea	114 - Iuliu Crivei
29 - Adela Novac	72 - Bogdan Gavrea	115 - Daniela Roșca
30 - Floare Tomuța	73 - Alexandra Ciupa	116 - Ioan Gavrea
31 - Mircea Dan Rus	74 - Mihaela Bercheșan	117 - Ioan Gavrea
32 - Mircea Dan Rus	75 - Mihaela Bercheșan	118 - Vasile Pop
33 - Mircea Dan Rus	76 - Mihaela Bercheșan	119 - Alexandru Mitrea
34 - Floare Tomuța	77 - Eugenia Duca	120 - Ovidiu Furdui
35 - Iuliu Crivei	78 - Mircea Ivan	121 - Ovidiu Furdui
36 - Viorica Mureșan	79 - Alexandra Ciupa	122 - Eugenia Duca
37 - Neculae Vornicescu	80 - Alexandru Mitrea	123 - Alina Sîntămărian
38 - Neculae Vornicescu	81 - Ioan Rașa	124 - Vasile Pop
39 - Alexandra Ciupa	82 - Ioan Rașa	125 - Mircea Ivan
40 - Vasile Pop	83 - Ioan Rașa	126 - Mircea Ivan
41 - Vasile Câmpian	84 - Ioan Rașa	127 - Eugenia Duca
42 - Ioan Gavrea	85 - Mircea Ivan	128 - Neculae Vornicescu
43 - Ioan Gavrea	86 - Mircea Ivan	129 - Iuliu Crivei

130 - Gheorghe Toader	190 - Gheorghe Toader	250 - Dorian Popa
131 - Alexandra Ciupa	191 - Gheorghe Toader	251 - Dorian Popa
132 - Silvia Toader	192 - Iuliu Crivei	252 - Dorian Popa
133 - Vasile Câmpian	193 - Iuliu Crivei	253 - Mircea Ivan
134 - Daniela Inoan	194 - Daniela Roșca	254 - Mircea Ivan
135 - Dorian Popa	195 - Vasile Miheșan	255 - Mircea Ivan
136 - Neculae Vornicescu	196 - Vasile Miheșan	256 - Vasile Pop
137 - Mircea Ivan	197 - Vasile Miheșan	257 - Adela Novac
138 - Vasile Pop	198 - Vasile Pop	258 - Daniela Roșca
139 - Mircea Ivan	199 - Vasile Pop	259 - Ioan Rașa
140 - Daniela Inoan	200 - Vasile Pop	260 - Maria Câmpian
141 - Dorian Popa	201 - Vasile Pop	261 - Maria Câmpian
142 - Gheorghe Toader	202 - Silvia Toader	262 - Adela Novac
143 - Viorica Mureșan	203 - Silvia Toader	263 - Maria Câmpian
144 - Vasile Pop	204 - Silvia Toader	264 - Viorica Mureșan
145 - Floare Tomuța	205 - Silvia Toader	265 - Daniela Roșca
146 - Floare Tomuța	206 - Silvia Toader	266 - Alexandra Ciupa
147 - Vasile Miheșan	207 - Ioan Rașa	267 - Ioan Rașa
148 - Ioan Gavrea	208 - Ioan Rașa	268 - Nicolaie Lung
149 - Ioan Gavrea	209 - Ioan Rașa	269 - Alexandra Ciupa
150 - Radu Peter	210 - Mircia Gurzău	270 - Ioan Rașa
151 - Ioan Rașa	211 - Vasile Pop	271 - Daria Dumitraș
152 - Vasile Pop	212 - Vasile Pop	272 - Adela Capătă
153 - Vasile Pop	213 - Alexandru Mitrea	273 - Mircea Ivan
154 - Neculae Vornicescu	214 - Gheorghe Toader	274 - Alina Sîntămărian
155 - Alexandru Mitrea	215 - Dorian Popa	275 - Mircea Ivan
156 - Alexandru Mitrea	216 - Dorian Popa	276 - Neculae Vornicescu
157 - Floare Tomuța	217 - Dorian Popa	277 - Silvia Toader
158 - Daniela Roșca	218 - Iuliu Crivei	278 - Marius Birou
159 - Mircea Ivan	219 - Iuliu Crivei	279 - Alexandra Ciupa
160 - Mircea Dan Rus	220 - Daniela Inoan	280 - Adrian Holhos
161 - Mircea Dan Rus	221 - Dorian Popa	281 - Adrian Holhos
162 - Alexandra Ciupa	222 - Ioan Rașa	282 - Ioan Rașa
163 - Vasile Miheșan	223 - Adela Novac	283 - Eugenia Duca
164 - Ioan Rașa	224 - Adela Novac	284 - Mircea Ivan
165 - Vasile Pop	225 - Dorian Popa	285 - Adela Capătă
166 - Floare Tomuța	226 - Dorian Popa	286 - Adela Capătă
167 - Alexandru Mitrea	227 - Dorian Popa	287 - Viorica Mureșan
168 - Alexandru Mitrea	228 - Mircea Ivan	288 - Vasile Pop
169 - Alexandru Mitrea	229 - Nicolaie Lung	289 - Mircea Ivan
170 - Alexandru Mitrea	230 - Nicolaie Lung	290 - Radu Peter
171 - Alexandru-Ioan Mitrea	231 - Nicolaie Lung	291 - Adrian Holhoș
172 - Alexandru-Ioan Mitrea	232 - Constantin Todea	292 - Floare Tomuța
173 - Alexandru-Ioan Mitrea	233 - Constantin Todea	293 - Floare Tomuța
174 - Alexandru Mitrea	234 - Constantin Todea	294 - Dorian Popa
175 - Alexandru Mitrea	235 - Vasile Pop	295 - Alexandra Ciupa
176 - Alexandru Mitrea	236 - Ioan Gavrea	296 - Vasile Pop
177 - Dorian Popa	237 - Vasile Pop	297 - Radu Peter
178 - Dorian Popa	238 - Vasile Pop	298 - Radu Peter
179 - Dorian Popa	239 - Vasile Pop	299 - Alexandru Mitrea
180 - Dorian Popa	240 - Silvia Toader	300 - Ovidiu Furdui
181 - Dorian Popa	241 - Silvia Toader	301 - Mircea Ivan
182 - Vasile Pop	242 - Daniela Roșca	302 - Mircea Ivan
183 - Gheorghe Toader	243 - Alexandru Mitrea	303 - Mircea Ivan
184 - Viorica Mureșan	244 - Mircea Ivan	304 - Mircea Ivan
185 - Viorica Mureșan	245 - Ioan Gavrea	305 - Mircea Ivan
186 - Daniela Roșca	246 - Dorian Popa	306 - Daniela Roșca
187 - Maria Câmpian	247 - Dorian Popa	307 - Daniela Roșca
188 - Nicolaie Lung	248 - Dorian Popa	308 - Lucia Blaga
189 - Gheorghe Toader	249 - Dorian Popa	309 - Lucia Blaga

310 - Maria Câmpian	370 - Mircea Ivan	430 - Daniela Marian
311 - Alexandra Ciupa	371 - Dorian Popa	431 - Gheorghe Toader
312 - Alexandra Ciupa	372 - Vasile Ile	432 - Ioan Raşa
313 - Alexandra Ciupa	373 - Alexandru Mitrea	433 - Rozica Moga
314 - Vasile Pop	374 - Lucia Blaga	434 - Alexandra Ciupa
315 - Maria Câmpian	375 - Mircea Ivan	435 - Ovidiu Furdui
316 - Neculae Vornicescu	376 - Daniela Roşca	436 - Maria Câmpian
317 - Daniela Inoan	377 - Alexandru Mitrea	437 - Alexandru Mitrea
318 - Tania Lazar	378 - Gheorghe Toader	438 - Mircea Ivan
319 - Tania Lazar	379 - Gheorghe Toader	439 - Rozica Moga
320 - Daniela Inoan	380 - Mircea Dan Rus	440 - Rozica Moga
321 - Dorian Popa	381 - Mircea Dan Rus	441 - Alina Sîntămărian
322 - Vasile Pop	382 - Mircea Dan Rus	442 - Rozica Moga
323 - Maria Câmpian	383 - Dorian Popa	443 - Nicolaie Lung
324 - Radu Peter	384 - Dorian Popa	444 - Maria Câmpian
325 - Iuliu Crivei	385 - Dorian Popa	445 - Maria Câmpian
326 - Alexandra Ciupa	386 - Ioan Gavrea	446 - Neculae Vornicescu
327 - Vasile Câmpian	387 - Ioan Gavrea	447 - Vasile Miheşan
328 - Adrian Holhoş	388 - Alexandru Mitrea	448 - Viorica Mureşan
329 - Alina-Ramona Baias	389 - Dalia Cîmpean	449 - Ovidiu Furdui
330 - Adrian Holhoş	390 - Dorian Popa	450 - Viorica Mureşan
331 - Neculae Vornicescu	391 - Vasile Pop	451 - Mircea Ivan
332 - Mircea Ivan	392 - Vasile Pop	452 - Luminita Cotirla
333 - Mircea Ivan	393 - Vasile Pop	453 - Daniela Roşca
334 - Mircea Ivan	394 - Neculae Vornicescu	454 - Ovidiu Furdui
335 - Mircea Dan Rus	395 - Iuliu Crivei	455 - Alina-Ramona Baias
336 - Mircea Dan Rus	396 - Mircea Ivan	456 - Alina-Ramona Baias
337 - Mircea Dan Rus	397 - Alexandru Mitrea	457 - Alina-Ramona Baias
338 - Neculae Vornicescu	398 - Ioan Raşa	458 - Ovidiu Furdui
339 - Neculae Vornicescu	399 - Vasile Pop	459 - Alexandru Mitrea
340 - Daniela Roşca	400 - Vasile Pop	460 - Alexandru Mitrea
341 - Vasile Pop	401 - Mircia Gurzău	461 - Floare Tomuţa
342 - Alexandru Mitrea	402 - Neculae Vornicescu	462 - Daniela Inoan
343 - Dorian Popa	403 - Daniela Marian	463 - Daniela Inoan
344 - Tania Lazar	404 - Daniela Marian	464 - Daniela Inoan
345 - Adela Novac	405 - Neculae Vornicescu	465 - Floare Tomuţa
346 - Adela Novac	406 - Mihaela Bercheşan	466 - Maria Câmpian
347 - Adela Novac	407 - Mihaela Bercheşan	467 - Iuliu Crivei
348 - Mircea Ivan	408 - Mihaela Bercheşan	468 - Dorian Popa
349 - Daniela Roşca	409 - Alexandru Mitrea	469 - Mircea Ivan
350 - Ioan Raşa	410 - Adela Novac	470 - Ioan Gavrea
351 - Daniela Marian	411 - Daniela Roşca	471 - Ioan Gavrea
352 - Vasile Pop	412 - Silvia Toader	472 - Mircea Ivan
353 - Mircea Ivan	413 - Gheorghe Toader	473 - Alexandru Mitrea
354 - Mircea Ivan	414 - Silvia Toader	474 - Alexandru Mitrea
355 - Ioan Gavrea	415 - Gheorghe Toader	475 - Vasile Miheşan
356 - Neculae Vornicescu	416 - Mircia Gurzău	476 - Vasile Miheşan
357 - Mircea Ivan	417 - Mircia Gurzău	477 - Dorian Popa
358 - Mircea Ivan	418 - Vasile Miheşan	478 - Dorian Popa
359 - Mircea Ivan	419 - Mircea Ivan	479 - Alina Sîntămărian
360 - Alexandra Ciupa	420 - Vasile Câmpian	480 - Vasile Pop
361 - Alexandru Mitrea	421 - Dorian Popa	481 - Ioan Gavrea
362 - Daniela Roşca	422 - Mircea Ivan	482 - Alexandra Ciupa
363 - Daniela Roşca	423 - Mircea Ivan	483 - Liana Timboş
364 - Mircea Dan Rus	424 - Mircea Ivan	484 - Liana Timboş
365 - Mircea Dan Rus	425 - Daniela Inoan	485 - Liana Timboş
366 - Mircea Dan Rus	426 - Mircea Ivan	486 - Vasile Pop
367 - Dorian Popa	427 - Teodor Potra	487 - Daniela Roşca
368 - Ioan Gavrea	428 - Alexandru Mitrea	488 - Alexandra Ciupa
369 - Alexandru Mitrea	429 - Viorica Mureşan	489 - Alexandra Ciupa

490 - Mircea Gurzău	538 - Liana Timboș	586 - Mircea Ivan
491 - Daniela Marian	539 - Floare Tomuța	587 - Vasile Miheșan
492 - Daniela Marian	540 - Floare Tomuța	588 - Dorian Popa
493 - Nicolaie Lung	541 - Floare Tomuța	589 - Silvia Toader
494 - Alexandru Mitrea	542 - Daniela Inoan	590 - Alina Sîntămărian
495 - Alexandru Mitrea	543 - Vasile Pop	591 - Alexandru Mitrea
496 - Alexandru Mitrea	544 - Vasile Pop	592 - Silvia Toader
497 - Mircea Dan Rus	545 - Vasile Pop	593 - Viorica Mureșan
498 - Mircea Dan Rus	546 - Vasile Pop	594 - Mircea Ivan
499 - Mircea Dan Rus	547 - Vasile Pop	595 - Maria Cămpian
500 - Mircea Dan Rus	548 - Vasile Pop	596 - Alexandru Mitrea
501 - Ovidiu Furdui	549 - Vasile Pop	597 - Dorian Popa
502 - Ovidiu Furdui	550 - Rozica Moga	598 - Alexandru Mitrea
503 - Mircea Ivan	551 - Mircea Ivan	599 - Dorian Popa
504 - Mircea Ivan	552 - Mircia Gurzău	600 - Dorian Popa
505 - Mircea Ivan	553 - Mircea Dan Rus	601 - Daniela Inoan
506 - Mircea Ivan	554 - Mircea Dan Rus	602 - Daniela Inoan
507 - Mircea Ivan	555 - Mircea Dan Rus	603 - Daniela Inoan
508 - Mircea Ivan	556 - Viorica Mureșan	604 - Daniela Inoan
509 - Vasile Miheșan	557 - Bogdan Gavrea	605 - Vasile Miheșan
510 - Mircea Ivan	558 - Bogdan Gavrea	606 - Vasile Miheșan
511 - Mircea Ivan	559 - Ioan Gavrea	607 - Alexandru Mitrea
512 - Mircea Ivan	560 - Ioan Gavrea	608 - Ioan Rașa
513 - Mircea Ivan	561 - Vasile Miheșan	609 - Dalia Cîmpean
514 - Vasile Cămpian	562 - Adrian Holhoș	610 - Dalia Cîmpean
515 - Ioan Rașa	563 - Alina Sîntămărian	611 - Dalia Cîmpean
516 - Maria Cămpian	564 - Alina Sîntămărian	612 - Marius Birou
517 - Maria Cămpian	565 - Marius Birou	613 - Marius Birou
518 - Alexandra Ciupa	566 - Maria Cămpian	614 - Alexandru Mitrea
519 - Vasile Miheșan	567 - Floare Tomuța	615 - Vasile Miheșan
520 - Viorica Mureșan	568 - Vasile Miheșan	616 - Alexandra Ciupa
521 - Viorica Mureșan	569 - Eugenia Duca	617 - Daria Dumitraș
522 - Teodor Potra	570 - Vasile Cămpian	618 - Alina-Ramona Baias
523 - Silvia Toader	571 - Daniela Roșca	619 - Alina-Ramona Baias
524 - Daria Dumitraș	572 - Daniela Roșca	620 - Alina-Ramona Baias
525 - Vasile Pop	573 - Dorian Popa	621 - Ioan Gavrea
526 - Vasile Pop	574 - Vasile Pop	622 - Ioan Gavrea
527 - Dorian Popa	575 - Vasile Miheșan	623 - Ioan Gavrea
528 - Dorian Popa	576 - Maria Cămpian	624 - Daniela Inoan
529 - Mircia Gurzău	577 - Alexandru Mitrea	625 - Daniela Inoan
530 - Mircia Gurzău	578 - Alexandru Mitrea	626 - Daniela Inoan
531 - Mihaela Bercheșan	579 - Alexandru Mitrea	627 - Daria Dumitraș
532 - Mihaela Bercheșan	580 - Vasile Miheșan	628 - Dorian Popa
533 - Mihaela Bercheșan	581 - Gheorghe Toader	629 - Vasile Pop
534 - Alina-Ramona Baias	582 - Mircea Ivan	630 - Vasile Miheșan
535 - Alina-Ramona Baias	583 - Alexandru Mitrea	631 - Eugenia Duca
536 - Alina-Ramona Baias	584 - Daria Dumitraș	
537 - Liana Timboș	585 - Radu Peter	

Răspunsuri

1: C	31: C	61: A	91: D	121: B	151: C
2: C	32: D	62: C	92: A	122: C	152: C
3: D	33: B	63: B	93: B	123: B	153: C
4: C	34: C	64: B	94: B	124: B	154: C
5: D	35: D	65: C	95: A	125: D	155: B
6: A	36: C	66: A	96: D	126: B	156: D
7: B	37: B	67: B	97: C	127: A	157: D
8: C	38: C	68: C	98: D	128: C	158: D
9: B	39: B	69: D	99: A	129: C	159: C
10: C	40: D	70: C	100: C	130: A	160: C
11: D	41: C	71: C	101: B	131: A	161: D
12: B	42: C	72: E	102: D	132: B	162: B
13: C	43: D	73: C	103: B	133: C	163: D
14: C	44: C	74: A	104: C	134: D	164: D
15: B	45: C	75: B	105: E	135: D	165: C
16: D	46: B	76: D	106: B	136: C	166: B
17: A	47: E	77: E	107: A	137: C	167: B
18: B	48: D	78: E	108: A	138: D	168: A
19: B	49: C	79: D	109: B	139: B	169: B
20: E	50: D	80: C	110: C	140: A	170: D
21: A	51: A	81: A	111: C	141: D	171: A
22: E	52: C	82: B	112: E	142: C	172: D
23: B	53: B	83: A	113: B	143: E	173: D
24: B	54: A	84: D	114: B	144: C	174: C
25: C	55: E	85: E	115: E	145: E	175: D
26: B	56: B	86: B	116: E	146: C	176: B
27: C	57: B	87: E	117: C	147: D	177: C
28: D	58: C	88: E	118: C	148: A	178: A
29: A	59: D	89: D	119: B	149: A	179: B
30: C	60: A	90: B	120: A	150: A	180: C

181: D	225: B	269: A	313: D	357: D	401: B
182: C	226: B	270: B	314: E	358: B	402: C
183: C	227: E	271: C	315: D	359: A	403: A
184: C	228: A	272: A	316: D	360: C	404: A
185: C	229: B	273: A	317: A	361: A	405: C
186: A	230: A	274: B	318: D	362: B	406: C
187: C	231: B	275: B	319: B	363: D	407: E
188: C	232: A	276: B	320: B	364: B	408: E
189: B	233: D	277: D	321: A	365: A	409: D
190: B	234: E	278: C	322: E	366: C	410: B
191: B	235: A	279: C	323: C	367: C	411: E
192: C	236: B	280: A	324: B	368: D	412: E
193: B	237: E	281: C	325: D	369: B	413: D
194: E	238: D	282: E	326: A	370: E	414: A
195: E	239: B	283: E	327: B	371: E	415: C
196: D	240: A	284: D	328: A	372: A	416: B
197: B	241: C	285: B	329: A	373: B	417: B
198: D	242: A	286: E	330: A	374: D	418: D
199: E	243: D	287: E	331: E	375: C	419: E
200: C	244: E	288: C	332: E	376: C	420: E
201: C	245: B	289: E	333: D	377: E	421: B
202: A	246: D	290: E	334: B	378: C	422: D
203: A	247: B	291: C	335: C	379: A	423: A
204: B	248: B	292: A	336: E	380: D	424: C
205: D	249: E	293: B	337: B	381: E	425: B
206: A	250: A	294: E	338: B	382: B	426: C
207: B	251: C	295: E	339: B	383: C	427: E
208: B	252: A	296: D	340: C	384: B	428: C
209: B	253: A	297: A	341: A	385: B	429: C
210: C	254: A	298: C	342: E	386: D	430: A
211: C	255: A	299: E	343: A	387: C	431: A
212: D	256: D	300: B	344: B	388: E	432: A
213: B	257: B	301: B	345: C	389: D	433: B
214: C	258: D	302: E	346: D	390: B	434: C
215: D	259: C	303: C	347: E	391: C	435: A
216: D	260: C	304: E	348: B	392: A	436: C
217: B	261: D	305: A	349: E	393: A	437: D
218: B	262: E	306: E	350: E	394: B	438: B
219: A	263: B	307: D	351: A	395: A	439: A
220: B	264: D	308: B	352: E	396: A	440: E
221: D	265: A	309: A	353: C	397: B	441: A
222: A	266: D	310: C	354: B	398: B	442: A
223: A	267: D	311: B	355: C	399: D	443: B
224: B	268: B	312: C	356: E	400: D	444: D

445: A	492: B	539: D	586: A	633: B	680: E
446: A	493: D	540: B	587: E	634: B	681: A
447: A	494: B	541: D	588: B	635: C	682: C
448: D	495: C	542: A	589: C	636: A	683: A
449: D	496: D	543: A	590: A	637: E	684: C
450: B	497: B	544: A	591: D	638: D	685: B
451: A	498: D	545: B	592: E	639: A	686: C
452: A	499: A	546: E	593: C	640: B	687: D
453: B	500: C	547: A	594: E	641: A	688: B
454: C	501: C	548: C	595: B	642: B	689: D
455: A	502: C	549: D	596: D	643: D	690: B
456: C	503: E	550: E	597: E	644: E	691: C
457: D	504: B	551: D	598: D	645: A	692: E
458: B	505: C	552: D	599: B	646: D	693: B
459: A	506: B	553: D	600: E	647: E	694: A
460: C	507: E	554: A	601: A	648: A	695: C
461: B	508:	555: C	602: B	649: B	696: B
462: E	509:	556: D	603: A	650: C	697: A
463: A	510:	557: D	604: C	651: B	698: E
464: B	511:	558: D	605: C	652: A	699: D
465: C	512:	559: B	606: B	653: B	700: E
466: D	513:	560: C	607: B	654: D	701: A
467: B	514: C	561: A	608: D	655: B	702: E
468: A	515: A	562: B	609: D	656: C	703: A
469: B	516: D	563: A	610: B	657: D	704: B
470: C	517: E	564: C	611: A	658: E	705: C
471: B	518: A	565: C	612: D	659: A	706: D
472: A	519: C	566: D	613: A	660: D	707: B
473: E	520: A	567: E	614: D	661: C	708: A
474: D	521: D	568: B	615: C	662: B	709: C
475: C	522: A	569: C	616: E	663: E	710: B
476: B	523: A	570: C	617: A	664: D	711: C
477: A	524: D	571: B	618: B	665: E	712: D
478: E	525: B	572: E	619: D	666: A	713: E
479: A	526: A	573: B	620: C	667: B	714: D
480: E	527: B	574: D	621: B	668: A	715: E
481: A	528: D	575: D	622: A	669: D	716: D
482: A	529: C	576: C	623: B	670: A	717: C
483: A	530: A	577: A	624: C	671: B	718: B
484: B	531: D	578: A	625: A	672: D	719: D
485: C	532: B	579: C	626: D	673: E	720: C
486: C	533: C	580: B	627: B	674: C	721: A
487: D	534: A	581: E	628: D	675: E	
488: B	535: B	582: A	629: E	676: C	
489: B	536: B	583: D	630: D	677: D	
490: C	537: A	584: C	631: B	678: E	
491: A	538: B	585: B	632: A	679: A	

2 $\lg 2^x = \lg(2^x + x - 1)$.

3 Se obține ecuația $2(x^3 + 1) = 0$.

6 $f(1) = 0 \Rightarrow a + b = -2, f'(1) = 0 \Rightarrow 99a + b = -100 \Rightarrow a = -1; b = -1$.

7 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ este rădăcina polinomului $X^2 + X + 1$ și $\omega^3 = 1$. Din $f(\omega) = 0 \Rightarrow a = -1; b = -1$.

8 $f = (X - 1)^2(X + 1) \cdot q + X^2 + X + 1$. Avem că $f(1) = 3, f(-1) = 1 \Rightarrow a + b = 1$ iar din $f'(1) = 3 \Rightarrow 99a + b = -97$, deci $a = -1; b = 2$.

16 Coordonatele vârfului unei parabole sunt $x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{1-m}{m}, y_V = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{m-1}{m}$. Se observă relația $y_V = -x_V$.

23 Ecuație echivalentă cu $9^{x-1} + 7 = 4(3^{x-1} + 1), \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 2$.

25 $1+x > 0, x \neq 0, 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1 > 0$. Ecuația se mai scrie $2x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = (1+x)^3$.

27 Din $(a + b + c)^2 \geq 0$ rezultă $ab + bc + ac \geq -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$. $a = 1/\sqrt{2}, b = -1/\sqrt{2}, c = 0$.

38 Ambele polinoame se divid cu $x^2 + x + 1$, iar primul nu se divide cu $x - 1$.

51 Se calculează mai întâi AA^t iar apoi determinantul acestei matrici, $x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -2m, x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -3n, x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 2m^2$.

74 Se verifică ușor faptul ca $A \in P_1$ și $B \in P_1$. Pe de altă parte, $A \in P_2$ și $B \in P_2$ este echivalent cu

$$\begin{cases} 5 \cdot m + 2 \cdot n = 8 \\ m = -2. \end{cases}$$

Prin urmare, $m = -2$ și $n = 9$ este soluția.

75 Se observă că $C \in P_1$. Punem condiția ca $C \in P_2$ și obținem relația $10m + 3n = 19$. Pentru că parabolele nu sunt tangente, ecuația

$$(m - 1)x^2 + (4m + n - 5)x + 5m + 2n - 4 = x^2 + 5x + 4$$

este de gradul I și atunci $m = 2$. Din relația $10m + 3n = 19$, rezultă $n = -\frac{1}{3}$. Prin urmare, soluția este $m = 2$ și $n = -\frac{1}{3}$.

76 Din faptul că $T \in P_2$ rezultă că $m = -2$. Dacă parabolele sunt tangente, ecuația $-4x^2 + (n - 17)x + 2n - 18 = 0$ are rădăcină dublă și din condiția $\Delta = 0$ obținem $n = 1$. Soluția este $m = -2$ și $n = 1$.

93 Notăm $y = 2^x + 2^{-x}$. Ecuația devine $8y^2 - 54y + 85 = 0$, cu soluțiile $y_1 = \frac{17}{4}$, $y_2 = \frac{5}{2}$. Soluțiile ecuației date sunt $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$, $x_4 = -2$.

98 Pentru ca $f(x)$ să fie surjectivă trebuie ca $m > 0$ și $2m - 1 \leq 1 + m \Rightarrow m \in (0, 2]$.

99 Se obține ecuația $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = a + \frac{1}{2}$.

122

$$\begin{aligned}x_1^2 &= 2 + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \\x_1^4 &= 12 + 4(\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}) \\x_1^4 - mx_1^2 - 4 &= 8 - 2m + (4 - m)(\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}) \\x_1^4 - mx_1^2 - 5 &= 0 \Leftrightarrow \\2(4 - m) + (4 - m)(\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}) &= 0 \Rightarrow m = 4.\end{aligned}$$

144 Folosind relațiile lui Viète, rezultă că x, y, z sunt rădăcinile ecuației $t^3 - t^2 - t + 1 = 0$.

157 Suma coeficienților unui polinom este valoarea sa pentru $x = 1$.

173 $\det(A) = V(1, -i, -1, i)$ și $A^4 = 16I_4$.

177 $\text{rang}(A \cdot B) \leq \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$.

220 Se scriu toți logaritmi în baza x .

234 Avem: $x_1^2 + x_1 + 1 = 0$, $x_1^3 = 1$, $x_1^2 = -x_1 - 1$, $x_1^2 = \frac{1}{x_1}$.
Deducem: $\det(I_2 + x_1A + x_1^2A^2) = \det(I_2 + x_1A - x_1A^2 - A^2)$
 $= \det((I_2 - A)(I_2 + A) + x_1A(I_2 - A)) = \det((I_2 - A)(I_2 + (x_1 + 1)A))$
 $= \det(I_2 - A) \cdot \det(I_2 - x_1^2A) = \det(I_2 - A) \cdot \det\left(\frac{x_1I_2 - A}{x_1}\right) = 1$.
(Un exemplu de astfel de matrice $A \neq O_2$ este $A = (1 + x_1)I_2$.)

235 Avem $A^2 - (a + d)A + I_2 \det(A) = O_2$. Deducem: $A^n = O_2 \Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow A^n = (a + d)^{n-1}A \Rightarrow a + d = 0 \Rightarrow A^2 = O_2$.

239 $f : (-1, 1) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = f^{-1}(x) = \frac{1-x}{1+x}$ izomorfism de la $((-1, 1), *)$ la $((0, \infty), \cdot)$.
 $\prod_{k=2}^n f(1/k) = \frac{2}{n+n^2}$; $f^{-1}\left(\frac{2}{n+n^2}\right) = \frac{-2+n+n^2}{2+n+n^2}$.

247 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{x_n} > 0$, deci șirul este crescător. Rezultă că șirul are o limită L , finită sau infinită. Dacă presupunem că L este finită, avem $L = L + 2/L$, deci $2/L = 0$, fals. Prin urmare $L = \infty$. Conform Lemei Stolz-Cesaro avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2 - x_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 4/x_n^2 = 4$.
Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = 2$.

249 $x_{n+1} - x_n = e^{x_n} - x_n - 1 \geq 0, \forall n \geq 0$, deci șirul este crescător.

250 Cum șirul este crescător rezultă că există $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \overline{\mathbb{R}}$. Dacă presupunem că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, x \in \mathbb{R}$, din recurență obținem $x = e^x - 1$, de unde $x = 0$ contradicție cu $x_0 > 0$ și monotonia lui $(x_n)_{n \geq 0}$. Deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

251 Pentru $x_0 \leq 0$, șirul este crescător și mărginit superior de 0.

252 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}}$ și se aplică Stolz-Cesaro.

255 Vezi problema 508.

265 $\frac{1}{(k+1)\sqrt{k+k}\sqrt{k+1}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$.

266 $\frac{2^{k-1}}{(1+2^k)(1+2^{k+1})} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+2^k} - \frac{1}{1+2^{k+1}} \right)$.

272 Se scade $2n\pi$ la argumentul funcției cosinus.

279 $p_n = \frac{\sin 2^n x}{2^n \sin x}$.

286 Se va folosi $x - 1 < [x] \leq x$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

287 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(a^{\frac{n}{1}} + a^{\frac{n}{2}} + \dots + a^{\frac{n}{n}} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \ln a + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a^{-\frac{n}{2}} + \dots + a^{-n+1})}{n} = \ln a$.

291 $x_n = [n \lg_3 2 + \lg_3 2008]$.

297 $x_{2n} = y_n + \frac{1}{4}x_n$.

302 De exemplu, $x - \sin(\sin(\sin x)) = (x - \sin x) + (\sin x - \sin(\sin x)) + (\sin(\sin x) - \sin(\sin(\sin x)))$; limita este $n/6$.

317 Se pune $t = \frac{1}{x}$ și apoi se aplică regula lui L'Hospital:

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} (1+t)^{\frac{1}{t}} \left[\frac{1}{t(t+1)} - \frac{\ln(1+t)}{t^2} \right] =$$
$$e \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{t - (t+1) \ln(t+1)}{t^3 + t^2} = -\frac{e}{2}.$$

320 Se aplică regula lui L'Hospital de două ori.

328 Se folosește limita $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = 1$.

330 $|1/a| < 1$ și $(1/a)^n \rightarrow 0$.

343 Se scrie ecuația sub forma $xe^{-\frac{2}{x-1}} = m$ și se aplică șirul lui Rolle.

354 Pentru $b \neq 0$ se consideră $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} b - \operatorname{arctg} \frac{x+b}{1-xb}$, $x \neq 1/b$. Se obține $f'(x) = 0$.

356 $Q(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{99(x^{101}-1) - 101x(x^{99}-1)}{(x-1)^3}$.

361 $f'(0) = \sqrt[5]{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3 - x + \sin x}{x^5}}$.

404 $f'(x) = 0$ deci f este constantă pe fiecare din intervalele din domeniu.

406 Tinând cont de domeniile funcțiilor care intervin în definiția funcției f avem: $|\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1$ și $|x| \in \mathbb{R}$ ceea ce este echivalent cu $x \in \mathbb{R}$.

407 Calculăm derivata funcției f și obținem

$$f'(x) := \begin{cases} \frac{-2}{1+x^2}, & x \in (-\infty, -1); \\ 0, & x \in (-1, 0) \cup (1, \infty); \\ \frac{2}{1+x^2}, & x \in (0, 1). \end{cases}$$

Prin urmare, pe intervalul $[1, \infty)$ funcția este constantă, deci $f(\pi) = f(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{2}$.

408 $f'(x) < 0$ pentru orice $x \in (-\infty, -1)$.

425 Substituție $t = \sqrt{\frac{x}{x+3}}$.

428 $x - 1 = t$; se obține $\int_{-1}^1 f(t)dt$ unde $f(t) = \frac{2t^3+3t}{(t^2+4)^n}$ este funcție impară.

429

$$\int_0^1 \frac{2}{(1+x^2)^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^2+1-x^2}{(1+x^2)^2} dx.$$

430 Facem schimbarea de variabilă $x = 3 - t$.

431 Schimbare de variabilă $\sqrt{x+1} = t$.

433 $P(n) = n^5 - (n-1)^5$, $n \geq 2$.

455 Se folosește substituția $u = \operatorname{tg} x$.

457 Se folosește relația $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ și se aplică problema 455.

459 $L(0) = 1$ și $L(a) = \frac{1}{a}(e^a - 1)$ pentru $a > 0$.

460 Limita este $\int_0^1 x^2 \arcsin x dx$.

461 Se integrează prin părți, după ce s-a utilizat formula $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$.

464 Avem $f(a) = \begin{cases} \frac{1}{2} - a, & a \leq 0, \\ \frac{1}{2} - a + a^2, & 0 < a < 1, \\ -\frac{1}{2} + a, & a \geq 1. \end{cases}$

468 $\arcsin(\sin x) = x$, dacă $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin(\sin x) = \pi - x$, dacă $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$.

479 Avem

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{x^3 - x - 2}{x^3 e^x} dx &= \int_1^2 \frac{1}{e^x} dx - \int_1^2 \frac{1}{x^2 e^x} dx - \int_1^2 \frac{2}{x^3 e^x} dx = \\ &= -\frac{1}{e^x} \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x^2 e^x} dx + \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2}\right)' \frac{1}{e^x} dx. \end{aligned}$$

482 Dacă $G(x) = \int_0^x e^{t^3} dt$, $G'(x) = e^{x^3}$, $F(x^2) = G(x^2)$, $F'(x) = e^{x^6} 2x$.

483 $f_1(x) = \int_0^{x^2} t \cdot e^t dt = e^t(t-1) \Big|_0^{x^2} = e^{x^2}(x^2-1) + 1$.

484 $f'_n(x) = (F(x^2) - F(0))' = 2x \cdot F'(x^2) = 2x(x^2)^n e^{x^2} = 2x^{2n+1} e^{x^2}$, pentru $n = 1$ se obține $f'_n(1) = 2e$.

485 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n \cdot e^t dt \leq \lim_{n \rightarrow \infty} e \int_0^1 t^n dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{n+1} = 0$.

487 $nx - 1 \leq [nx] \leq nx$.

490 Schimbare de variabilă $x = \pi - t$.

492 $I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi x f(\sin x) dx$. Facem schimbarea de variabilă $x = \pi - y$ în a doua integrală și obținem $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - y) f(\sin y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x) dx$. Pentru calcularea integralei I_1 aplicăm rezultatul de la întrebarea de mai sus și avem $I_1 = \int_0^\pi \frac{x \sin x dx}{1 + \sin^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1 + \sin^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{2 - \cos^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x dx}{\cos^2 x - 2} = \pi \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\cos x - \sqrt{2}}{\cos x + \sqrt{2}} \right| \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$.

500 Deoarece $f(0) = -1$, rezultă că $g(-1) = 0$ și, deci, $g'(-1) = \frac{1}{f'(0)}$. Prin schimbarea de variabilă $x = f(y)$, se obține $\int_{-1}^{1-1/e} g(x) dx = \int_0^1 y f'(y) dy = y f(y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(y) dy$.

501 Fie $I_n = \int_0^1 \sqrt[n]{x^n + (1-x)^n} dx$. Avem că

$$I_n \leq \int_0^{1/2} \sqrt[n]{(1-x)^n + (1-x)^n} dx + \int_{1/2}^1 \sqrt[n]{x^n + x^n} dx = \frac{3}{4} \sqrt[n]{2}.$$

$$I_n \geq \int_0^{1/2} (1-x) dx + \int_{1/2}^1 x dx = \frac{3}{4}.$$

502

$$\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{nx}) dx - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(e^{nx}) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{-nx}) dx \leq \frac{\ln 2}{n}.$$

503 Se folosește substituția $x + e^x = y$ și problema 510.

504 Schimbare de variabilă $x = 3/t$.

505 Schimbare de variabilă $x = (2 - t)/(1 + 2t)$.

506 Se folosește egalitatea $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, $x > 0$.

507 Se folosește periodicitatea funcției de integrat și egalitatea $\int_0^\pi \frac{1}{1+n^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{\sqrt{1+n^2}}$.

508 Mai general, fie $x_n, a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, astfel ca $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_n} = \infty$ și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{a_n} < 1.$$

Să demonstrăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Fie $0 < q < 1$ și $p \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{a_n} < q, \quad n \geq p.$$

Rezultă

$$x_{n+1} < x_p q^{\frac{1}{a_p} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad n \geq p,$$

de unde $x_n \rightarrow 0$.

509 $x = a + b - t$.

$$\begin{aligned} \text{512} \quad \int_0^1 f(nx) dx &= \frac{1}{n} \int_0^n f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{T \lfloor \frac{n}{T} \rfloor + T \{ \frac{n}{T} \}} f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{T \lfloor \frac{n}{T} \rfloor} f(x) dx \\ &+ \frac{1}{n} \int_{T \lfloor \frac{n}{T} \rfloor}^{T \lfloor \frac{n}{T} \rfloor + T \{ \frac{n}{T} \}} f(x) dx = \frac{\lfloor \frac{n}{T} \rfloor}{n} \int_0^T f(x) dx + \frac{1}{n} \int_0^{T \{ \frac{n}{T} \}} f(x) dx \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx + 0. \end{aligned}$$

531 Panta dreptei AB este $m_{AB} = 1$ iar panta perpendicularei pe ea, este $m = -1$. Ecuația perpendicularei, scrisă prin punctul C , este: $x + y - 8 = 0$. Ecuația dreptei AB este $x - y + 1 = 0$. Intersectând cele două drepte, obținem proiecția punctului C pe dreapta AB , punctul $P(\frac{7}{2}, \frac{15}{4})$. Urmează că simetricul punctului C față de dreapta AB este $C'(1, 7)$.

532 Suma $DM + MC$ este minimă dacă punctul M este la intersecția dreptelor DC' și AB . Ecuația dreptei DC' este $x = 1$, prin urmare, rezultă $M(1, 2)$.

533 Fie punctul $M(x, x + 1) \in AB$. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = DM^2 + MC^2$, adică $f(x) = (x - 1)^2 + (x + 1 - 1)^2 + (6 - x)^2 + (2 - x - 1)^2$, sau $f(x) = 4 \cdot x^2 - 16 \cdot x + 38$. Funcția f își atinge minimumul pentru $x = 2$. Obținem $M(2, 3)$.

537 $A(-4, 1) \notin d: 3x - y - 2 = 0$, $d(A, BD) = \frac{3\sqrt{10}}{2} \Rightarrow BD = 3\sqrt{10} \Rightarrow l = 3\sqrt{5} \Rightarrow A = 45$.

538 C este simetricul punctului A față de d , $AC \perp d \Rightarrow AC: x + 3y + 1 = 0$, $AC \cap d = \{M(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\}$, M este mijlocul $[AC] \Rightarrow C(5, -2)$.

547 $\vec{MG} = \frac{\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}}{3} = \vec{0} \Rightarrow M = G$.

548 $\vec{NI} = \frac{a\vec{NA} + b\vec{NB} + c\vec{NC}}{a+b+c} = \vec{0} \Rightarrow N = I$.

549 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0} \implies P = O.$

584 Ecuația se scrie $\sin(x + \frac{\pi}{6}) = 1.$

617 $E = \cos 4\alpha + i \sin 4\alpha, \quad \sin 4\alpha = 0 \implies 4\alpha = k\pi.$

620 Se folosește reprezentarea geometrică a numerelor complexe.

626 $\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 1, \dots, n$ sunt rădăcinile complexe ale ecuației $z^n - 1 = 0$; se folosesc relațiile lui Viète.

627 $\sqrt{3} - i = 2(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}); -1 + i\sqrt{3} = 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}).$

633 Se rezolvă ecuația $f(x) = 8.$

635 $1 + a + a^2 = 0, 1 + a = -a^2$ și analog $1 + \bar{a} = -\bar{a}^2.$

636 Determinantul sistemului este diferit de zero.

637 Se pune condiția ca determinantul sistemului și determinantul caracteristic al sistemului să fie egale cu zero.

638 $(x * y) * z = x * (y * z) \iff (a^2 - a)(x - z) = 0, \forall x, y, z \in \mathbb{R}.$

639 $x * y \in [0, 1], \forall x, y \in [0, 1] \iff 0 * 0 \in [0, 1], 0 * 1 \in [0, 1], 1 * 1 \in [0, 1],$ de unde $0 \leq a \leq 1$ și $0 \leq 2a - 1 \leq 1.$

640 Avem două legi asociative, pentru $a \in \{0, 1\}$:
 $a = 0, x * y = -xy, e = -1, x' = -1/x,$ deci $b = 0$;
 $a = 1, x * y = x + y - xy, e = 0, x' = x/(x - 1),$ deci $b = 1.$

642 Avem $\det(X) = 0,$ deci $X^2 = (\text{tr}(X))X.$

643 $P(1) = 0$ și $P'(1) = 0.$

645 $\int_0^{2\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx = 0.$

646 $\int_{-1}^1 \frac{2x + 2}{x^2 + 1} dx = \int_{-1}^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx + 2 \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx.$

647 $I_n = \int_0^1 \arctg x \cdot \cos(nx) dx = \int_0^1 \arctg x \cdot \left(\frac{\sin(nx)}{n}\right)' dx$ apoi se integrează prin părți.

648 Se studiază derivabilitatea în -2 și $2.$

649 -2 și 2 sunt puncte de întoarcere, iar 0 este punct de maxim local.

650 Asimptotele sunt $y = x$ și $y = -x.$

653 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$

654 $\left(\frac{(3+n)!}{n!n^3}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n \rightarrow e^1 e^2 e^3 = e^6.$

655 Folosim $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1$. Avem:

$$\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x = \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{e^{x \ln(1+x)} - 1}{x \ln(1+x)} \right)^x x^x \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^x x^x = 1.$$

660 $f(x) = -\cos^2 x + 4 \cos x + 1 = 5 - (2 - \cos x)^2$, $\cos x \in [-1, 1]$.

661 $\max f(x) = 4$, $\min f(x) = -4$, deci $m \in [-4, 4]$.