




**UNIVERSITATEA
TEHNICA
CLUJ-NAPOCA**



**TESTE GRILĂ
DE
MATEMATICĂ**

ADMITERE 2023

UTPRESS

Cluj-Napoca, 2023

ISBN 978-606-737-624-1

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2023

A U T O R I

Prof.univ.dr. Vasile Câmpian	Conf.univ.dr. Dalia Cîmpean
Prof.univ.dr. Iuliu Crivei	Conf.univ.dr. Eugenia Duca
Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea	Conf.univ.dr. Ovidiu Furdui
Prof.univ.dr. Ioan Gavrea	Conf.univ.dr. Adrian Holhoș
Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan	Conf.univ.dr. Daniela Inoan
Prof.univ.dr. Nicolaie Lung	Conf.univ.dr. Adela Carmen Novac
Prof.univ.dr. Vasile Miheșan	Conf.univ.dr. Vasile Pop
Prof.univ.dr. Alexandru Mitrea	Conf.univ.dr. Teodor Potra
Prof.univ.dr. Viorica Mureșan	Conf.univ.dr. Mircea Dan Rus
Prof.univ.dr. Ioan Radu Peter	Conf.univ.dr. Silvia Toader
Prof.univ.dr. Dorian Popa	Conf.univ.dr. Constantin Cosmin Todea
Prof.univ.dr. Ioan Rașă	Lect.univ.dr. Alina-Ramona Baias
Prof.univ.dr. Daniela Roșca	Lect.univ.dr. Mihaela Bercheșan
Prof.univ.dr. Alina Sîntămărian	Lect.univ.dr. Luminița Ioana Cotîrlă
Prof.univ.dr. Gheorghe Toader	Lect.univ.dr. Daria Dumitraș
Prof.univ.dr. Neculae Vornicescu	Lect.univ.dr. Mircia Gurzău
Conf.univ.dr. Marius Birou	Lect.univ.dr. Vasile Ile
Conf.univ.dr. Lucia Blaga	Lect.univ.dr. Tania Angelica Lazăr
Conf.univ.dr. Adela Capătă	Lect.univ.dr. Daniela Marian
Conf.univ.dr. Maria Câmpian	Lect.univ.dr. Rozica Moga
Conf.univ.dr. Alexandra Ciupa	Lect.univ.dr. Floare Ileana Tomuța
	Asist.univ.dr. Liana Timboș



Editura UTPRESS
Str. Observatorului nr. 34
400775 Cluj-Napoca
Tel.: 0264-401.999
e-mail: utpress@biblio.utcluj.ro
www.utcluj.ro/editura

Director: ing. Dan COLȚEA

Coordonator Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan

Referenți:
Conf.univ.dr. Ovidiu Furdui
Prof.univ.dr. Ioan Gavrea
Prof.univ.dr. Alexandru Mitrea
Conf.univ.dr. Vasile Pop
Prof.univ.dr. Dorian Popa
Conf.univ.dr. Mircea Dan Rus
Prof.univ.dr. Neculae Vornicescu

Pregătire format electronic on-line: Gabriela Groza

Copyright © 2023 Editura UTPRESS

Reproducerea integrală sau parțială a textului sau ilustrațiilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al editurii UTPRESS.

ISBN 978-606-737-624-1

Prefață

Culegerea de probleme *Teste grilă de matematică* continuă tradiția Universității Tehnice din Cluj-Napoca de a selecta viitorii studenți printr-un concurs de admitere pe baza subiectelor sub formă de grilă. Prezenta culegere a fost elaborată cu scopul de a contribui la o mai bună pregătire a candidaților la admitere și de a-i familiariza cu noua tipologie a subiectelor.

Structurată pe patru capitole: Algebră, Analiză matematică, Geometrie analitică și Trigonometrie, culegerea contribuie la recapitularea materiei din Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2023.

Parcurgând toate gradele de dificultate, de la probleme foarte simple care necesită un minim de cunoștințe, până la probleme a căror rezolvare presupune cunoștințe temeinice, lucrarea este utilă tuturor categoriilor de elevi care se pregătesc pentru un examen de matematică.

Fiecare problemă propusă este urmată de cinci răspunsuri dintre care numai unul este corect. La sfârșit se dau răspunsurile corecte.

Testele care se vor da la simularea de admitere și la concursul de admitere vor conține probleme cu grade diferite de dificultate, alcătuite după modelul celor din culegere.

Autorii

* * *

1	Algebră	1
2	Analiză matematică	33
3	Geometrie analitică	71
4	Trigonometrie	77
5	Exemplu Test Admitere	87
6	Simulare admitere 13 mai 2017	93
7	Admitere 16 iulie 2017	99
8	Simulare admitere 12 mai 2018	105
9	Admitere 16 iulie 2018	111
10	Simulare admitere 18 mai 2019	117
11	Admitere 24 iulie 2019	121
12	Simulare admitere 8 mai 2021	127
13	Admitere 22 iulie 2021	133
14	Simulare admitere 7 mai 2022	139
15	Admitere 15 iulie 2022	145
16	Răspunsuri	155
17	Indicații	161

* * *

1

Mulțimea soluțiilor ecuației $z^2 = 3 - 4i$, $z \in \mathbb{C}$, este:

- A** $\{1, 2\}$ **B** $\{i, 2 - i\}$ **C** $\{2 - i, -2 + i\}$ **D** $\{3, -2 + i\}$ **E** $\{2 - i, 3 + i\}$

2

Soluția ecuației $x(1 - \lg 5) = \lg(2^x + x - 1)$ este:

- A** $x = \frac{1}{5}$ **B** $x = -1$ **C** $x = 1$ **D** $x = \frac{1}{2}$ **E** $x = -5$

3

Mulțimea soluțiilor reale ale sistemului $\begin{cases} 2(x - 1) \geq 4(x + 1) \\ x^2 + 4x > 0 \end{cases}$ este:

- A** $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ **B** $(-\infty, -4) \cup (2, \infty)$ **C** $(-\infty, -4)$ **D** $(2, \infty)$ **E** $(-1, 1)$

4

Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (m + 1)x^2 + 2(m + 2)x + m + 3$, intersectează axa Ox în două puncte distincte este:

- A** \mathbb{R} **B** \emptyset **C** $\{-3\}$ **D** $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ **E** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Fie $f \in \mathbb{R}[X]$, $f = X^{100} + aX^{99} + bX + 1$.

- 5 Valorele coeficienților a și b pentru care $x = 1$ este rădăcină dublă sunt:
A $a = -1; b = -1$ **B** $a = 2; b = -4$ **C** $a = -2; b = 0$ **D** $a = 0; b = -2$
E $a = 4; b = -2$
- 6 Valorele coeficienților a și b pentru care f se divide cu $X^2 + X + 1$ sunt:
A $a = 1; b = 1$ **B** $a = -1; b = -1$ **C** $a = -1; b = 0$ **D** $a = 1; b = -1$
E $a = 0; b = -1$
- 7 Valorele coeficienților a și b pentru care restul împărțirii polinomului f la $X^3 - X^2 - X + 1$ este $X^2 + X + 1$ sunt:
A $a = 2; b = -1$ **B** $a = 0; b = 1$ **C** $a = -1; b = 2$ **D** $a = -1; b = 1$ **E** $a = 1; b = 0$

Se dă funcția $f(x) = mx^2 + 2(m+1)x + m^2 - 1$, unde $m \neq 0$ este parametru real.

- 8 Pentru ce valori ale lui m , $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$?
A $m \in (0, +\infty)$ **B** $m \in (1 + \sqrt{2}, +\infty)$ **C** $m \in (0, 1 + \sqrt{2})$ **D** $m \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$
E $m \in (-1, 1 - \sqrt{2}) \cup (1 + \sqrt{2}, +\infty)$
- 9 Pentru ce valori ale lui m , $f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$?
A $m \in (-\infty, 0)$ **B** $m \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ **C** $m \in (-1, 1 - \sqrt{2})$
D $m \in (-\infty, 1 - \sqrt{2})$ **E** $m \in (-1, 1 - \sqrt{2}) \cup (0, \infty)$
- 10 Pentru ce valori ale lui m funcția admite rădăcină dublă?
A $m \in \{\pm 1\}$ **B** $m \in \{1, \pm\sqrt{2}\}$ **C** $m \in \{\pm\sqrt{2}\}$ **D** $m \in \{-1, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
E $m \in \{0, 1, \pm\sqrt{2}\}$

Se consideră ecuația $2x^2 - 2mx + m^2 - 2m = 0$, unde $m \in \mathbb{R}$, iar x_1 și x_2 sunt rădăcinile reale ale ecuației.

- 11 Suma rădăcinilor $x_1 + x_2$ aparține intervalului
A $[0, 1]$ **B** $[0, 4]$ **C** \mathbb{R} **D** $[0, 2]$ **E** $[-1, 4]$
- 12 Suma pătratelor rădăcinilor $x_1^2 + x_2^2$ aparține intervalului
A $[0, 4]$ **B** $[-2, 4]$ **C** $[0, 8]$ **D** \mathbb{R} **E** $[0, 3]$
- 13 Produsul rădăcinilor x_1x_2 aparține intervalului
A $[-2, 0]$ **B** $[0, 4]$ **C** $[-\frac{1}{2}, 4]$ **D** \mathbb{R} **E** $(0, 2)$

Fie funcțiile $f_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = mx^2 + 2(m-1)x + m - 1$, $m \in \mathbb{R}$.

- 14 Mulțimea valorilor parametrului m pentru care ecuația $f_m(x) = 0$ are cel puțin o rădăcină reală este:

A $(-\infty, 1)$ **B** $(-\infty, 1]$ **C** \mathbb{R} **D** alt răspuns **E** $[0, \infty)$

- 15 Vârfurile parabolilor asociate funcțiilor f_m , $m \neq 0$, se găsesc pe:

A parabola $y = x^2 + 2$ **B** dreapta $x + 2y = 0$ **C** dreapta $y = x$
D dreapta $y = -x$ **E** o paralelă la Ox

Fie funcția $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $g(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{dacă } x \leq 0 \\ 3x + 2, & \text{dacă } x > 0. \end{cases}$

- 16 Soluția inecuației $g(x) \geq 0$ este:

A $[-2, \infty)$ **B** $[-2, 0]$ **C** $[-\frac{2}{3}, \infty)$ **D** $[-2, -\frac{2}{3}]$ **E** $[0, \infty)$

- 17 Funcția $g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este dată de:

A $g^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{3}, & \text{dacă } x \geq 2 \\ \frac{x-2}{4}, & \text{dacă } x < 2 \end{cases}$ **B** $g^{-1}(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x-2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$
C $g^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{3}, & \text{dacă } x \leq 2 \\ 2x - 3, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$ **D** $g^{-1}(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x+2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$
E $g^{-1}(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{dacă } x \leq 2 \\ \frac{x+2}{3}, & \text{dacă } x > 2 \end{cases}$

18

Se dau funcțiile $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin

$$f(x) = \begin{cases} 5x + 1, & x < 0 \\ 1 - x^2, & x \geq 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq -2 \\ 2x - 1, & x > -2 \end{cases}.$$

Funcția $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h = f \circ g$ este definită prin:

A $h(x) = \begin{cases} 1 - x^4, & x \leq -2 \\ 4x(1 - x), & x > -2 \end{cases}$ **B** $h(x) = \begin{cases} 1 - x^4, & x \leq -2 \\ 4x(1 - x), & x \geq \frac{1}{2} \\ 2(5x - 2), & -2 < x < \frac{1}{2} \end{cases}$
C $h(x) = \begin{cases} 4x(1 - x), & x \leq \frac{1}{2} \\ 2(5x - 2), & x > \frac{1}{2} \end{cases}$ **D** $h(x) = \begin{cases} 1 - x^4, & x < -2 \\ 2(5x - 2), & x > \frac{1}{2} \\ 4x(1 - x), & -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$
E $h(x) = \begin{cases} 2(5x - 2), & x \geq -2 \\ 1 - x^4, & x < -2 \end{cases}$

19

Fie $P \in \mathbb{R}[X]$, $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, un polinom cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 distincte două câte două. Pentru $Q \in \mathbb{R}[X]$ polinom de grad 1,

suma $\frac{Q(x_1)}{P'(x_1)} + \frac{Q(x_2)}{P'(x_2)} + \frac{Q(x_3)}{P'(x_3)}$ este egală cu

A $x_1 + x_2 + x_3$ **B** $x_1x_2x_3$ **C** $P(x_1 + x_2 + x_3)$ **D** 1 **E** 0

20

Fie $P, Q, R: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ funcții polinomiale de grad cel mult doi și $a, b, c \in \mathbb{C}$ astfel ca

$$\begin{vmatrix} P(a) & Q(a) & R(a) \\ P(b) & Q(b) & R(b) \\ P(c) & Q(c) & R(c) \end{vmatrix} = 1.$$

Suma $\begin{vmatrix} P(1) & Q(1) & R(1) \\ P(b) & Q(b) & R(b) \\ P(c) & Q(c) & R(c) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} P(a) & Q(a) & R(a) \\ P(1) & Q(1) & R(1) \\ P(c) & Q(c) & R(c) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} P(a) & Q(a) & R(a) \\ P(b) & Q(b) & R(b) \\ P(1) & Q(1) & R(1) \end{vmatrix}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 3 **D** $P(0) + Q(0) + R(0)$ **E** $P(1)Q(1)R(1)$

21

Să se găsească numărul complex z dacă $|z| - z = 1 + 2i$.

- A** $z = \frac{3}{2} - 2i$ **B** $z = \frac{3}{2} + 2i$ **C** $z = \frac{1}{2} - 3i$ **D** $z = \frac{1}{2} + 3i$ **E** $z = -\frac{1}{2} + 3i$

Fie $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^2 + z - \bar{z}$.

22

Soluțiile ecuației $f(z) = 0$ sunt:

- A** $\{0, 1 + 2i, 1 - 2i\}$ **B** $\{0, 1 + i, 1 - i\}$ **C** $\{0, i, -i\}$ **D** $\{0, 2 + i, 2 - i\}$
E $\{0, -1 + i, -1 - i\}$

23

Se consideră ecuația $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2(3^{x-1} + 1)$. Mulțimea soluțiilor ecuației are:

- A** un element **B** două elemente **C** nici un element **D** trei elemente
E o infinitate de elemente

24

Să se rezolve în \mathbb{R} ecuația $\log_{1+x}(2x^3 + 2x^2 - 3x + 1) = 3$.

- A** $x = 0$ **B** $x = -2$ **C** $x = 3$ **D** $x = \frac{1}{2}$ **E** $x = \frac{1}{3}$

25

Ecuația $\frac{2 \lg x}{\lg(5x - 4)} = 1$ are ca mulțime a soluțiilor pe:

- A** $\{1, 4\}$ **B** $\{4\}$ **C** $\{10\}$ **D** \emptyset **E** $\mathbb{R} \setminus \{0, \frac{4}{5}\}$

26

Se consideră mulțimea tripletelor de numere reale (a, b, c) care verifică relația $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Atunci $\min(ab + bc + ac)$ pentru această mulțime este:

- A** -1 **B** $-\frac{3}{4}$ **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $-\frac{1}{3}$ **E** nu există minim

Fie $A_1 = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid x = \frac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$ și $A_2 = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid x = \frac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$.

27) Mulțimea A_1 este:

- A** $A_1 = \{1, 2, 3\}$ **B** $A_1 = \mathbb{N}$ **C** $A_1 = \{-2, 1, 4\}$ **D** $A_1 = \{1, 3, 5\}$
E $A_1 = \emptyset$

28) Mulțimea A_2 este:

- A** $A_2 = \{-1, 1, 3, 5\}$ **B** $A_2 = \{3, 5\}$ **C** $A_2 = \{3\}$ **D** $A_2 = \emptyset$ **E** $A_2 = \{-1\}$

29) Mulțimea soluțiilor inecuației $\log_{\frac{1}{3}}(\log_3 x) \geq 1$ este:

- A** $[3, \infty)$ **B** $(0, \sqrt[3]{9})$ **C** $(1, \sqrt[3]{3}]$ **D** $(\frac{1}{3}, 1]$ **E** $(0, 1) \cup (\sqrt[3]{3}, +\infty)$

Restul împărțirii polinomului X^{10}

30) la $X + 1$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** 1 **D** 9 **E** alt răspuns

31) la $(X + 1)^2$ este:

- A** -10 **B** $-10X$ **C** $10X + 9$ **D** $-10X - 9$ **E** $X - 9$

32) la $(X + 1)^3$ este:

- A** $-9X^2 + 22$ **B** $45X^2 + 80X + 36$ **C** $X + 2$ **D** 1 **E** 0

33) Mulțimea soluțiilor ecuației $2A_n^{n-3}x^2 + 4A_n^{n-2}x + 3P_n = 0$, $n \geq 3$, este:

- A** $\{n, \frac{n}{2}\}$ **B** $\{1, A_n^2\}$ **C** $\{-3\}$ **D** $\{A_n^3\}$ **E** \emptyset .

34) Să se determine primul termen a_1 și rația q a unei progresii geometrice $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ dacă:

$$\begin{cases} a_4 - a_2 = 6, \\ a_3 - a_1 = 3. \end{cases}$$

- A** $a_1 = -1; q = 3$ **B** $a_1 = 3; q = \frac{1}{2}$ **C** $a_1 = 2; q = -2$
D $a_1 = 1; q = 2$ **E** $a_1 = 1; q = 3$.

35) Care sunt valorile coeficienților reali a și b din ecuația

$$x^3 - ax^2 + bx + 1 = 0,$$

dacă acești coeficienți sunt rădăcini ale ecuației?

- A** $a = 1, b = 0$ **B** $a = 1, b \in \mathbb{R}$ **C** $a = 1, b = -1$ **D** $a \in \mathbb{R}, b = -1$ **E** $a \in \mathbb{R}, b = 1$

36

Coeficientul lui x^{99} din dezvoltarea polinomului

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-99)(x-100)$$

este:

- A** -4950 **B** -5050 **C** 99 **D** -100 **E** 3450

37

Cel mai mare divizor comun al polinoamelor $(x+1)^{4n+3} + x^{2n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ și $x^3 - 1$ este:

- A** $x^3 - 1$ **B** $x - 1$ **C** $x^2 + x + 1$ **D** sunt prime între ele **E** $(x+1)^{4n+3} + x^{2n}$

38

Valoarea expresiei $(1-\alpha)(1-\alpha^2)(1-\alpha^4)(1-\alpha^5)$, unde $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\alpha^3 = 1$, este:

- A** -1 **B** 9 **C** 0 **D** $9i$ **E** $3i$

39

Fie numerele reale $a, b, c, d \in (0, 1) \cup (1, \infty)$. Dacă $\log_a b \log_b c \log_c d = 1$ atunci:

- A** $a = b \in (0, 1)$ și $c = d \in (1, \infty)$ **B** $a = b \in (1, \infty)$ și $c = d \in (0, 1)$
C $a = c \in (0, 1)$ și $b = d \in (1, \infty)$ **D** $a = d$ **E** $a = c \in (1, \infty)$ și $b = d \in (0, 1)$

40

Suma $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$ este:

- A** $n(n+1)$ **B** $n \cdot n!$ **C** $(n+1)! - 1$ **D** $n!$ **E** $2n \cdot n!$

Se consideră matricea $U(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{pmatrix}$.

41

Matricea $U(a, b)$ este singulară dacă și numai dacă

- A** $a = b$ **B** $a \neq -3b$ **C** $(a-b)(3b+a) = 0$ **D** $a + 3b = 0$ **E** alt răspuns

42

$U^{11}(1, 1)$ este

- A** $U(1, 1)$ **B** $4^{100}U(1, 1)$ **C** $2^{22}U(1, 1)$ **D** $2^{20}U(1, 1)$ **E** $4^8U(1, 1)$

43

Inversa matricei $U(1, 2)$ este:

- A** $U(1, 2)$ **B** $U(1, 2) - U(1, 1)$ **C** $\frac{U(1, 2) - 6I_4}{7}$ **D** nu există **E** alt răspuns

44

Dacă $a^2 + b^2 = 1$, atunci inversa matricii $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ este:

- A** $\begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix}$ **B** $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ **C** $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ **D** $\begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{1}{b} \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$
E $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$

45

Inversa matricii $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ este matricea:

- A** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **B** $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ **C** $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ **D** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
E $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$

46

Matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & a & 3 \end{pmatrix}$ are rangul minim pentru:

- A** $a = 0$ **B** $a = 1$ **C** $a = 7$ **D** $a = 21$ **E** $a = -21$

Se consideră matricea: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$.

47

Determinantul matricii A este:

- A** $16i$ **B** $-16i$ **C** 16 **D** -16 **E** 0

48

A^4 este:

- A** I_4 **B** $2I_4$ **C** $4I_4$ **D** $16I_4$ **E** $256I_4$

49

Numărul soluțiilor $n \in \mathbb{Z}$ ale ecuației $16A^{8n} + 16I_4 = 257A^{4n}$ este:

- A** 16 **B** 8 **C** 4 **D** 2 **E** 1

Se dă matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

50

det A este:

- A** 1 **B** 0 **C** -1 **D** 2 **E** ∞

51

Numărul de soluții în $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ale ecuației $X^2 = A$ este:

- A** 10 **B** 1 **C** 2 **D** 0 **E** ∞

52

Sistemul de ecuații cu parametrul real m , $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 6x - 8y = 1 \\ 5x + 2y = m \end{cases}$, este compatibil numai dacă:

- A** $m = 0$ **B** $m = 1$ **C** $m = 2$ **D** $m = 3$ **E** $m = 4$

53

Sistemul de ecuații cu parametrii $m, n \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} mx + y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ (2m - 1)x + 2y + z = n \end{cases}$$

este compatibil nedeterminat pentru:

- A** $m = 3; n \neq 3$ **B** $m \neq 3; n = 3$ **C** $m = 3; n = 3$ **D** $m \neq 3; n \neq 3$
E $m = 5; n = 3$

54

Dacă $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n & 44 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}$, atunci:

- A** $n = 1$ **B** $n = 2$ **C** $n = 4$ **D** $n = 8$ **E** $n = 16$

55

Fie $m, n \in \mathbb{R}$, x_1, x_2, x_3 rădăcinile ecuației $x^3 + mx + n = 0$ și matricea

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix}$. Determinantul matricei A^2 este:

- A** $-4m^3 - 27n^2$ **B** $4m^3 - 27n^2$ **C** $-4m^3 + 27n^2$ **D** $-2n^3 - 27m^2$ **E** $-3n^3 - 27m^2$

56

Dacă $a < b < c$ și $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+2 & b+2 & c+2 \\ (a+1)^2 & (b+1)^2 & (c+1)^2 \end{vmatrix}$, atunci:

- A** $D = 0$ **B** $D \leq 0$ **C** $D < 0$ **D** $D > 0$ **E** $D = -a^2 - b^2 - c^2$

57

Mulțimea valorilor $a \in \mathbb{R}$ pentru care rangul matricei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ -2 & -1 & -5 & -4 \\ 2 & 0 & 4 & a \end{pmatrix}$$

este egal cu 2, este

- A** \emptyset **B** $\{0\}$ **C** $\{2\}$ **D** $\{-2, 2\}$ **E** $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

Se consideră sistemul

$$(S) : \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + az = -3 \\ 3x + y + 4z = b \end{cases} .$$

58

(S) este compatibil determinat dacă și numai dacă

- A** $a = 0$ **B** $a \neq 1, b \in \mathbb{R}$ **C** $a = 1, b = -2$

59

(S) este compatibil nederminat dacă

- A** $a = 1, b = -2$ **B** $a = 1, b = 2$ **C** $a \neq 1, b \in \mathbb{R}$ **D** $a = 2, b = 1$

60

(S) este incompatibil dacă și numai dacă

- A** $a = 1, b = 2$ **B** $a \neq 2, b = 1$ **C** $a \neq 1, b \neq -2$ **D** $a \neq 0, b = 2$ **E** $a = 1, b \neq -2$

61

Numărul valorilor parametrului real m pentru care sistemul

$$\begin{cases} 2x + 2y + mxy = 5 \\ (m-1)(x+y) + xy = 1 \\ 3x + 3y - xy = m+1 \end{cases} , \text{ are soluții } (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \text{ este:}$$

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

62

Dacă sistemul de ecuații $\begin{cases} 2x + ay + 4z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ 3x - 2y - z = 0 \end{cases} , a \in \mathbb{R}$

este compatibil determinat, atunci:

- A** $a = 1$ **B** $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ **C** $a \in \mathbb{R}^*$ **D** $a \in (0, \infty)$ **E** $a \in (1, \infty)$

63

Dacă $A = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} , t \in \mathbb{R}$, atunci:

- A** $A^n = \begin{pmatrix} \cos^n t & -\sin^n t \\ \sin^n t & \cos^n t \end{pmatrix}$ **B** $A^n = \begin{pmatrix} \cos t^n & -\sin t^n \\ \sin t^n & \cos t^n \end{pmatrix}$
C $A^n = \begin{pmatrix} \cos nt & -\sin nt \\ \sin nt & \cos nt \end{pmatrix}$ **D** $A^n = \begin{pmatrix} \sin nt & -\cos nt \\ \cos nt & \sin nt \end{pmatrix}$
E $A^n = \begin{pmatrix} \cos^n t - \sin^n t & -n \sin t \cos t \\ n \sin t \cos t & \cos^n t - \sin^n t \end{pmatrix}$

64

Dacă $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, atunci A^{12} este:

- A** $\begin{pmatrix} 3^6 & 1 \\ 1 & 3^6 \end{pmatrix}$ **B** $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ **C** $\begin{pmatrix} 12\sqrt{3} & -12 \\ 12 & 12\sqrt{3} \end{pmatrix}$ **D** $2^{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
E $\begin{pmatrix} (\sqrt{3})^{12} & (-1)^{12} \\ 1 & (\sqrt{3})^{12} \end{pmatrix}$

65

Mulțimea soluțiilor ecuației $\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & 2x & 3 \\ -1 & -2 & x \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} x & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 3 = 0$ este:

- A** $\{-1\}$ **B** $\{-1, 1, -i, i\}$ **C** $\{-1, 0, 1 - i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}\}$ **D** $\{-1, \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \frac{1+i\sqrt{3}}{2}\}$
E $\{-1, \frac{1-i}{2}, \frac{1+i}{2}\}$

Se dă mulțimea $M = [5, 7]$ și operația $*$ definită prin $x * y = xy - 6x - 6y + \alpha$.

66

Valoarea parametrului real α pentru care mulțimea M este parte stabilă în raport cu operația $*$ este:

- A** $\alpha = 42$ **B** $\alpha = 36$ **C** $\alpha = -36$ **D** $\alpha = 6$ **E** $\alpha = -6$

67

În monoidul $(M, *)$, elementul neutru este:

- A** $e = 7$ **B** $e = 6$ **C** $e = 5$ **D** $e = 1$ **E** nu există

68

În monoidul $(M, *)$, mulțimea elementelor simetrizabile este:

- A** $[5, 7] \setminus \{6\}$ **B** $\{6\}$ **C** $\{5, 7\}$ **D** $[5, 7]$ **E** $\mathbb{R} \setminus \{6\}$

Definim pe $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ legea de compoziție $(x, y) * (a, b) = (xa, xb + ya)$.

69

Elementul neutru al legii $*$ este:

- A** $(0, 1)$ **B** $(1, 0)$ **C** $(0, 0)$ **D** $(1, 1)$ **E** $(-1, 1)$

70

Numărul elementelor simetrizabile (x, y) având proprietatea $x^2 + y^2 + x + y = 8$, este:

- A** 4 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 0

71

Fie legea de compoziție $*$ definită prin $x * y = \frac{x-y}{1-xy}$, $\forall x, y \in (-1, 1)$. Elementul neutru pentru această lege este:

- A** $e = 0$ **B** nu există **C** $e = 1$ **D** $e = -1$ **E** $\frac{1}{2}$

72

Pe mulțimea \mathbb{Z} a numerelor întregi se definește legea $*$ prin $x * y = x + y - 2, \forall x, y \in \mathbb{Z}$. Să se determine simetricul x' al lui x .

- A** x' nu există **B** $x' = 1 - x$ **C** $x' = 4 - x$ **D** $x' = \frac{1}{x}$ **E** $x' = -x$

Pe mulțimea \mathbb{C} a numerelor complexe definim legea de compoziție $*$ prin $z_1 * z_2 = z_1 + z_2 - z_1 z_2$.

73

Numărul $2 * i$ este:

- A** $2 - i$ **B** $2i$ **C** $2 + i$

74

Elementul neutru față de $*$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** i **D** -1

75

Elementul simetric al lui i față de $*$ este:

- A** $-i$ **B** $1 - i$ **C** $\frac{1-i}{2}$ **D** $\frac{1+i}{2}$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - (m - 1)x + 3m - 4, m \in \mathbb{R}$.

76

Mulțimea valorilor lui m pentru care f se anulează în $(0, 1)$ și $f(x) \geq 0, \forall x \in (0, 1)$ este:

- A** $(-\infty, 7 - 4\sqrt{2})$ **B** $(7 + 4\sqrt{2}, \infty)$ **C** $\{7 - 4\sqrt{2}, 7 + 4\sqrt{2}\}$ **D** $\{7 - 4\sqrt{2}\}$ **E** \emptyset

77

Mulțimea valorilor lui m pentru care $f(x) < 0, \forall x \in (0, 1)$ este

- A** $(0, 1)$ **B** $(2, \infty)$ **C** $(-\infty, 1]$ **D** \emptyset **E** $(0, \infty)$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - mx + 2, m \in \mathbb{R}$.

78

Mulțimea valorilor lui m pentru care f este strict crescătoare pe intervalul $[-1, 1]$ este

- A** $[-2, 2]$ **B** $(-\infty, -2)$ **C** $(-\infty, -2]$ **D** \mathbb{R} **E** Alt răspuns

79

Mulțimea valorilor lui m pentru care f este injectivă pe $[-1, 1]$ este:

- A** \mathbb{R} **B** $(-1, 1)$ **C** $(-\infty, -2] \cup (2, \infty)$ **D** $(-2, 2)$ **E** Alt răspuns

80

Familia de parabole asociate funcțiilor

$$f_m(x) = (m + 1)x^2 - 3mx + 2m - 1, \quad m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\},$$

- A** are un punct fix pe axa Oy **B** are un punct fix situat pe prima bisectoare
C are două puncte fixe **D** are trei puncte fixe **E** nu are puncte fixe

Fie parabolele de ecuații: $P_1 : y = x^2 + 5x + 4$
și $P_2 : y = (m - 1)x^2 + (4m + n - 4)x + 5m + 2n - 4$, unde $m, n \in \mathbb{R}$, $m \neq 1$.

81 Parabolele se intersectează în $A(-2, -2)$ și $B(0, 4)$ dacă:

- A** $m = -2, n = 9$ **B** $m = 2, n = -9$ **C** $m = 5, n = 4$ **D** $m = \frac{1}{2}, n = 3$
E $m = \frac{1}{3}, n = -2$

82 Parabolele au singurul punct comun $C(1, 10)$ dar nu sunt tangente dacă:

- A** $m = -\frac{2}{3}, n = \frac{1}{3}$ **B** $m = 2, n = -\frac{1}{3}$ **C** $m = -\frac{1}{3}, n = 3$ **D** $m = -2, n = \frac{1}{2}$
E $m = n = 2$

83 Parabolele sunt tangente în punctul $T(-2, -2)$ dacă:

- A** $m = 0, n = -3$ **B** $m = 2, n = -1$ **C** $m = -2, n = -1$ **D** $m = -2, n = 1$
E $m = \frac{1}{2}, n = -4$

84

Fie $E(x) = \frac{x^2 - 2(m - 1)x + m + 1}{mx^2 - mx + 1}$. Mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care E este bine definită oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, este:

- A** \mathbb{R} **B** $\{4\}$ **C** $\{-1\}$ **D** $(0, 4)$ **E** alt răspuns

85

Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care

$$(m - 1)x^2 + (m - 1)x + m - 3 < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

este:

- A** \emptyset **B** $(-\infty, 1) \cup (\frac{11}{3}, \infty)$ **C** $(-\infty, 0)$ **D** $(-\infty, 1)$ **E** alt răspuns

86

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}^*$, pentru care parabolele asociate funcțiilor $f_a(x) = ax^2 - (a + 2)x - 1$ și $g_a(x) = x^2 - x - a$ sunt tangente, este:

- A** $\{-1, 2\}$ **B** $\{3, -1\}$ **C** $\{3\}$ **D** $\{\frac{1}{3}, 3\}$ **E** \emptyset

87

Ecuația $x^4 + (2m - 1)x^2 + 2m + 2 = 0$, cu necunoscuta x și parametrul real m , are toate rădăcinile reale dacă:

- A** $m = 0$ **B** $1 \leq m \leq 2$ **C** $-1 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ **D** $m \in \emptyset$ **E** $m > \frac{1}{2}$

88

Se dă ecuația $x^3 - 3x^2 + 2x - a = 0$. Rădăcinile ei sunt în progresie aritmetică dacă și numai dacă

- A** $a = 0$ **B** $a \in \{0, 1\}$ **C** $a \in \{-1, 1\}$ **D** $a = 2$ **E** $a = 3$

Fie x_1, x_2, x_3 rădăcinile ecuației $x^3 - 2x + 3 = 0$. Notăm $S_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k$, $k \in \mathbb{Z}$.

89

S_{-1} este:

- A** 0 **B** $\frac{2}{3}$ **C** $-\frac{2}{3}$ **D** 1 **E** -1

90

S_{-2} este:

- A** $\frac{4}{9}$ **B** $-\frac{4}{9}$ **C** $\frac{2}{3}$ **D** $-\frac{3}{2}$ **E** 0

91

S_4 este:

- A** 4 **B** $\frac{4}{9}$ **C** -4 **D** 8 **E** -8

92

Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifică egalitățile:

$$P(0) + \dots + P(n) = n^5, \quad n = 0, 1, \dots,$$

atunci $P(0)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** alt răspuns

93

Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface egalitățile:

$$P(n) = \sum_{k=1}^n k^{10}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

atunci $P(-2)$ este:

- A** 0 **B** -1 **C** 1023 **D** -1025 **E** alt răspuns

Se dă ecuația $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, $r \neq 0$.

94

Ecuația admite două rădăcini opuse dacă:

- A** $p + q = r$ **B** $r^2 - pq = 0$ **C** $rp - q = 1$ **D** $q^2 - rp = 0$ **E** $pq - r = 0$

95

Rădăcinile sunt în progresie geometrică dacă:

- A** $p^2r - q = 0$ **B** $p^3 - rq = 0$ **C** $q^2 - rp = 0$ **D** $q^3 + p + q = 0$ **E** $p^3r - q^3 = 0$

96

Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației

$$\sqrt{x+2-4\sqrt{x-2}} + \sqrt{x+7-6\sqrt{x-2}} = 1$$

este:

- A** $\{5, 12\}$ **B** $\{7, 10\}$ **C** $[2, \infty)$ **D** $[6, 11]$ **E** $\{8, 12\}$

97

Mulțimea soluțiilor reale ale inecuației $\sqrt{x+2} - \sqrt{x+3} < \sqrt{2} - \sqrt{3}$ este:

- A** $(-\infty, 0)$ **B** $[-2, 0)$ **C** $[-2, \infty)$ **D** \emptyset **E** $(0, \infty)$

Se consideră funcția $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x-11}$.

98

Mulțimea de definiție a funcției este:

- A** \mathbb{R} **B** $[0, \infty)$ **C** $(-\infty, 0)$ **D** $[11, \infty)$ **E** $(-\infty, 11)$

99

Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $f(x) = 7$ este:

- A** $\{27\}$ **B** $\{0\}$ **C** $\{11\}$ **D** $\{1\}$ **E** conține cel puțin două elemente

100

Câte soluții întregi are ecuația

$$8(4^x + 4^{-x}) - 54(2^x + 2^{-x}) + 101 = 0?$$

- A** 2 **B** 4 **C** 1 **D** nici una **E** 3

101

Mulțimea valorilor reale ale lui a , pentru care funcția

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + ax + 1,$$

este injectivă, este:

- A** $(-\infty, 0)$ **B** $[0, \infty)$ **C** \emptyset **D** $\{1\}$ **E** \mathbb{R}

102

Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația

$$(m-2)x^2 - (2m+1)x + m - 3 = 0$$

are rădăcinile în $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ cu partea reală negativă este:

- A** $(-\frac{1}{2}, \frac{23}{24})$ **B** $(-\infty, \frac{23}{24})$ **C** $[-\frac{1}{2}, \infty)$ **D** $[\frac{23}{24}, \infty)$ **E** \emptyset

103

Valoarea minimă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$$

unde $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, se obține pentru:

- A** $x = 0$ **B** $x = a_1$ **C** $x = a_2$ **D** $x = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ **E** $x = \frac{a_1 + a_n}{2}$

104

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2mx - 1 & ; x \leq 0 \\ mx - 1 & ; x > 0 \end{cases}$, $m \in \mathbb{R}^*$, este injectivă dacă:

- A** $m \in (-\infty, 1)$ **B** $m \in (1, \infty)$ **C** $m \in (-\infty, 0)$ **D** $m \in (0, \infty)$ **E** $m \in (-1, 1)$

105

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x + m, & x \leq 1 \\ 2mx - 1, & x > 1 \end{cases}$. Funcția f este surjectivă dacă și numai dacă:

- A** $m \in (0, 1)$; **B** $m \in (-\infty, 2]$; **C** $m = 2$; **D** $m \in (0, 2]$; **E** $m \in (-\infty, 1]$

106

Sistemul $\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ x + y + z = a \end{cases}$, are o singură soluție $(x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, dacă:

- A** $a = -\frac{1}{2}$ **B** $a = \frac{1}{2}$ **C** $a = 2$ **D** $a = \frac{1}{4}$ **E** $a = -\frac{1}{4}$

107

Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $x = \sqrt{2-x}$ este:

- A** \emptyset **B** $\{1, -2\}$ **C** $\{1\}$ **D** $[1, 2]$ **E** $\{2\}$

108

Pentru ca funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow B$, $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x + 1}$ să fie surjectivă, trebuie ca:

- A** $B = \mathbb{R}$ **B** $B = \left[\frac{9-2\sqrt{21}}{3}, \frac{9+2\sqrt{21}}{3} \right]$ **C** $B = [1, 2]$ **D** $B = (1, 2)$ **E** $B = [-3, 3]$

109

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care valorile funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2 + 1}$, sunt cuprinse în intervalul $(0, 3)$, este:

- A** $(-4, 4)$ **B** $(-\infty, -4)$ **C** $(0, 3)$ **D** $(-2, 2)$ **E** $\{-2, 2\}$

110

Numărul soluțiilor $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ale ecuației $2|x - 2| + 3|y - 3| = 0$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** o infinitate

111

Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației $\sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 4x + 4} = 2x$ este:

- A** $[-1, 3]$ **B** $(0, \infty)$ **C** $[2, \infty)$ **D** $[-2, 2]$ **E** $(-\infty, 2]$

112

Soluția ecuației $(3 - 2\sqrt{2})^x - 2(\sqrt{2} - 1)^x = 3$ este:

- A** -1 **B** $\ln 2$ **C** 2 **D** $\log_2(3 - 2\sqrt{2})$ **E** $\frac{1}{\log_3(\sqrt{2}-1)}$.

113

Soluția ecuației $\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{6}\right)^x + \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^x = 1$ este:

- A** orice număr real **B** 1 **C** 0 **D** $-\frac{1}{2}$ **E** ecuația nu are soluție

114

Ecuația $(5 + \sqrt{24})^{\sqrt{x+1}} + (5 - \sqrt{24})^{\sqrt{x+1}} = 98$ are mulțimea soluțiilor:

- A** $\{3\}$ **B** $\{-3; 3\}$ **C** $\{-3\}$ **D** $\{\sqrt{3}; 3\}$ **E** $\{\frac{1}{3}; 3\}$

Fie $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\log_x 2 \log_x 4} + \frac{1}{\log_x 4 \log_x 8} + \dots + \frac{1}{\log_x 2^n \log_x 2^{n+1}}$, unde $n \geq 5$ este un număr întreg.

115 $f(\frac{1}{2})$ este:

- A** $\frac{n}{n+1}$ **B** 1 **C** $\frac{n+1}{n}$ **D** $\frac{1}{2} \frac{n+1}{n}$ **E** $2 \frac{n+1}{n}$

116 Soluția ecuației $f(x) = \frac{4n}{n+1}$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{4}$ **C** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **D** 4 **E** $\frac{1}{2^n}$

117

Mulțimea soluțiilor sistemului de ecuații $\begin{cases} x^2 + y^2 = 425 \\ \lg x + \lg y = 2 \end{cases}$ este:

- A** $\{(1; 1)\}$ **B** $\{(1; 1); (10; 10)\}$ **C** $\{(20; 5); (5; 20)\}$ **D** $\{(1; 10); (10; 1)\}$
E $\{(20; 5)\}$

118

Soluțiile ecuației $\log_{2x} 4x + \log_{4x} 16x = 4$ aparțin mulțimii:

- A** $\{3\}$ **B** $\{2\}$ **C** $[\frac{1}{2\sqrt{2}}, 2]$ **D** $\{\log_2 3\}$ **E** $(2, \infty)$

119

Mulțimea soluțiilor inecuației $\lg((x^3 - x - 1)^2) < 2 \lg(x^3 + x - 1)$ este:

- A** \mathbb{R} **B** $(0, \infty)$ **C** $(1, \infty)$ **D** $(0, 1)$ **E** alt răspuns

Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 9^x - 5^x - 4^x$.

120 Numărul de soluții reale ale ecuației $f(x) = 0$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

121 Numărul de soluții reale ale ecuației $f(x) - 2\sqrt{20^x} = 0$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

122

Mulțimea soluțiilor ecuației $\log_3 x^2 - 2 \log_{-x} 9 = 2$ este:

- A** $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0, x \neq -1\}$ **B** $\{-9\}$ **C** \emptyset **D** $\{9\}$ **E** $\{-\frac{1}{3}, -9\}$

Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln(x+a)}{\sqrt{x}}$, $a \in \mathbb{R}$.

123 Domeniul de definiție al funcției este:

- A** $(0, \infty)$ **B** $(0, \infty) \setminus \{1\}$ **C** (a, ∞) **D** $(-a, \infty)$ **E** $(\frac{-a+|a|}{2}, \infty)$

124 Mulțimea valorilor lui a pentru care $f(x) > 0$, pentru orice $x \in D$ este:

- A** $(-\infty, 0)$ **B** $(-1, 1)$ **C** $[1, \infty)$ **D** $(2, \infty)$ **E** alt răspuns

125 Dacă $\log_6 2 = a$, atunci valoarea lui $\log_6 324$ este:

- A** $a + 3$ **B** $5a - 2$ **C** $4 - 2a$ **D** $a^2(2 - a)^4$ **E** $3 + 2a$

126 Fie $a = \lg 2$ și $b = \lg 3$. Dacă $x = 3^{\log_{27}(\lg 150)^3}$ atunci:

- A** $x = 3 - 2b + a$ **B** $x = 2 + b - a$ **C** $x = 1$ **D** $x + 1 = a + b$ **E** $x = 81ab$

127 Soluția S a sistemului $\begin{cases} 2^x 5^y = 250 \\ 2^y 5^x = 40 \end{cases}$ este:

- A** $S = \emptyset$ **B** $S = \{(1, 3)\}$ **C** $S = \{(1, 0), (1, 3)\}$ **D** $S = \{(1, 0)\}$
E $S = \{(-1, 1), (1, 0)\}$

128 Valoarea expresiei $\sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$ este:

- A** 1 **B** 3 **C** 2 **D** $\sqrt{5}$ **E** $2\sqrt{5}$

129 Valoarea expresiei $\sqrt[3]{\sqrt{50} + 7} - \sqrt[3]{\sqrt{50} - 7}$ este:

- A** $2\sqrt{50}$ **B** 2 **C** 1 **D** 3 **E** $\sqrt{50}$

130 Știind că a este rădăcina reală a ecuației $x^3 + x + 1 = 0$, să se calculeze

$$\sqrt[3]{(3a^2 - 2a + 2)(3a^2 + 2a)} + a^2.$$

- A** $a + 1$ **B** 1 **C** 3 **D** 2 **E** a

131 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care

$$m9^x + 4(m-1)3^x + m > 1$$

oricare ar fi x real este:

- A** $(-\infty, 1)$ **B** $[1, \infty)$ **C** $(0, \infty)$ **D** $(1, \infty)$ **E** \emptyset

132

Mulțimea soluțiilor inecuației $\lg((x-1)^{10}) < 10 \lg x$ este:

- A** \mathbb{R} **B** $(0, \infty)$ **C** $(0, 1) \cup (1, \infty)$ **D** $(\frac{1}{2}, 1) \cup (1, \infty)$ **E** \emptyset

133

Mulțimea soluțiilor inecuației $\log_x(1+x) + \log_{x^2}(1+x) + \log_{x^4}(1+x) \geq \frac{7}{4}$ este:

- A** $(0, 1) \cup (1, \infty)$ **B** $(1, \infty)$ **C** $(0, \infty)$ **D** \emptyset **E** \mathbb{R}

134

Valoarea sumei $S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este:

- A** $\frac{n}{3n+1}$ **B** $\frac{3n}{3n+1}$ **C** $\frac{n+1}{3n+1}$ **D** $\frac{n-1}{3n+1}$ **E** $\frac{n}{3(3n+1)}$

135

Suma $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A** $\frac{1}{n+1}$ **B** $\frac{2n-1}{2}$ **C** $\frac{(n+1)!-1}{(n+1)!}$ **D** $\frac{n^2}{(n+1)!}$ **E** $\frac{n}{n+1}$

136

Suma $\sum_{k=3}^n A_k^3 C_n^k$, $n \geq 3$, are valoarea:

- A** $8C_n^3$ **B** $2^n A_n^3$ **C** $A_n^3 2^{n-3}$ **D** $2^{n-2} C_{n+1}^3$ **E** 3^n

137

Suma $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + nC_n^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A** $n2^{n-1}$ **B** $n2^n - 1$ **C** n **D** $\frac{n(n+1)}{2}$ **E** alt răspuns

138

Suma $\sum_{k=1}^n \frac{kC_n^k}{C_n^{k-1}}$, $n \in \mathbb{N}^*$, este egală cu:

- A** $\frac{n(n+1)}{2}$ **B** $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ **C** $\frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$ **D** $n(2n-1)$ **E** $n^3 - n^2 + n$

139

Soluția ecuației $A_x^6 - 24xC_x^4 = 11A_x^4$ aparține mulțimii:

- A** $[5, 7]$ **B** $[8, 10]$ **C** $\{10\}$ **D** $\{4\}$ **E** $\{6\}$

140

Să se determine termenul independent de a al dezvoltării $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}} + \sqrt[4]{a^3}\right)^{17}$.

- A** C_{17}^6 **B** C_{17}^7 **C** C_{17}^8 **D** C_{17}^{10} **E** C_{17}^{11}

141

O progresie aritmetică crescătoare $(a_n)_{n \geq 1}$ verifică relațiile $a_9 + a_{10} + a_{11} = 15$ și $a_9 a_{10} a_{11} = 120$. Suma primilor 20 de termeni din progresie este:

- A** 150 **B** 100 **C** 120 **D** 110 **E** 160

142

Ecuția $x^3 - (4 - i)x^2 - (1 + i)x + a = 0$, $a \in \mathbb{R}$, are o rădăcină reală dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

- A** $\{1, 2\}$ **B** $\{0, 1\}$ **C** $\{-1, 4\}$ **D** $\{0, 4\}$ **E** \mathbb{R}

143

Pentru ce valori ale parametrului real b ecuația

$$x^3 + a(a + 1)x^2 + ax - a(a + b) - 1 = 0$$

admite o rădăcină independentă de a ?

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** a **E** -1

144

Numerele reale nenule a, b, c sunt rădăcinile ecuației $x^3 - ax^2 + bx + c = 0$. În acest caz tripletul (a, b, c) este:

- A** $(1, 1, 1)$ **B** $(-1, -1, -1)$ **C** $(1, -1, 1)$ **D** $(1, -1, -1)$ **E** alt răspuns

145

Care este valoarea parametrului rațional m , dacă ecuația

$$x^4 - 7x^3 + (13 + m)x^2 - (3 + 4m)x + m = 0$$

admite soluția $x_1 = 2 + \sqrt{3}$ și soluțiile x_3 și x_4 verifică relația $x_3 = 2x_4$?

- A** -1 **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\frac{5}{3}$ **D** 2 **E** 4

146

Soluțiile ecuației $z\bar{z} + 2(z - \bar{z}) = 20 + 8i$, $z \in \mathbb{C}$, sunt:

- A** $\pm 2 + 4i$ **B** $\pm 4 + 2i$ **C** $4 + 2i$ **D** $4 - 2i$ **E** alt răspuns

147

Fie x_1, x_2, \dots, x_n rădăcinile ecuației $x^n - 3x^{n-1} + 2x + 1 = 0$. Valoarea sumei

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x_k - 1}$$
 este:

- A** $3n - 5$ **B** $2n + 1$ **C** $\frac{n}{n-1}$ **D** $\frac{n(n+1)}{n^2+n-1}$ **E** 0

148

Valoarea lui m pentru care ecuația $x^3 - 6x^2 + 11x + m = 0$ are rădăcinile în progresie aritmetică aparține mulțimii:

- A** $[-1, 1]$ **B** $[2, 4]$ **C** $[-4, -2]$ **D** $[-7, -5]$ **E** $[5, 6]$

149

Dacă ecuația $2x^3 + mx^2 + 4x + 4 = 0$ admite o rădăcină reală dublă, atunci m aparține mulțimii:

- A** $[-5, 0]$ **B** $[0, 2]$ **C** $[-8, -5]$ **D** $\{3\}$ **E** $(6, \infty)$

150

Mulțimea valorilor lui $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $x^3 - 28x + m = 0$ are o rădăcină egală cu dublul altei rădăcini este:

- A** $\{48\}$ **B** $\{-48\}$ **C** $\mathbb{R} \setminus \{48\}$ **D** $\mathbb{R} \setminus \{-48\}$ **E** $\{-48, +48\}$

151

Sistemul de ecuații $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \end{cases}$ are:

- A** o soluție **B** două soluții **C** trei soluții **D** patru soluții **E** șase soluții

152

Se consideră ecuația $x^4 - 5x^3 + ax^2 - 7x + 2 = 0$ cu a parametru real. Valoarea sumei $\sum_{i=1}^4 \frac{1}{x_i}$, unde x_i sunt rădăcinile ecuației, este

- A** $-\frac{7}{2}$ **B** $-\frac{3}{2}$ **C** 0 **D** $\frac{3}{2}$ **E** $\frac{7}{2}$

153

Valorile parametrului $m \in \mathbb{R}$ pentru care suma a două rădăcini ale ecuației $x^4 + 10x^3 + mx^2 + 50x + 24 = 0$ este egală cu suma celorlalte două rădăcini aparțin mulțimii:

- A** $[0, 10]$ **B** $[-4, -1]$ **C** $\{5\}$ **D** $[30, 40]$ **E** $[-1, 1]$

Fie $(x + 1)(x^2 + 2)(x^2 + 3)(x^2 + 4)(x^2 + 5) = \sum_{k=0}^9 A_k x^k$.

154

$\sum_{k=0}^9 A_k$ este:

- A** 720 **B** 724 **C** 120 **D** 600 **E** alt răspuns

155

$\sum_{k=0}^4 A_{2k}$ este:

- A** 360 **B** 120 **C** 100 **D** 240 **E** 300

156

Fie polinomul $P \in \mathbb{C}[X]$, $P = X^3 + pX + q$, cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 . Să se determine polinomul cu rădăcinile x_1^2, x_2^2, x_3^2 .

- A** $X^3 + 2pX^2 + p^2X - q^2$ **B** $X^3 + 2pX^2 - 4pX + q$ **C** $X^3 + 2pX^2 + p^2X + q^2$
D $X^4 + qX^2 + 5$ **E** $X^3 - pX^2 + qX + q^2$

157

Restul împărțirii polinomului $1 + X + X^2 + \dots + X^{1998}$ la $1 + X$ este egal cu:

- A** 0 **B** -1 **C** 1 **D** 1997 **E** 1999

158

Polinomul $(X^2 + X - 1)^n - X$ este divizibil cu polinomul $X^2 - 1$ dacă și numai dacă:

- A** $n = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ **B** $n = 3k, k \in \mathbb{N}^*$ **C** $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}^*$ **D** $n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}^*$
E $n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}^*$

159

Polinomul $(X^2 + X + 1)^n - X$ este divizibil cu polinomul $X^2 + 1$ dacă și numai dacă:

- A** $n = 3k, k \in \mathbb{N}^*$ **B** $n = 4k, k \in \mathbb{N}^*$ **C** $n = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ **D** $n = 4k + 2, k \in \mathbb{N}^*$
E $n = 4k + 3, k \in \mathbb{N}^*$

160

Mulțimea valorilor parametrului real a , pentru care ecuația $x^3 + ax + 1 = 0$ are toate rădăcinile reale și ele verifică relația $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 18$, este:

- A** $\{-12\}$ **B** $\{3\}$ **C** $\{-3\}$ **D** $\{-3, 3\}$ **E** \emptyset

161

Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația

$$x(x-1)(x-2)(x-3) = m$$

are toate rădăcinile reale este:

- A** $[-1, 9/4]$ **B** $[-1, 9/16]$ **C** $[-1, 9]$ **D** $[1, 1/16]$ **E** \emptyset

162

Restul împărțirii polinomului $P(X) = X^{100} + X^{50} - 2X^4 - X^3 + X + 1$ la polinomul $X^3 + X$ este:

- A** $X + 1$ **B** $2X^2 + 1$ **C** $2X^2 - 2X - 1$ **D** $2X^2 + 2X + 1$ **E** $X^2 + 1$

163

Se consideră polinoamele cu coeficienți complecși $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ și $Q(X) = b_0 + b_1X + \dots + b_mX^m$. Știind că polinomul $Q(X)$ se divide cu $X - 1$, să se determine suma coeficienților polinomului $P(Q(X))$.

- A** $\sum_{i=0}^n a_i$ **B** $\left(\sum_{i=0}^n a_i\right) \left(\sum_{i=0}^m b_i\right)$ **C** $a_n b_m$ **D** a_0 **E** $a_0 b_0$

164

Un polinom de grad mai mare sau egal cu 2, împărțit la $X - 1$ dă restul 3 și împărțit la $X + 1$ dă restul -5 . Restul împărțirii la $X^2 - 1$ este:

- A** -15 **B** $3X - 5$ **C** $-3X + 5$ **D** $4X - 1$
E nu se poate determina din datele problemei

165

Restul împărțirii polinomului $X^{400} + 400X^{399} + 400$ la polinomul $X^2 + 1$ este:

- A** $400X + 401$ **B** $400X - 399$ **C** $-400X + 401$ **D** $-400X + 399$ **E** 0

Fie numărul complex $z = 1 + i$.

- 166 Numărul complex $\frac{1}{z}$ este:
A $-1 - i$ **B** $1 - i$ **C** $\frac{1-i}{2}$ **D** $\frac{1+i}{2}$ **E** Alt răspuns

- 167 Dacă z^n este real, pentru o anumite valoare $n \in \mathbb{N}^*$, atunci numărul complex z^{2n} este:
A i^n **B** -1 **C** 1 **D** 2^n **E** $(\sqrt{2})^n$

- 168 Fie $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Dacă $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$ și $|z_1| = |z_2| = 1$, atunci $|z_1 - z_2|$ este:
A 2 **B** 1 **C** $\sqrt{3}$ **D** $\sqrt{2}$ **E** $\sqrt{3} - 1$.

- 169 Valoarea parametrului $m \in \mathbb{R}$ pentru care rădăcinile x_1, x_2, x_3 ale ecuației $x^3 + x + m = 0$, $m \in \mathbb{R}$, verifică relația $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 = 10$ este:
A 1 **B** -1 **C** 3 **D** 2 **E** -2

- 170 Există matrice nenule $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel ca $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dacă și numai dacă:
A $a = \sqrt{2}$ **B** $a \in \{-3, 2\}$ **C** $a \in \{-1, 1\}$ **D** $a \in \mathbb{R}^*$ **E** $a \in \{-2, 2\}$

- 171 Dacă x_1, x_2, x_3 sunt rădăcinile ecuației $x^3 - 2x^2 + 2x + 6 = 0$, atunci valoarea determinantului
- $$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}$$
- este:
A 6 **B** 4 **C** 2 **D** 0 **E** -2

- 172 Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ este o matrice inversabilă astfel ca $A + A^{-1} = 2I_n$, atunci are loc egalitatea:
A $A = 3I_n$ **B** $A^3 + A^{-3} = 2I_n$ **C** $A = -A$ **D** $A^2 + A^{-2} = I_n$ **E** $A - A^{-1} = 2I_n$

Fie x_1, x_2, x_3, x_4 rădăcinile polinomului $P = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

173 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$ este:
A -1 **B** 1 **C** -2 **D** 1/2 **E** 0

174 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ este:
A 1 **B** -1 **C** -2 **D** -4 **E** 0

175 $x_1^8 + x_2^{18} + x_3^{28} + x_4^{38}$ este:
A 1 **B** -2^3 **C** 2^4 **D** -1 **E** $4(1+i)$

176 Numărul soluțiilor ecuației $X^2 = I_2$ în $\mathcal{M}_2(\mathbb{N})$ este:
A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 16

Se consideră ecuația matriceală $X^2 = 2X + 3I_2$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

177 X^3 este:
A $7X + 6I_2$ **B** $6X + 7I_2$ **C** I_2 **D** X **E** $8X + 9I_2$

178 Numărul soluțiilor din $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ ale ecuației este:
A 0 **B** 2 **C** 8 **D** 16 **E** infinit

179 Fie $A \in M_{3,2}(\mathbb{C})$. Atunci $\det(A \cdot A^T)$ este:
A strict pozitiv **B** strict negativ **C** zero **D** de modul 1 **E** 1

Se dă ecuația: $X^n = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $X \in M_2(\mathbb{R})$.

180 Determinantul matricei $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

181 Câte soluții are ecuația pentru n impar?
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** n **E** o infinitate

182 Câte soluții are ecuația pentru n par?
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** n **E** o infinitate

183

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul $x + y + z = 0$, $x + 2y + az = 0$, $x + 4y + a^2z = 0$ are soluție nebanală, este:

- A** \mathbb{R} **B** $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ **C** $\{1, 3\}$ **D** $\{1, 2\}$ **E** $\{2, 3\}$

184

Dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $n \in \mathbb{N}^*$, atunci:

- A** $A^n = (a^2 + bc)I_2$ **B** $A^n = (a^2 + bc)^n I_2$ **C** $A^{2n} = (a^2 + bc)^n I_2$
D $A^{2n+1} = (a^2 + bc)^n I_2$ **E** $A^{2n} = (a^2 + bc)^n A$

185

Mulțimea valorilor parametrului real a pentru care sistemul de ecuații

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

este compatibil este:

- A** \mathbb{R} **B** \emptyset **C** $\{-2, 1\}$ **D** $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ **E** $\{-2\}$

186

Matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ verifică relația $A^3 = pA^2 + qA$ pentru:

- A** $p = -2, q = 3$ **B** $p = -2, q = 2$ **C** $p = 3, q = -2$ **D** $p = -3, q = 2$
E $p = 1, q = 1$

187

Mulțimea valorilor reale ale lui m , pentru care sistemul

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + 2my + z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

este compatibil determinat și soluția (x, y, z) verifică relația $x + y \geq z$, este:

- A** $(-\infty, 1]$ **B** $[-1, \infty)$ **C** $(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \cup (1, \infty)$ **D** $(0, 1)$ **E** $(-1, 1)$

188

Mulțimea valorilor lui $x \in \mathbb{R}$, pentru care determinantul

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & -1 & 2 \\ 1 & x^3 & -1 & 8 \\ 1 & x^2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

este nul, este:

- A** $\{-1, 1, 2\}$ **B** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1, -2\}$ **C** $\{-1, 1, -2\}$ **D** \emptyset **E** $\{1\}$

189

Pe \mathbb{R} se definește legea de compoziție: $x * y = xy - ax + by$. Numerele $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care $(\mathbb{R}, *)$ este monoid sunt:

- A** $a = b \neq 0$ **B** $a = 0, b = 1$ **C** $a = b = 0$ sau $a = -1, b = 1$ **D** $a = -1, b = 0$
E nu există astfel de numere

190

Fie grupurile (\mathbb{C}^*, \cdot) și (\mathbb{R}^*, \cdot) . Să se determine $a \in \mathbb{R}^*$ și $b \in \mathbb{R}$ astfel ca funcția $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$, $f(z) = a|z| + b$, să fie morfism de grupuri.

- A** $a = 2, b = 1$ **B** $a = -1, b = 1$ **C** $a = 1, b = 0$ **D** $a = -2, b = 3$ **E** $a = 0, b = 5$

191

Mulțimea elementelor inversabile ale monoidului $(\mathbb{Z}[i], \cdot)$ este:

- A** $\{-2, 2\}$ **B** $\{-1, 1, -i, i\}$ **C** $\{1 - i, 1 + i\}$ **D** $\{1, i, 2i, -2\}$ **E** \emptyset

192

Fie $m \in \mathbb{Z}$ și operația $*$ definită prin $x * y = xy + mx + my + a$. Valoarea lui a pentru care operația $*$ definește o structură de monoid pe \mathbb{Z} este:

- A** $1 - m$ **B** m^2 **C** $m - 1$ **D** 0 **E** $m^2 - m$

Pe mulțimea numerelor reale \mathbb{R} se definește legea de compoziție ” $*$ ” prin $x * y = xy - 2x - 2y + \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

193

Legea ” $*$ ” este asociativă pentru:

- A** $\lambda = 1$ **B** $\lambda = 2$ **C** $\lambda = -1$ **D** $\lambda = -3$ **E** $\lambda = 6$

194

Mulțimea $M = (2, \infty)$ este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea ” $*$ ” pentru:

- A** $\lambda = 2$ **B** $\lambda = 3$ **C** $\lambda < 3$ **D** $\lambda \geq 6$ **E** $\lambda > 6$

195

Legea ” $*$ ” are element neutru pentru:

- A** $\lambda = 4$ **B** $\lambda = 6$ **C** $\lambda = -6$ **D** $\lambda = 1$ **E** $\lambda = 0$

196

Legea de compoziție $x * y = \sqrt[n]{x^n + y^n}$, determină pe \mathbb{R} o structură de grup, dacă și numai dacă:

- A** $n = 1$ **B** $n = 3$ **C** $n = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ **D** $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}^*$ **E** $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$

197

In monoidul $(\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}), \cdot)$ mulțimea elementelor inversabile este:

- A** $\{A \mid \det A \neq 0\}$ **B** $\{A \mid \det A = 1\}$ **C** $\{-I_2, I_2\}$
D $\{A \mid \det A^2 = 0\}$ **E** $\{A \mid \det A \in \{-1, 1\}\}$

198

Să se determine grupul $(G, *)$, știind că funcția

$$f : (0, \infty) \rightarrow G, \quad f(x) = x + 1,$$

este un izomorfism al grupurilor $((0, \infty), \cdot)$ și $(G, *)$.

- A $G = (0, \infty)$ și $x * y = xy$
 B $G = (1, \infty)$ și $x * y = xy$
 C $G = (1, \infty)$ și $x * y = xy - x - y + 2$
 D $G = \mathbb{R}$ și $x * y = x + y$
 E $G = (1, \infty)$ și $x * y = x + y - 1$

199

Se consideră grupurile $G = (\mathbb{R}, +)$ și $H = (\mathbb{R}, *)$, unde $x * y = x + y + 1$. Funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = ax + b$ este izomorfism de la G la H , dacă și numai dacă:

- A $a = b = 1$
 B $a = -1, b = 1$
 C $a \neq 0, b = -1$
 D $a = 1, b \neq 0$
 E $a = 1$, și $b = 0$

Fie monoidul (M, \cdot) unde $M = \{A_a \mid a \in \mathbb{R}\}$ cu $A_a = \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}$.

200

Matricea $A_1 \cdot A_1$ este:

- A A_1
 B A_2
 C A_3
 D A_4
 E A_{-1}

201

Elementul unitate este:

- A I_3
 B A_1
 C A_0
 D $A_{\frac{1}{2}}$
 E A_{-1}

202

Inversul elementului A_1 este:

- A $A_{\frac{1}{4}}$
 B A_4
 C $A_{\frac{1}{2}}$
 D A_2
 E A_{-1}

Pe \mathbb{R} se consideră legea de compoziție $x * y = ax + by + c$, $a \neq 0, b \neq 0$.

203

$*$ este asociativă dacă și numai dacă

- A $a = b, c = 0$
 B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$
 C $a = b = c = 2$
 D $a = b = -1, c = 2$
 E alt răspuns

204

$*$ este asociativă și admite element neutru dacă și numai dacă

- A $a = b = 1, c = 0$
 B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$
 C $a = b = c = 2$
 D $a = b = 2, c = 0$
 E alt răspuns

205

$(\mathbb{R}, *)$ este grup dacă și numai dacă

- A $a = b = 1, c = 0$
 B $a = b = 1, c \in \mathbb{R}$
 C $a = b = c = 2$
 D $a = b = 2, c = 0$
 E alt răspuns

206

Funcția $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = ax$ este automorfism al grupului $(\mathbb{Z}, +)$ dacă și numai dacă:

- A** $a = 1$, **B** $a = -1$ **C** $a \in \{-1, 1\}$ **D** $a \in \mathbb{Z}^*$ **E** $a \in \{0, 1\}$

207

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{ax + b}{x^2 + 1}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Mulțimea perechilor $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care imaginea funcției f este $\text{Im } f = [-3, 1]$ este:

- A** $\{(0, 0)\}$ **B** $\{(1, -\sqrt{2})\}$ **C** $\{(2\sqrt{3}, -2), (-2\sqrt{3}, -2)\}$ **D** $\{(\frac{1}{2}, \sqrt{2}), (-\frac{1}{2}, \sqrt{2})\}$
E $\{(0, 1), (1, 0)\}$

208

Imaginea funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1}$, $a \in \mathbb{R}$, este inclusă în intervalul $[0, 2]$, dacă:

- A** $a \geq 3$ **B** $a \leq -2$ **C** $a \in [-1, 0)$ **D** $a \in [0, 2]$ **E** $a \in (-2, -1)$

209

Mulțimea valorilor lui x , pentru care este definit radicalul ${}^{6-x}\sqrt{x}$, conține:

- A** 5 elemente **B** 7 elemente **C** un interval **D** 4 elemente **E** nici un element

210

Mulțimea numerelor complexe z care verifică ecuația $z^2 - 2|z| + 1 = 0$ este:

- A** $\{-1, 1\}$ **B** $\{1 - i, i + 1\}$ **C** $\{-1, 1, (\sqrt{2} - 1)i, (1 - \sqrt{2})i\}$
D $\{-1, 1, 1 - i\}$ **E** \emptyset

211

Se consideră ecuația $ax^2 + bx + c = 0$, unde a, b, c sunt numere întregi impare. Care din următoarele afirmații este adevărată?

- A** ecuația are o rădăcină pară **B** ecuația are o rădăcină impară
C ecuația are două rădăcini pare **D** ecuația nu are rădăcini întregi
E ecuația are două rădăcini impare

212

Ecuația $\sqrt{mx^2 + x + 1} + \sqrt{mx^2 - x + 1} = x$ are soluții reale dacă și numai dacă:

- A** $m = 0$ **B** $m = 1$ **C** $m = \frac{1}{2}$ **D** $m = \frac{1}{4}$ **E** $m > 0$

213

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația

$$x^4 + 4x^3 + ax^2 + 4x + 1 = 0$$

are toate rădăcinile reale este:

- A** $(-\infty, -10]$ **B** $(-\infty, -10] \cup \{6\}$ **C** $[4, \infty)$ **D** $\{0\}$ **E** \emptyset

214

Soluțiile ecuației $1 - 3^{x-1} + 2^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{x}{2}} 3^{\frac{x-1}{2}} = 0$ aparțin mulțimii:

- A** $[-3, 0]$ **B** $[0, 2]$ **C** $\{0; -2\}$ **D** $[3, \infty)$ **E** $\{\frac{1}{2}\}$

215

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care $\log_a(x^2 + 4) \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}$, este:

- A** $(1, 2]$ **B** $[-2, 0)$ **C** $(0, 4]$ **D** $[2, 3]$ **E** $(1, 3)$

216

Soluția x a ecuației $\log_x(x+1) + \log_{x^3}(x^3+1) = 2 \log_{x^2}(x^2+1)$ verifică:

- A** $x \in [0, 1)$ **B** $x \in \emptyset$ **C** $x \in (2, 3)$ **D** $x \in (3, 4)$ **E** $x \in (1, 2)$

217

Cel mai mare termen al dezvoltării binomului $(1 + \sqrt{2})^{100}$ este:

- A** T_{57} **B** T_{58} **C** T_{59} **D** T_{60} **E** T_{61}

218

Fie m, n, p numere naturale nenule, $m \neq n$. Dacă într-o progresie aritmetică avem $a_n = m$, și $a_m = n$, atunci a_p este egal cu:

- A** $m + n - p$ **B** $p - m - n$ **C** $m + n - 2p$ **D** $2p - m - n$ **E** $m + n + p$

Fie polinomul $P(x) = x^3 - x^2 - x + a$, unde a este un parametru real.

219

Valoarea lui a pentru care polinomul are o rădăcină dublă întreagă este:

- A** $a = 1$ **B** $a = -1$ **C** $a = 2$ **D** $a = \frac{1}{2}$ **E** $a = -\frac{3}{2}$

220

Valoarea lui a pentru care polinomul are o rădăcină triplă întreagă este:

- A** $a = 1$ **B** nu există un astfel de a **C** $a = -1$ **D** $a = 2$ **E** $a = -2$

Fie $x_n = (2 + \sqrt{3})^n, n \in \mathbb{N}^*$.

221

Câte perechi $(a_n, b_n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ cu proprietatea $x_n = a_n + b_n\sqrt{3}$ există pentru n fixat?

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** o infinitate

222

Valoarea lui $a_n^2 - 3b_n^2$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** $\sqrt{3}$

223

Câte soluții are ecuația $x^2 = 3y^2 + 1$ în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?

- A** 1 **B** 3 **C** 5 **D** 6 **E** o infinitate

224

Fie x_1, x_2, x_3, x_4 și x_5 rădăcinile ecuației $x^5 + x^4 + 1 = 0$.

Valoarea sumei $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i^4}$ este:

- A** -4 **B** -3 **C** -2 **D** -1 **E** 0

Ecuția $x^4 - 8x^3 + ax^2 - bx + 16 = 0$ are toate rădăcinile pozitive, $a, b \in \mathbb{R}$.

225 Media aritmetică a rădăcinilor x_1, x_2, x_3, x_4 este
A 1 **B** 2 **C** 0 **D** 4 **E** 8

226 Media geometrică a rădăcinilor x_1, x_2, x_3, x_4 este
A 2 **B** 1 **C** 4 **D** 0 **E** 16

227 Valorile parametrilor $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația are toate rădăcinile reale și pozitive sunt:
A $a = 1, b = 0$ **B** $a = 24, b = 32$ **C** $a = 24, b = 1$ **D** $a = 32, b = 24$
E $a = 1, b = 32$

228 Fie $\alpha \in \mathbb{C}$ astfel ca $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$, $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o matrice, $A \neq O_2$, astfel încât

$$\det(I_2 - A) \cdot \det(\alpha I_2 - A) = \alpha^2.$$
 Valoarea lui $\det(I_2 + \alpha A + \alpha^2 A^2)$ este:
A -1 **B** 0 **C** 2 **D** α **E** 1

229 Dacă $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A \neq O_2$ și există $n \geq 6$ astfel ca $A^n = O_2$, atunci valoarea minimă a lui $p \in \mathbb{N}^*$ pentru care $A^p = O_2$ este:
A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

230 Mulțimea $G = \{z \in \mathbb{C} \mid az^n = b\}$, $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$, este un subgrup al grupului (\mathbb{C}^*, \cdot) dacă:
A $b = 0$ **B** $a = b$ **C** $|a| = |b|$ **D** $a = -b$ **E** $a^n = b$

231 Câte elemente inversabile are monoidul $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], \cdot)$?
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** o infinitate

232 Funcția $f(x, y) = \frac{ax + by}{1 + xy}$, $a, b \in \mathbb{R}$, este o lege de compoziție pe intervalul $(-1, 1)$ dacă:
A $a = b = 2$ **B** $a + b \in (-1, 1)$ **C** $a \in (-1, 1)$ și $b \in (-1, 1)$ **D** $a = b \in [-1, 1]$ **E** $a + b = 1$

233 Fie $x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$, $x, y \in (-1, 1)$. Numărul $\frac{1}{2} * \frac{1}{3} * \dots * \frac{1}{1000}$ este:
A $\frac{500499}{500502}$ **B** $\frac{500499}{500501}$ **C** $\frac{500500}{500501}$ **D** $\frac{500501}{500502}$ **E** $\frac{500400}{500501}$

Fie mulțimea $A = \{1, 2, \dots, 8\}$. Câte dintre submulțimile lui A satisfac următoarele cerințe?

234 au 4 elemente, îl conțin pe 2 și nu îl conțin pe 3:

- A** C_6^3 **B** C_7^3 **C** C_8^3 **D** C_6^4 **E** alt răspuns

235 cel mai mic element al fiecărei submulțimi este 1:

- A** C_6^3 **B** C_7^3 **C** C_8^3 **D** $2^8 - 1$ **E** alt răspuns

Fie mulțimea $A = \{1, 2, \dots, 8\}$. În câte moduri se poate scrie A ca reuniune a două mulțimi disjuncte și:

236 nevide?

- A** $2^8 - 1$ **B** C_8^2 **C** $2^7 - 1$ **D** $(C_8^2)^2$ **E** $2^8 - 2$

237 având număr egal de elemente?

- A** C_7^3 **B** C_8^4 **C** $(C_8^4)^2$ **D** 2^4 **E** 2^5

Fie mulțimea $A = \{1, 2, \dots, 8\}$. Câte dintre submulțimile lui A satisfac următoarele cerințe?

238 nu conțin numere pare:

- A** 15 **B** 16 **C** 32 **D** 127 **E** 128

239 conțin cel puțin un număr impar:

- A** 127 **B** 128 **C** 129 **D** 240 **E** 255

240 conțin atât numere pare cât și impare:

- A** 225 **B** 235 **C** 245 **D** 255 **E** alt răspuns

Un număr de 8 bile numerotate de la 1 la 8 se distribuie în 4 cutii etichetate A , B , C , D . În câte moduri se poate face distribuirea dacă se admit cutii goale și:

241 se distribuie toate bilele?

- A** 2^{12} **B** 2^{15} **C** 2^{16} **D** 5^8 **E** C_8^4

242 nu este obligatoriu să se distribuie toate bilele?

- A** 2^{12} **B** 2^{15} **C** 2^{16} **D** 5^8 **E** C_8^4

Se consideră un zar obișnuit (un cub cu fețele numerotate de la 1 la 6) cu care se aruncă de două ori.

243 Probabilitatea de a obține aceeași valoare în ambele aruncări este:

A $\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{36}$

C $\frac{1}{21}$

D $\frac{2}{7}$

E $\frac{5}{36}$

244 Probabilitatea ca valoarea de la a doua aruncare să fie mai mare decât cea de la prima aruncare este:

A $\frac{5}{6}$

B $\frac{5}{12}$

C $\frac{5}{18}$

D $\frac{5}{36}$

E $\frac{5}{72}$

245 Dacă știm că la a doua aruncare s-a obținut un număr mai mare decât cel de la prima aruncare, atunci probabilitatea ca la prima aruncare să fi obținut 3 este:

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{5}$

D $\frac{1}{6}$

E $\frac{1}{12}$

* * *

246

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right)$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** 4 **C** 1 **D** ∞ **E** 0

247

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{x}{2^n} \right)^{2^n}$ este:

- A** e **B** $\frac{2}{x}$ **C** e^x **D** e^{-x} **E** $\frac{1}{e}$

248

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (\sqrt[n]{n} - 1)$ este:

- A** 1 **B** e **C** ∞ **D** 0 **E** $\frac{1}{e}$

249

Se dă șirul cu termeni pozitivi $(a_n)_{n \geq 0}$ prin relațiile:

$a_0 = 2; a_1 = 16; a_{n+1}^2 = a_n a_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$. Limita șirului $(a_n)_{n \geq 0}$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 4 **D** 8 **E** ∞

250

Fie $a \in \mathbb{R}, a > 0$ un număr fixat. Se consideră șirurile $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ definite prin

$x_{n+1} = a^{\frac{1}{(n+1)!}} \cdot x_n^{\frac{1}{n+1}}, \quad n \geq 1, x_1 = 1, \quad b_n = \prod_{k=1}^n x_k.$

Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ este:

- A** \sqrt{a} **B** a **C** a^2 **D** ∞ **E** 0

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = x_n + \frac{2}{x_n}$, $x_0 = 1$.

251 Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ este:
A 0 **B** 1 **C** e **D** ∞ **E** nu există

252 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}}$ este egală cu:
A 1 **B** 2 **C** 3 **D** π **E** ∞

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, definit prin relația de recurență $x_{n+1} = e^{x_n} - 1$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

253 Numărul valorilor lui x_0 pentru care șirul este constant este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 5 **E** 10

254 Șirul este crescător dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:
A $(-\infty, 0)$ **B** $[0, \infty)$ **C** $(-\infty, 0]$ **D** $(0, \infty)$ **E** \mathbb{R}

255 Dacă $x_0 > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este:
A ∞ **B** 0 **C** nu există **D** 1 **E** $2e$

256 Șirul este convergent dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:
A \emptyset **B** $\{0\}$ **C** $(-\infty, 0]$ **D** $(-\infty, 0)$ **E** $(0, \infty)$

257 Pentru $x_0 = -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ este:
A -2 **B** -1 **C** 0 **D** 1 **E** nu există

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit prin relația de recurență $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1$, $x_1 \in \mathbb{R}$.

258 Dacă $x_{100} = 1$, atunci x_2 este:
A 1 **B** 0 **C** -1 **D** 2 **E** $\frac{1}{2}$

259 Șirul este convergent dacă și numai dacă x_1 aparține mulțimii:
A $[0, 1]$ **B** $(0, 1)$ **C** $\{0, 1\}$ **D** $\{1\}$ **E** $[-1, 1]$

260 Dacă $x_1 = 2$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}$ este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** $+\infty$ **E** nu există

261 Dacă $x_1 = 2$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right)$ este:
A 1 **B** 2 **C** $\sqrt{2}$ **D** e **E** $+\infty$

262 Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, definit prin relația de recurență $x_{n+1} = 2^{\frac{x_n}{2}}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, are limita 2, dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:
A $\{2\}$ **B** $[-2, 2]$ **C** $(-\infty, 2]$ **D** $[2, 4)$ **E** alt răspuns

Valorile limitelor următoare sunt:

263 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2}$
A 1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 2 **E** ∞

264 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt[n]{2})^n$
A $\frac{1}{2}$ **B** 0 **C** 1 **D** 2 **E** ∞

265 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt{2})(2 - \sqrt[3]{2}) \cdots (2 - \sqrt[n]{2})$
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** $\sqrt{2}$ **E** e

266 Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere reale, astfel ca șirul

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - a_n \ln n,$$

$n \geq 1$, să fie mărginit. Limita șirului $(a_n)_{n \geq 1}$ este:

A e **B** 0 **C** ∞ **D** 1 **E** $\frac{1}{e}$

267

Fie $a \in \mathbb{R}$ astfel încât șirul $(x_n)_{n \geq 1}$,

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - a \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right),$$

să fie mărginit. Limita lui este:

- A** 0 **B** $\ln 2$ **C** 2 **D** $-\ln 2$ **E** $\frac{1}{2}$

268

Fie $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$ constanta lui Euler.

Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(e^{1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}} - 2e^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n}}\right)$ este:

- A** $-\frac{1}{2}e^{\frac{\gamma}{2}}$ **B** e^{γ} **C** $-\frac{\gamma}{2}$ **D** $-\frac{\gamma}{4}$ **E** $e^{\frac{\gamma}{2}}$

269

Valoarea limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+(-1)^n}{3n-(-1)^n}$ este:

- A** 3 **B** 0 **C** ∞ **D** 1 **E** nu există, conform teoremei Stolz-Cesaro

270

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n^3 + 2n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^3 - 1}$ este:

- A** 0 **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{2}{3}$ **D** 1 **E** $\frac{4}{3}$

271

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 3n + 1}{n^2 + 1}\right)^{\frac{n^2+n+1}{n+1}}$ este:

- A** e^6 **B** e^{-1} **C** e^{-3} **D** e^{-2} **E** e^9

272

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{2n})}{\ln(1 + e^{3n})}$ este:

- A** 1 **B** $\frac{1}{3}$ **C** 2 **D** $\frac{2}{3}$ **E** $\ln 2$

273

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 1}\right)^{\frac{n+1}{n^2+1}}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** e **E** ∞

274

Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots - 2n}{3n + 1}$ este:

- A** $\frac{1}{3}$ **B** -2 **C** ∞ **D** $\frac{2}{3}$ **E** $-\frac{1}{3}$

275

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \text{ este:}$$

- A** 5 **B** 4 **C** 1 **D** 2 **E** 3

276

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)\sqrt{k} + k\sqrt{k+1}} \text{ este:}$$

- A** 1 **B** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **C** $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ **D** ∞ **E** nu există

277

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k-1}}{(1+2^k)(1+2^{k+1})} \text{ este:}$$

- A** $-\frac{1}{3}$ **B** $-\frac{1}{2}$ **C** $\frac{1}{3}$ **D** $\frac{1}{6}$ **E** $\frac{1}{2}$

278

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \text{ este:}$$

- A** 0 **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{2}{3}$ **D** 1 **E** $\frac{4}{3}$

279

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}}, \text{ unde } (a_k), k \in \mathbb{N}^*, a_1 > 0, \text{ formează o progresie aritmetică cu rația } r > 0, \text{ este:}$$

- A** ∞ **B** $\frac{1}{a_1 r}$ **C** 1 **D** a_1 **E** 0

280

$$\text{Fie } S_n = \sum_{k=2}^n \frac{k^2 - 2}{k!}, n \geq 2. \text{ Alegeți afirmația corectă:}$$

- A** $S_n < 3$ **B** $S_n > 3$ **C** $S_n = e$ **D** $S_n < 0$ **E** $S_n = e - \frac{1}{2}$

281

$$\text{Fie } n \in \mathbb{N}^* \text{ și fie } S_n = \sum_{k=1}^n k! \cdot (k^2 + 1). \text{ Atunci } S_n \text{ este:}$$

- A** $(n+1)! \cdot n$ **B** $2 \cdot n! \cdot n$ **C** $(n+1)!$ **D** $(n+1)! - n! + 1$ **E** $(n+1)! + n! - 1$

282

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} \text{ este:}$$

- A** $\frac{1}{4}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** 0 **D** -1 **E** nu există

283

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{6}{k(k+1)(k+3)}$ este:

A $\frac{2}{3}$

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{7}{6}$

D 1

E $\frac{3}{2}$

284

Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = \cos(\pi\sqrt{4n^2 + n + 1})$, este:

A $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B $\frac{1}{2}$

C 0

D nu există

E 1.

Se consideră șirul $(a_n)_{n \geq 1}$, unde $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{n^2 - 1}{a_n} + 2$, $n \geq 1$.

285

a_2 este:

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

286

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ este:

A 1

B 0

C ∞

D 2

E 3

287

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k^3}{n^4}$ este:

A $\frac{1}{4}$

B 1

C // 0

D 2

E 4

288

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{e^n n!}$ este:

A 0

B 1

C e

D \sqrt{e}

E ∞

289

Fie $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $q > 0$. Se cere valoarea limitei:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{qn+1}{qn} \frac{qn+p+1}{qn+p} \dots \frac{qn+np+1}{qn+np}.$$

A $\sqrt[p]{\frac{p}{q}}$

B $\sqrt[p]{\frac{p+q}{q}}$

C $\sqrt[p]{\frac{q}{p+q}}$

D $p \sqrt[p]{\frac{p}{q}}$

E $p^2 \sqrt[p]{\frac{p}{q}}$

290

Fie x_0 un întreg pozitiv. Se definește șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin

$$x_{n+1} = \begin{cases} \frac{x_n}{2}, & \text{dacă } x_n \text{ este par,} \\ \frac{1+x_n}{2}, & \text{dacă } x_n \text{ este impar,} \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots$$

Limita șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** ∞ **D** e **E** Nu există pentru unele valori ale lui x_0

291

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a} + \sqrt[3]{a} + \dots + \sqrt[n]{a} - n}{\ln n}$, $a > 0$, este:

- A** 0 **B** $\ln a$ **C** ∞ **D** e **E** a

292

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \right)$ este:

- A** 1 **B** $\frac{7}{2}$ **C** $\frac{8}{3}$ **D** $\frac{3}{2}$ **E** 0

293

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{(2n)^k}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $e^{\frac{1}{2}}$ **D** e^2 **E** ∞

294

Fie $p_n = \prod_{k=1}^n \cos(2^{k-1}x)$, $x \neq k\pi$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ este:

- A** 1 **B** $\frac{\cos x}{x}$ **C** 0 **D** $\frac{\sin x}{x}$ **E** nu există

295

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n2^n + k}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 2 **E** ∞

296

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{kC_n^k}{n2^n + k}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 2 **E** ∞

297

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\cos n\pi}{n} \right)^n$ este:

- A** ∞ **B** 0 **C** 1 **D** e **E** nu există

298

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^n(x^2 + 4)}{x(x^n + 1)}$, $x > 0$ este:

- A** $\frac{1}{x}$ **B** ∞ **C** x **D** $\frac{x^2+4}{x}$ **E** alt răspuns

299

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arcsin \frac{k}{n^2}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** ∞ **D** $\frac{1}{2}$ **E** 2π

300

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 2}$, $x_n = \sqrt[n]{1 + \sum_{k=2}^n (k-1)(k-1)!}$.

Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ este:

- A** ∞ **B** $\frac{1}{e}$ **C** 0 **D** 1 **E** e

301

Fie $x \in \mathbb{R}$. Notăm cu $[x]$ partea întreagă a numărului real x . Limita șirului

$$x_n = \frac{[x] + [3^2x] + \dots + [(2n-1)^2x]}{n^3}, \quad n \geq 1,$$

este:

- A** $\frac{x}{2}$ **B** 1 **C** 0 **D** $\frac{3x}{4}$ **E** $\frac{4x}{3}$

302

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln (a^{\frac{n}{1}} + a^{\frac{n}{2}} + \dots + a^{\frac{n}{n}})$, unde $a \in (1, \infty)$, este:

- A** $1 - \ln a$ **B** $1 + \ln a$ **C** $2 + \ln a$ **D** $-\ln a$ **E** $\ln a$

303

Șirul $\sqrt[n]{2^n \sin 1 + 2^n \sin^2 + \dots + 2^n \sin^n}$, $n = 2, 3, \dots$, este:

- A** convergent **B** mărginit și divergent **C** nemărginit și divergent
D cu termeni negativi **E** are limită infinită

304

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n}}{\ln^2 n}$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 2 **E** nu există

305

Șirul $a_n = 1^9 + 2^9 + \dots + n^9 - a n^{10}$, $a \in \mathbb{R}$, este convergent dacă:

- A** $a = 9$ **B** $a = 10$ **C** $a = 1/9$ **D** $a = 1/10$
E nu există un astfel de a

306

Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = ac + (a + ab)c^2 + \dots + (a + ab + \dots + ab^n)c^{n+1}$.

Atunci, pentru orice $a, b, c \in \mathbb{R}$ cu proprietățile $|c| < 1$, $b \neq 1$ și $|bc| < 1$, avem:

- A** (x_n) nu este convergent **B** $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ **C** $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$
D $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a+bc}{(1-ab)c}$ **E** $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{ac}{(1-bc)(1-c)}$

307

Pentru numărul natural $n \geq 1$, notăm cu x_n cel mai mare număr natural p pentru care este adevărată inegalitatea $3^p \leq 2008 \cdot 2^n$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\log_3 2$ **D** 2008 **E** Limita nu există

Fie $0 < b < a$ și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unde $x_0 = 1$, $x_1 = a + b$,

$$x_{n+2} = (a + b)x_{n+1} - abx_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

308

Dacă $0 < b < a$ și $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ atunci

- A** $l = a$ **B** $l = b$ **C** $l = \frac{a}{b}$ **D** $l = \frac{b}{a}$ **E** nu se poate calcula

309

Dacă $0 < b < a < 1$ și $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x_k$ atunci:

- A** $L = 1$ **B** $L = \frac{1}{(1-a)(1-b)}$ **C** $L = \frac{2-a-b}{(1-a)(1-b)}$ **D** $L = \frac{a+b}{(1-a)(1-b)}$ **E** $L = \frac{a+b-1}{(1-a)(1-b)}$

310

Mulțimea tuturor valorilor lui a pentru care șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin recurența $x_0 = a$, $x_{n+1} = x_n^2 - 4x_n + 6$, este convergent este:

- A** $\{1\}$ **B** $[-1, 2]$ **C** $\{0\}$ **D** $(0, 1)$ **E** $[1, 3]$

311

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(p+n)!}{n!n^p} \right)^n$, $p \in \mathbb{N}$ este:

- A** ∞ **B** 0 **C** e **D** $e^{1/6}$ **E** $e^{\frac{p(p+1)}{2}}$

312

Câte șiruri convergente de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ verifică relația

$$\sum_{k=1}^{10} x_{n+k}^2 = 10,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$?

- A** 1 **B** 10 **C** 0 **D** o infinitate **E** 2

313

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ are limita $\frac{\pi^2}{6}$. Să se calculeze limita șirului $(y_n)_{n \geq 1}$, $y_n = 1 + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2}$.

- A** $\frac{\pi^2}{8}$ **B** $\frac{\pi^2}{3}$ **C** $\frac{\pi^2}{16}$ **D** $\frac{\pi}{3}$ **E** $\frac{\pi^2}{12}$

314

Fie x_n soluția ecuației $\operatorname{tg} x = x$ din intervalul $(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2})$, $n \in \mathbb{N}$. Valoarea limitei

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n \right)$$

este:

- A** 1 **B** 0 **C** $\frac{1}{\pi}$ **D** $\frac{\pi}{2}$ **E** $\frac{\pi}{4}$

315

Mulțimea valorilor funcției $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ este:

- A** $[-1, e^{\frac{1}{e}}]$ **B** \mathbb{R} **C** $[0, 1]$ **D** $(0, \frac{1}{e}) \cup [1, e]$ **E** $(0, e^{\frac{1}{e}}]$

316

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x^{x^2}}{(1-x)^2}$ este:

- A** e **B** -1 **C** 1 **D** $-e$ **E** 0

317

$\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** e **D** ∞ **E** nu există

318

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \overbrace{\sin(\sin(\dots(\sin x)\dots))}^{\text{de } n \text{ ori sin}}}{x^3}$$

- A** 0 **B** $n/2$ **C** $n/3$ **D** $n/4$ **E** alt răspuns

319

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax)^{\frac{1}{x}} - (1+x)^{\frac{a}{x}}}{x}$, $a \in \mathbb{R}$.

- A** $\frac{a(1-a)}{2}$ **B** $a(1-a)$ **C** 0 **D** ae **E** $\frac{a(1-a)}{2}e^a$

320

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arcsin(\sin x)}{x}$$

- A** 0 **B** 1 **C** ∞ **D** $-\infty$ **E** nu există

321

$\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$ este:

- A** 0 **B** ∞ **C** nu există **D** -1 **E** 1

322

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(ax^2 + bx + c)}{x^2 - 1}$, unde $a, b, c \in \mathbb{R}$ astfel încât $a + b + c = \pi$, este:

- A** $a + b$ **B** $\pi - a - b$ **C** $2a + b$ **D** $-\frac{2a+b}{2}$ **E** $2(a + b)$

323

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** nu există **D** $\frac{1}{2}$ **E** ∞

324

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{\sqrt[3]{x+8} - 2}$

- A** 3 **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{2}{3}$ **D** nu există **E** 0

325

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^m \operatorname{arctg} k^2 x}{\sum_{k=1}^m \ln(1 + k^3 x)}$

- A** $\frac{m(m+1)}{m+2}$ **B** $\frac{2}{3} \frac{2m+1}{m(m+1)}$ **C** $\frac{(m+1)(2m+1)}{2m^2}$ **D** 0 **E** $\frac{\pi}{2e}$

326

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x a_2^{2x} \cdots a_n^{nx} - 1}{x}$, $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, este:

- A** $\ln(a_1 a_2 \cdots a_n)$ **B** $\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n$ **C** $\ln(a_1 a_2^2 \cdots a_n^n)$ **D** $e^{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}$
E $e^{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$

327

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (2x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{x^n}$

- A** 2^n **B** $2^n - 3^n$ **C** 1 **D** $3^n + 1$ **E** 0

328

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$

- A** ∞ **B** $-\infty$ **C** 0 **D** 1 **E** $\frac{1}{2}$

329

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + x + 1} \right)$

- A** -1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2}$ **D** $-\frac{1}{2}$ **E** 1

330

$\lim_{x \rightarrow 0} x e^{-\frac{1}{x}}$

- A** 0 **B** e **C** $-\infty$ **D** nu există **E** 1

331

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - ex \right)$$

- A** $-\frac{e}{2}$ **B** e **C** 0 **D** ∞ **E** $2e$

Valoarea limitelor:

332

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^n - \sin^n x}{x^{n+2}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2;$$

- A** ∞ **B** 0 **C** $-\frac{n}{6}$ **D** $\frac{n}{6}$ **E** 1

333

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

- A** e **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{e}{2}$ **D** $-\frac{1}{2}$ **E** 0

334

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(\sin x) - x}{x^3}$$

- A** $1/3$ **B** $1/6$ **C** ∞ **D** -1 **E** $\pi/2$

335

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad a, b, c > 0,$$

- A** $\sqrt[3]{abc}$ **B** nu există **C** $\ln abc$ **D** $\frac{a+b+c}{3}$ **E** 1

336

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$$

- A** 1 **B** 0 **C** e **D** \sqrt{e} **E** $\frac{1}{\sqrt{e}}$

337

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

- A** 1 **B** e^2 **C** $e^{\frac{3}{2}}$ **D** $e^{\frac{1}{2}}$ **E** e^3

338

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

- A** $\sqrt[3]{2}$ **B** $\sqrt[3]{e}$ **C** e **D** e^{-1} **E** $e^{\frac{3}{2}}$

339

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + x + 1} \frac{\ln(e^x + x)}{x} \right) \text{ este:}$$

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** $-\frac{1}{2}$ **E** ∞

340

$\lim_{x \rightarrow 0} (a^x + x)^{\frac{1}{\sin x}}$, $a > 0$, este:

- A** ae **B** $e^{\ln a}$ **C** a **D** 1 **E** e^a

341

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x^2)^{\frac{1}{\ln x}}$

- A** 0 **B** e^2 **C** 1 **D** 2 **E** nu există

342

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot (e^{\frac{1}{n+1}} - e^{\frac{1}{n}})$:

- A** -1 **B** 1 **C** $-\infty$ **D** Limita nu există **E** e

343

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2(x) + \operatorname{tg}^2(2x) + \dots + \operatorname{tg}^2(nx))^{\frac{1}{n^3 x^2}} \right)$ este:

- A** $e^{\frac{1}{3}}$ **B** e^3 **C** $\frac{1}{e}$ **D** 1 **E** ∞

344

Dacă $|a| > 1$, atunci limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + a^n}$ are valoarea:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** ∞ **E** limita nu există, pentru $a < -1$

345

Pentru ce valori ale parametrilor reali a și b avem

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 2} - ax - b \right) = 0$?

- A** $a = b = 1$ **B** $a = b = -1$ **C** $a = 2, b = 1$ **D** $a = 1, b = 2$ **E** $a = 2, b = \frac{3}{2}$

Se consideră funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arcsin(x - \sqrt{1 - x^2})$, unde D este domeniul maxim de definiție.

346

Mulțimea punctelor de continuitate ale funcției este:

- A** $[-1, 1]$ **B** $(-1, 1)$ **C** $(0, 1)$ **D** $[0, 1]$ **E** alt răspuns

347

Mulțimea punctelor de derivabilitate ale funcției este:

- A** $[-1, 1]$ **B** $[0, 1]$ **C** $(0, 1)$ **D** $(0, 1)$ **E** alt răspuns

348

Mulțimea punctelor în care funcția are derivată este:

- A** $[-1, 1]$ **B** $[0, 1]$ **C** $(0, 1)$ **D** $(0, 1)$ **E** alt răspuns

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Ce concluzie se poate trage asupra funcției f dacă:

349

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ și } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- A** f este strict crescătoare **B** f este injectivă **C** f este surjectivă
D f este inversabilă **E** f nu este injectivă

350

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- A** f este descrescătoare **B** f este injectivă **C** f este surjectivă
D f este inversabilă **E** f nu este injectivă

351

f este injectivă.

- A** f este surjectivă **B** f este strict monotonă **C** f are cel puțin două zerouri
D f este inversabilă **E** f este o funcție impară

352

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^x + x)^{n+1} - e^{(n+1)x}}{xe^{nx}}, \quad n > 0, \text{ este:}$$

- A** 1 **B** $n + 1$ **C** 0 **D** ∞ **E** e

353

$$\text{Funcția } f \text{ definită prin } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{nx} + x}{e^{nx} + 1}$$

- A** este definită numai pentru $x \leq 0$ **B** este definită și continuă pe \mathbb{R}
C este definită și derivabilă pe \mathbb{R} **D** este definită pe \mathbb{R} dar nu este continuă pe \mathbb{R}
E este definită numai pentru $x = 0$

354

$$\text{Fie funcția } f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + x}{x^{2n} + 1}.$$

Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- A** f nu e bine definită pe $(-\infty, -1)$ căci limita nu există. **B** f este continuă în 1.
C singurul punct de discontinuitate este $x = 1$. **D** f are limită în $x = -1$.
E f continuă pe $(-\infty, 1)$.

355

Mulțimea punctelor de continuitate ale funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^{2n}}{1 + x + x^2 + \dots + x^{2n}}$$

este:

- A** \mathbb{R} **B** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ **C** \mathbb{R}^* **D** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ **E** $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

356

Ecuția $x^2 + 1 = me^{-\frac{1}{x}}$, unde m este un parametru real, are trei soluții reale și distincte dacă:

- A** $m = -1$ **B** $m = 2e$ **C** $m = \pi$ **D** $m = 3\sqrt{2}$ **E** $m = 7$

357

Ecuția $m e^{\frac{2}{x-1}} = x$, $m \in \mathbb{R}$, are două rădăcini reale și distincte dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $(0, \infty)$ **B** $(1, \infty)$ **C** $(-\infty, 1)$ **D** $(0, 1)$ **E** $(-1, 1)$

358

Fie funcția $f(x) = \frac{|x^3 - 1|}{ax^2 + bx}$. Valorile numerelor reale a și b pentru care dreapta $y = x + 4$ este asimptotă la ∞ sunt:

- A** $a = 4; b = 1$ **B** $a = 1; b = -4$ **C** $a = -4; b = 1$ **D** $a = 1; b = 4$
E $a = -1; b = -4$

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x+1)^3}{x^2 - x + 1}$.

359

Ecuția tangentei la graficul funcției f în punctul în care graficul funcției intersectează axa Oy este:

- A** $y - 2x + 1 = 0$ **B** $2y - 2x + 1 = 0$ **C** $y - 4x - 1 = 0$ **D** $4y - x + 1 = 0$
E $4y - 4x + 1 = 0$

360

Ecuția normalei la graficul funcției f în punctul în care graficul funcției intersectează axa Oy este:

- A** $2y - 2x + 1 = 0$ **B** $\frac{1}{4}y - 2x + 1 = 0$ **C** $y - x + 1 = 0$ **D** $y + \frac{1}{4}x - 1 = 0$
E $4y - x + 1 = 0$

361

Funcția $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}}$, $x \in (0, \infty)$, admite asimptota oblică de ecuație:

- A** $y = -x - 1$ **B** $y = -x + \frac{1}{2}$ **C** $y = -x + 1$ **D** $y = -x$ **E** $y = x$

362

Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + bx + 2}{x^2 + 2x + c}$, D -domeniul maxim de definiție al lui f . Mulțimea tuturor valorilor $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ pentru care funcția f are o singură asimptotă verticală și graficul lui f nu intersectează asimptota orizontală este:

- A** $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | b \neq 0, c = 1\}$ **B** $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | c = 1\}$
C $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | b = 3, c = 1\}$ **D** $\{(b, c) \in \mathbb{R}^2 | c = 1, b = 2 \text{ sau } c = 1, b = 3\}$
E nici unul din răspunsurile anterioare nu e corect

363

Graficul funcției $f : \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x - 3}$ admite:

- A** o asimptotă verticală și una orizontală **B** o asimptotă verticală și una oblică
C o asimptotă orizontală și una oblică **D** o asimptotă verticală și două oblice
E o asimptotă verticală și două orizontale

Fie $f : [0, \infty) \setminus \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{mx-3}{x^2-3x+2}$, unde m este un parametru real.

364 Numărul asimptotelor funcției f este:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4
E numărul asimptotelor depinde de m .

365 Numărul valorilor întregi ale parametrului m pentru care f are trei puncte de extrem este:

- A** infinit **B** 4 **C** 3 **D** 2 **E** 1

366

Valorile lui $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(m-1)^2 x^2 + 1}}{3x+2} = -1$ sunt:

- A** -2, 4 **B** -1, 3 **C** 2, 3 **D** -1, 4 **E** -2, 2

367

Funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x-a}{x^2-b}$, $a, b \in \mathbb{R}$, are pe domeniul maxim de definiție două asimptote verticale dacă și numai dacă:

- A** $a = b = 0$ **B** $a = 1, b = -1$ **C** $a = b = 1$ **D** $a = 2, b = 1$ **E** $b > 0, a^2 \neq b$

368

Abscisele punctelor în care graficele funcțiilor $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = x^6 \quad \text{și} \quad g(x) = 2x^5 - 2x - 1$$

sunt tangente sunt:

- A** $\frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$ **B** $\frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$ **C** $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ **D** nu există **E** 0

369

Egalitatea

$$\arctg a + \arctg b = \arctg \frac{a+b}{1-ab}$$

are loc dacă și numai dacă numerele reale a și b satisfac condiția:

- A** $ab > 1$ **B** $ab < 1$ **C** $ab \neq 1$ **D** $ab > 0$ **E** $b = 0, a \in \mathbb{R}$

370

Numărul de valori ale parametrului real $a \in [0, 1]$ pentru care funcția $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - |x - a|$, este convexă pe $[0, 1]$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** infinit

371

Fie $Q(x)$ câtul împărțirii polinomului $P(x) = 99(x^{101} - 1) - 101x(x^{99} - 1)$ la $(x - 1)^3$. Valoarea $Q(1)$ este:

- A** 9999 **B** 18000 **C** 5050 **D** 3333 **E** alt răspuns

372

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă și sunt verificate condițiile:
 $f(0) = 2$, $f'(x) = 3f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Valoarea $f(\ln 2)$ este:

- A** 2 **B** 4 **C** 6 **D** 16 **E** 32

373

Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru orice funcție $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ care are derivată strict pozitivă?

- A** f este crescătoare pe $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **B** f este crescătoare pe $(0, \infty)$
C f este descrescătoare **D** f este mărginită **E** f este convexă

374

O funcție polinomială neconstantă $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, este strict crescătoare dacă și numai dacă:

- A** $P'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ **B** $P'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ **C** $P'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
D $P''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ **E** $P''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Se consideră funcția $f: [-2, 1] \rightarrow M$, $M \subset \mathbb{R}$, $f(x) = |x^3 + x^2|$.

375

Numărul punctelor de extrem ale funcției f este:

- A** 5 **B** 3 **C** 2 **D** 1 **E** 4

376

f este surjectivă pentru M egal cu:

- A** $[0, 4]$ **B** $[0, \infty)$ **C** $[0, 2]$ **D** $[0, 27]$ **E** \mathbb{R}

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2019)$ și fie $g = f \circ f \circ f$.

377

$f'(0)$ este:

- A** 2019! **B** 0 **C** 2018! **D** 2019! + 2018! **E** 2019! - 2018!

378

$g'(0)$ este:

- A** 2019!³ **B** 2019³ **C** 2019² **D** 2019!² **E** 2019!

379

Numărul punctelor de extrem ale funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ este:

- A** 9 **B** 7 **C** 5 **D** 3 **E** alt răspuns

380

Să se studieze derivabilitatea funcției $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}$.

- A** f derivabilă pe $(2, \infty)$ **B** f are în $(5, 0)$ punct de întoarcere
C f are în $(5, 0)$ punct unghiular **D** f este derivabilă în $x = 5$
E f este derivabilă numai pe $(5, \infty)$

381

Dacă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[5]{\frac{1}{6}x^3 - x + \sin x}$, atunci $f'(0)$ este:

- A** $1/\sqrt[5]{120}$ **B** $-1/\sqrt[5]{120}$ **C** ∞ **D** nu există **E** $-\infty$

382

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

- A** f nu e continuă în 0 **B** f este derivabilă în 0 **C** f nu are limită în 0
D $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ **E** f are limită la $+\infty$, egală cu 1, și la $-\infty$, egală cu -1

383

Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + \arcsin \frac{1}{x}$, unde D este domeniul maxim de definiție al funcției f . Mulțimea valorilor funcției f este:

- A** $(-\infty, \frac{\pi}{2}]$ **B** \mathbb{R} **C** $(-\frac{\pi}{2}, \infty)$ **D** $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ **E** $(-\infty, -\frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2}, \infty)$

Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + \sqrt{|x|} - x)$, unde D este domeniul maxim de definiție.

384

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** e **E** ∞

385

$f'(\frac{1}{4})$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $-\frac{1}{2}$

386

Numărul punctelor de extrem local ale funcției f este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

387

Valoarea lui a pentru care funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x|x - a|$, este derivabilă pe \mathbb{R} este:

- A** $a = 1$ **B** $a = -1$ **C** $a = 0$ **D** $a = 2$ **E** $a = -2$

388

Fie g și h două funcții derivabile pe \mathbb{R} și $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = g(x)|h(x)|$. Dacă $h(x_0) = 0$, atunci funcția f este derivabilă în x_0 dacă și numai dacă:

- A** $h'(x_0) = 0$ **B** $g(x_0) > 0$ **C** $g(x_0) = 0$ **D** $g(x_0)h'(x_0) = 0$ **E** alt răspuns

389

Funcția $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{x^2 + b}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x^2 - 3x + 3) + 2x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, unde $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$, este o funcție derivabilă pentru:

- A** $a = 6, b = 2$ **B** $a = 8, b = 3$ **C** $a = 8, b = 30$ **D** $a = 10, b = 4$ **E** $a - 2b = 1$

390

Derivata funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[6]{x^2}$, în punctul zero, este:

- A** ∞ **B** 0 **C** $1/3$ **D** 1 **E** nu există

391

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x$. Valoarea lui $(f^{-1})'(3)$ este:

- A** 1 **B** -1 **C** $\frac{1}{3}$ **D** -2 **E** $\frac{1}{5}$

392

Fie funcția $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x - 1}$, unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Valorile lui α și β pentru care f admite un extrem în punctul $M(0, 1)$ sunt:

- A** $\alpha = 1, \beta = -1$ **B** $\alpha = 0, \beta = 1$ **C** $\alpha = \beta = 2$ **D** $\alpha = 3, \beta = -1$
E $\alpha = -1, \beta = 1$

393

Se consideră funcția $f : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -\ln(x^2 + x + 1) & ; -1 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x|x^2 - 4|} & ; x > 0 \end{cases}.$$

Notăm cu α numărul punctelor de extrem, cu β numărul punctelor unghiulare și cu γ numărul punctelor de întoarcere ale funcției f . Atunci:

- A** $\alpha = 5, \beta = 0, \gamma = 2$ **B** $\alpha = 5, \beta = \gamma = 1$ **C** $\alpha = 5, \beta = 2, \gamma = 0$
D $\alpha - \beta = 4, \beta - \gamma = 1$ **E** $\alpha = 4, \beta = 0, \gamma = 2$

394

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 + x^2) - x$. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

- A** f e strict pozitivă pe \mathbb{R} **B** f e strict crescătoare pe \mathbb{R}
C f e strict negativă pe \mathbb{R} **D** f verifică inegalitatea $f(x) > 0, \forall x \in (-\infty, 0)$
E f verifică inegalitatea $f(x) > 0, \forall x \in (0, \infty)$

395

Derivata de ordinul 100, $(x^{99} \ln x)^{(100)}$, $x > 0$, este:

- A** $100!x$ **B** $\frac{100!}{x}$ **C** $-100!x$ **D** $99!x$ **E** $\frac{99!}{x}$

396

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 4$. Valoarea lui $(f^{-1})'(4)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{4}$ **D** $\frac{1}{116}$ **E** $\frac{1}{68}$

397

Dacă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție cu derivata de ordinul al doilea continuă astfel încât $f(2) = f'(2) = f''(2) = 2$, iar funcția $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este definită prin $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 3})$, atunci:

- A** $g(1) = g'(1) = 2$ **B** $g'(1) = \sqrt{2}$ **C** $g(1) + g''(1) \in \mathbb{N}$ **D** $g'(1) = g''(1) = 1$
E $g'(1) = 1, g''(1) = \frac{5}{4}$

Fie funcția f dată prin $f(x) = \frac{2}{x^2-1}$

398 Mulțimea rădăcinilor derivatei de ordinul doi a funcției este:

- A** $\{0\}$ **B** $\{-1; 0; 1\}$ **C** \emptyset **D** $\{0; 2\}$ **E** $\{0; 1\}$

399 Mulțimea rădăcinilor derivatei de ordinul trei a funcției este:

- A** $\{0\}$ **B** $\{-1; 0; 1\}$ **C** \emptyset **D** $\{0; 2\}$ **E** $\{0; 1\}$

Fie $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două ori derivabilă astfel încât $f''(x) = \frac{1}{x}$, $\forall x > 0$ și $f(1) = f'(1) = 0$.

400 $f'(x)$ are expresia:

- A** $-\frac{1}{x^2}$ **B** $1 - \frac{1}{x^2}$ **C** $\frac{1}{x^2} - 1$ **D** $\ln x$ **E** Alt răspuns

401 $f(x)$ are expresia:

- A** $\frac{2}{x^3}$ **B** $\frac{2}{x^3} - 2$ **C** $x \ln x - x$ **D** $x \ln x + x - 1$ **E** Alt răspuns

402 Numărul soluțiilor reale ale ecuației $\ln x = 1 - \frac{1}{x}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Alt răspuns

Se dă funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^{x^4} + 2^{x^2-1}$.

403 Care este valoarea lui $f(-1)$?

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

404 Care este soluția inecuației $f(x) \leq 3$?

- A** \emptyset **B** $[-1, 1]$ **C** $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ **D** $(-\infty, -1]$ **E** alt răspuns

405 Numărul punctelor de extrem local ale funcției f este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-x^2}$.

406 Suma pătratelor absciselor punctelor de inflexiune ale graficului funcției este egală cu:

- A** 25 **B** 1 **C** $5 + \sqrt{17}$ **D** 5 **E** $5 - \sqrt{17}$

407 Aria mărginită de graficul funcției f' , dreptele $x = -2$, $x = 1$ și axa OX este egală cu:

- A** $\frac{1}{e} - \frac{4}{e^2}$ **B** $\frac{4}{e^2} - \frac{1}{e}$ **C** $\frac{3}{e} - \frac{4}{e^4}$ **D** 1 **E** alt răspuns

408

Funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \alpha x^2 + 1 - \ln(1+x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, are două puncte de extrem local pentru:

- A** $\alpha = -2$ **B** $\alpha = -1$ **C** $\alpha \in (-2, -1)$ **D** $\alpha > 2$ **E** $\alpha < -2$

409

Se dă funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x(x^2 + 6x + m)$, unde m este un parametru real. Funcția f admite puncte de extrem pentru:

- A** $m \in (-\infty, 10]$ **B** $m \in (10, \infty)$ **C** $m \in \mathbb{R}$ **D** $m \in (-\infty, 10)$ **E** $m \in [10, \infty)$

410

Inegalitatea $a^x \geq x + 1$ are loc pentru orice $x \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă:

- A** $a = 1$ **B** $a = e$ **C** $a > 1$ **D** $a > e$ **E** $a < e$

411

Dacă mulțimea soluțiilor ecuației $a^x = x$, cu $a > 1$, are un singur element, atunci:

- A** $a = \frac{1}{e}$ **B** $a = e$ **C** $a = e^{\frac{1}{e}}$ **D** $a = e^e$ **E** $a = \frac{1}{e^e}$

412

Mulțimea valorilor pozitive ale lui a pentru care ecuația $a^x = x + 2$, are două soluții reale este:

- A** $(1, \infty)$ **B** $(0, 1)$ **C** $(\frac{1}{e}, e)$ **D** $(\frac{1}{e^e}, e^e)$ **E** $(e^{\frac{1}{e}}, \infty)$

413

Mulțimea valorilor pozitive ale lui a pentru care inegalitatea $a^x \geq x^a$, are loc pentru orice $x > 0$ este:

- A** $\{e\}$ **B** $(0, 1)$ **C** $(1, \infty)$ **D** $(\frac{1}{e}, 1)$ **E** $(1, e)$

414

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + \sqrt{x^2 + 2x + 2}$ are proprietatea:

- A** este crescătoare pe \mathbb{R} **B** este descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și crescătoare pe $[0, \infty)$
C este impară **D** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$
E graficul funcției f intersectează axa Ox într-un punct.

415

Să se determine un punct $P(x_0, y_0)$ pe curba a cărei ecuație este $y = (x - 2)\sqrt{x}$, $x > 0$, în care tangenta să fie paralelă cu dreapta de ecuație $2y = 5x + 2$.

- A** $P(4, 4)$ **B** $P(9, 21)$ **C** $P(1, -1)$ **D** $P(2, 0)$ **E** $P(3, \sqrt{3})$

416

Ecuația tangentei comune la graficele funcțiilor $f, g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{1}{x}$ este:

- A** $y = -4x - 1$ **B** $y = -x - 4$ **C** $y = -2x - 4$ **D** $y = -4x - 4$
E graficele nu admit tangentă comună

417

Funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sqrt{x^2 + a}$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$ sunt tangente (au o tangentă comună într-un punct comun) dacă:

- A** $a = 1 + e$ **B** $a = 0$ **C** $a = 1$ **D** $a = e - \pi$ **E** $a = -1$

418

Ecuația tangentei la graficul funcției $f(x) = \ln \sqrt{\frac{2x-1}{x+1}}$ în punctul de abscisă $x = 2$ este:

- A** $x - 7y - 2 = 0$ **B** $x - 6y - 2 = 0$ **C** $x - 5y - 2 = 0$ **D** $x - 4y - 2 = 0$
E $x - 3y - 2 = 0$

419

Graficele funcțiilor $f(x) = ax^2 + bx + 2$ și $g(x) = \frac{x-1}{x}$ au tangentă comună în punctul de abscisă $x_0 = 1$ dacă:

- A** $a + b = -1$ **B** $a = 0, b = 1$ **C** $a = 1, b = -2$ **D** $a = 3, b = -5$
E $a = 3, b = -4$

420

Tangenta la graficul funcției $f(x) = (a \sin x + b \cos x)e^x$ în punctul $(0, f(0))$ este paralelă cu prima bisectoare, dacă:

- A** $a = b = 1$ **B** $a = 2, b = 1$ **C** $a - b = 1$ **D** $a + b = 1$ **E** $a^2 + b^2 = 1$

421

Fie x_1 cea mai mică rădăcină a ecuației $x^2 - 2(m+1)x + 3m + 1 = 0$. Atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} x_1$ este:

- A** 1 **B** $\frac{3}{2}$ **C** 0 **D** $-\frac{1}{2}$ **E** -1

422

Mulțimea valorilor paramentului real a pentru care ecuația $ax - \ln|x| = 0$ are trei rădăcini reale distincte este:

- A** $(-\infty, 0)$ **B** $(0, 1)$ **C** $(-e^{-1}, 0) \cup (0, e^{-1})$ **D** (e^{-1}, ∞) **E** \emptyset

Fie funcția $f : (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = 2 \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}.$$

423 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ este:

- A** π **B** 0 **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** -1 **E** ∞

424 Mulțimea valorilor funcției este:

- A** $\{-\pi, 0, \pi\}$ **B** $\{0\}$ **C** \mathbb{R} **D** $(-1, \infty)$ **E** $(0, \infty)$

425

Mulțimea valorilor lui $x \in \mathbb{R}$ pentru care este adevărată egalitatea

$$2 \operatorname{arctg} x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$$

este:

- A** $(0, \infty)$ **B** $(-\infty, -1) \cup [1, \infty)$ **C** $[1, \infty)$ **D** $[-1, 1]$ **E** $[2, \infty)$

Fie $f(x) = \frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{1+x^2} + \operatorname{arctg} |x|$.

426 Domeniul maxim de definiție al funcției este :

- A** $[-1, 1]$ **B** $(-1, 1)$ **C** \mathbb{R} **D** \mathbb{R}^* **E** $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

427 $f(\pi)$ este:

- A** 1 **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** π **D** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** $\frac{\pi}{2}$

428 Funcția este strict descrescătoare dacă și numai dacă x este din:

- A** \mathbb{R} **B** $(-1, 0)$ **C** $(0, 1)$ **D** $(-\infty, -1/5)$ **E** $(-\infty, -1]$

429

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ o funcție care admite primitive și verifică relațiile $\cos f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$ și $|f(\pi) - \pi| \leq \pi$. $f(100)$ este:

- A** 16π **B** 8π **C** 4π **D** 2π **E** 0

430

O primitivă a funcției $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$, este:

- A** $\arccos \sqrt{x}$ **B** $\arcsin \sqrt{x}$ **C** $\arccos \frac{1}{x}$ **D** $\arcsin \frac{1}{\sqrt{x}}$ **E** $\operatorname{arctg} \sqrt{x}$

431

Mulțimea primitivelor funcției $f: \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$, este:

- A** $x \operatorname{ctg} x + \ln \cos x + c$ **B** $-x \operatorname{ctg} x + \ln \cos x + c$ **C** $x \operatorname{tg} x + \ln \cos x + c$
D $-x \operatorname{tg} x - \ln(-\cos x) + c$ **E** $x \operatorname{tg} x + \ln(-\cos x) + c$

432

Mulțimea primitivelor funcției $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin x}$, este:

- A** $x + \operatorname{tg} \frac{x}{2} + c$ **B** $\frac{1}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$ **C** $x + 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + c$ **D** $\frac{2}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$ **E** $x + \frac{2}{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + c$

433

O primitivă a funcției $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$ este:

- A** $\arcsin e^x$ **B** $\arccos e^x$ **C** $\operatorname{arctg} x$ **D** $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1})$ **E** $2\sqrt{e^{2x} - 1}$

434

Mulțimea primitivelor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x + 1}}$ este:

- A** $\ln \frac{\sqrt{e^x + 1} - 1}{\sqrt{e^x + 1} + 1} + c$ **B** $\ln \frac{1}{\sqrt{e^x + 1} + 1} + c$ **C** $2\sqrt{e^x + 1} + c$
D $-\ln(\sqrt{e^{-x} + 1} + e^{-x/2}) + c$ **E** $\ln(\sqrt{e^x + 1} - e^x) + c$

435

Mulțimea primitivelor funcției $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x(x^3 + 1)}$ este:

- A** $\ln x - \ln(x^3 + 1) + c$ **B** $\ln \frac{x^3}{x^3 + 1} + c$ **C** $\frac{1}{3} \ln \frac{x^3}{x^3 + 1} + c$
D $\ln x + \operatorname{arctg} x + c$ **E** $\ln x \ln(x + 1) + c$

436

Mulțimea primitivelor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$ este:

- A** $e^x \operatorname{arctg} x + c$ **B** $e^x(1 + x^2)^{-1} + c$ **C** $\frac{xe^x}{x^2 + 1} + c$ **D** $\frac{x^2 e^x}{x^2 + 1} + c$ **E** $\frac{(x+1)e^x}{x^2 + 1} + c$

437

Mulțimea primitivelor funcției $f: (-\infty, -1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$ este:

- A** $\arccos \frac{1}{x} + c$ **B** $\arcsin \frac{1}{x} + c$ **C** $-\operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} + c$ **D** $\ln \sqrt{x^2 - 1} + c$
E $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + c$

438

Mulțimea primitivelor funcției $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{e^x + \cos x}{e^x + \cos x + \sin x},$$

este:

- A** $\ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$ **B** $x + \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$
C $\frac{x}{2} + \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$ **D** $\frac{1}{2}[x + \ln(e^x + \cos x + \sin x)] + c$
E $\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(e^x + \cos x + \sin x) + c$

439

$$\int_{-2}^0 \frac{x}{\sqrt{e^x + (x+2)^2}} dx \text{ este:}$$

- A** -1 **B** -2 **C** $-e$ **D** $2 - e$ **E** alt răspuns

440

$$\int_0^1 \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

- A** $\frac{5\pi}{6\sqrt{2}}$ **B** $\frac{7\pi}{6\sqrt{2}}$ **C** $\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$ **D** $\frac{4\pi}{3\sqrt{2}}$ **E** $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$;

441

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$
are primitive dacă și numai dacă:

- A** $a = 0$ **B** $a = 1$ **C** $a = -1$ **D** $a > 0$ **E** $a < 0$

442

Fie $F: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ astfel ca: $F'(x) = \frac{1}{x}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$, $F(-1) = 1$ și $F(1) = 0$. Atunci $F(e) + F(-e)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** nu există o astfel de funcție F

Fie F o primitivă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x^2}$.

443

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x F(x)}{e^{x^2}} \text{ este:}$$

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{2}$ **D** ∞ **E** e

444

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x F(x)}{e^{x^2}} \text{ este:}$$

- A** ∞ **B** 1 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 0 **E** e

445

Funcția $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, este continuă în 0 și derivabilă pe \mathbb{R}^* astfel ca

$$F'(x) = \left(\sin \frac{1}{x} \right)^2, \quad x \in \mathbb{R}^*.$$

Derivata $F'(0)$ este:

- A** 0 **B** ∞ **C** 1 **D** nu există **E** alt răspuns

446

Integrala $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{(x+3)\sqrt{x+3}} dx$ este:

- A** $-\frac{1}{16} - \ln \frac{15}{16}$ **B** $\ln 3 - 1$ **C** $\ln \frac{3}{4} - 1$ **D** $-\frac{1}{4} + \arctg \frac{1}{4}$ **E** $\frac{1}{4}$

447

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{dy}{2 + \cos y}$$

- A** 0 **B** nu există **C** $\frac{1}{\sqrt{3}}$ **D** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **E** ∞

448

$$\int_{-5}^5 (2x - 1) \operatorname{sgn} x \, dx$$

- A** 0 **B** -50 **C** 10 **D** 15 **E** 50

449

$$\int_0^2 \frac{2x^3 - 6x^2 + 9x - 5}{(x^2 - 2x + 5)^n} \, dx$$

- A** 1 **B** -1 **C** 0 **D** $\frac{2}{n}$ **E** $\frac{n}{2}$

450

$$\int_0^1 \frac{2}{(1+x^2)^2} \, dx$$

- A** $\frac{\pi}{4} + 1$ **B** $\pi + \frac{1}{2}$ **C** $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ **D** $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}$ **E** $\pi + \frac{1}{4}$

451

$$\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{3-x}} \, dx \text{ este:}$$

- A** $\frac{3}{2}$ **B** $\frac{2}{3}$ **C** $\frac{4}{3}$ **D** $\frac{3}{4}$ **E** $\frac{5}{3}$

452

$$\int_3^8 \frac{dx}{x-1 + \sqrt{x+1}}$$

- A** $\frac{2}{3} \ln \frac{25}{8}$ **B** $\ln 3$ **C** 5 **D** $\sqrt{11}$ **E** $3 \operatorname{arctg} \sqrt{3} - 2$

453

$$\int_{\sqrt{e}}^e \frac{\ln x}{x} \, dx \text{ este:}$$

- A** $\frac{3}{8}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\frac{e}{2}$ **D** $\frac{2}{e}$ **E** $\frac{1}{8}$

454

Dacă funcția polinomială $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ verifică egalitățile:

$$P(1) + \dots + P(n) = n^5, \quad n = 1, 2, \dots, \text{ atunci integrala } \int_0^1 P(x) \, dx \text{ este:}$$

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{1}{4}$ **D** 1 **E** 0

455

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx$$

- A** $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2}$ **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ **D** $\frac{\pi}{2} - 1$ **E** $\frac{\pi}{8} - 2$

456

Să se calculeze $\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx$, unde m și n sunt două numere întregi.

- A** 0 **B** $m\pi$ **C** π **D** 1 **E** $(n+m)\pi$

457

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$$

- A** $\operatorname{arctg} e$ **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** $\operatorname{arctg} e - \frac{\pi}{4}$ **D** 0 **E** $\operatorname{arctg} e + \pi$

458

$$\int_{-1}^1 (1+2x^{2015})e^{-|x|} dx$$

- A** $\frac{4014}{e}(e-1)$ **B** $\frac{4016}{e}(e-1)$ **C** ∞ **D** $\frac{2}{e}(e-1)$ **E** $2006 - \frac{2006}{e}$

459

$$\int_{-1}^2 \min\{1, x, x^2\} dx$$

- A** $\frac{6}{5}$ **B** $\frac{5}{6}$ **C** $\frac{3}{4}$ **D** $\frac{4}{3}$ **E** 0

460

Integrala $\int_1^e \ln x dx$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 0 **D** $e-1$ **E** $e-2$

461

Integrala $\int_1^e \ln^2 x dx$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 0 **D** $e-1$ **E** $e-2$

462

Să se calculeze $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^3 x dx$.

- A** $\frac{1-\ln 2}{2}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{1}{2} \ln 2$ **D** $\ln 2$ **E** 1

463

Soluția ecuației $\int_0^x t e^t dt = 1$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 0 **D** $e-1$ **E** $e-2$

464

$$\int_1^{2e} |\ln x - 1| dx$$

- A** $2 \ln 2$ **B** $2(e \ln 2 - 1)$ **C** $e \ln 2$ **D** 1 **E** $\ln 2 - 1$

465

$$\int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx$$

- A** π **B** $2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ **C** $\frac{2\pi}{3}$ **D** $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ **E** $\frac{\pi}{3} - 2\sqrt{3}$

466

$$\int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx$$

- A** $\frac{3}{2}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** 1 **D** $\frac{5}{2}$ **E** 2

467

Să se calculeze $\int_0^a \frac{(a-x)^{n-1}}{(a+x)^{n+1}} dx$, unde $a > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- A** $\frac{1}{2na}$ **B** $\frac{n}{2a}$ **C** $\frac{a}{2n}$ **D** $2an$ **E** $\frac{2a}{n}$

468

$$\int_{-1}^1 \sin x \ln(2+x^2) dx$$

- A** 0 **B** $\ln 2$ **C** 1 **D** $\frac{\pi}{2}$ **E** $\ln 3$

469

$\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{2} \ln 2$ **C** $\ln 2$ **D** $\frac{1}{4}$ **E** $\frac{1}{4} \ln 2$

470

$\lim_{a \rightarrow 1} \int_0^a x \ln(1-x) dx$, $a \in (0, 1)$:

- A** 0 **B** $-\frac{1}{4}$ **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $-\frac{3}{4}$ **E** -1

471

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 \cos x + 3}$ este:

- A** 0 **B** $\frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}}$ **C** $\operatorname{arctg} \sqrt{5}$ **D** $\operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}}$ **E** $\frac{1}{\sqrt{5}}$

472

$\int_0^{4\pi} \frac{dx}{5 + 4 \cos x}$ este:

A $\frac{4\pi}{3}$

B 0

C $\frac{4}{5}\pi$

D $\frac{5}{4}\pi$

E π

473

Integrala $\int_{\frac{1}{n+2}}^{\frac{1}{n}} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$, $n \in \mathbb{N}^*$ este:

A $\frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}$

B 0

C $3n$

D $\frac{4n}{5n+1}$

E $6n$

474

Valoarea lui $I_n = \int_1^n \frac{dx}{x + [x]}$ este:

A $\ln \frac{2n-1}{2}$

B $\ln \frac{3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n-2)}$

C $\ln 2 - \ln(2n - 1)$

D $\frac{1}{2} \ln x$

E $\frac{1}{2} \ln n$

475

Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci valoarea integralei $\int_0^{\frac{n\pi}{2}} e^{-x} \cos 4x dx$ este:

A $\frac{1}{17}(1 - e^{-\frac{n\pi}{2}})$

B $n\pi$

C $\frac{n\pi}{4}$

D 0

E $e^{\frac{\pi}{2}}$

476

Valoarea expresiei $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin \sqrt{x} dx$ este:

A $\frac{\pi}{8}$

B $\frac{\pi}{3}$

C $\frac{\pi}{5}$

D $\frac{\pi}{7}$

E $\frac{\pi}{2}$

477

Valoarea integralei $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx$ este:

A $1 - \frac{\pi}{4}$

B $\frac{\pi}{4}$

C 1

D 0

E $\frac{\pi}{2}$

478

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$ este:

A $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$

B 2π

C $3\sqrt{3}$

D 0

E 3

479

Fie n un număr natural nenul. Să se calculeze $\int_0^1 \{nx\}^2 dx$, unde $\{a\}$ reprezintă partea fracționară a numărului a .

A 1

B $\frac{1}{n}$

C $\frac{1}{3}$

D $\frac{1}{2}$

E $\frac{1}{4}$

480) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg}^{n+2} x + \operatorname{tg}^n x) dx$, unde $n > 0$, este:

A $\frac{1}{n+1}$ **B** $\frac{1}{n}$ **C** $\pi/4$ **D** $n + \frac{\pi}{4}$ **E** 1

481) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg}^9 x + 5 \operatorname{tg}^7 x + 5 \operatorname{tg}^5 x + \operatorname{tg}^3 x) dx$ este:

A $\frac{24}{25}$ **B** $\frac{\pi}{24}$ **C** $\frac{25}{24}$ **D** $\frac{\pi}{25}$ **E** 1

482) Integrala $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx$ este:

A $\frac{\pi}{4}$ **B** $\frac{\pi}{3}$ **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\frac{1}{3}$ **E** 1

483) $\int_0^{2\pi} \cos^2(nx) dx$, unde n este un număr natural nenul, este:

A 0 **B** π **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** $\frac{\pi}{n}$ **E** $n\pi$

484) Dacă $a \in \mathbb{N}$ și $L(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 [ne^{ax}] dx$, atunci mulțimea soluțiilor inecuației $L(a) \leq e$ este:

A $\{0, 1\}$ **B** $\{1, 2\}$ **C** \emptyset **D** $\{0\}$ **E** \mathbb{N}^*

485) Limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k^2}{8} \arcsin \frac{k}{2n}$ este:

A 0 **B** $\frac{\pi}{3}$ **C** $\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9}$ **D** $\frac{-\pi}{3}$ **E** 1

486) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos^2 x dx$

A $\frac{\pi^2}{4}$ **B** $\frac{\pi^2-4}{16}$ **C** $\frac{\pi^2}{4} - 1$ **D** $\frac{\pi}{2}$ **E** alt rezultat

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $f(a) = \int_0^1 |x - a| dx$.

487 Valoarea $f(2)$ este:

- A** $-\frac{5}{2}$ **B** 0 **C** $\frac{x^2}{2} - 1$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{3}{2}$

488 Valoarea $f'(2)$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** x **D** $-\frac{1}{2}$ **E** $\frac{3}{2}$

489 Valoarea minimă a funcției este:

- A** 0 **B** $\frac{1}{4}$ **C** $\frac{1}{6}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $-\frac{1}{4}$

490

$\int_0^{\pi} \frac{\sin(2x)}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{4}$ **B** 2 **C** 0 **D** π **E** 1

491

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$

- A** 1 **B** $\frac{1}{3}$ **C** 2 **D** $\frac{2}{3}$ **E** $\frac{4}{3}$

492

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$

- A** 1 **B** $2(\sqrt{2} - 1)$ **C** $2\sqrt{2}$ **D** $2 - \sqrt{2}$ **E** 3

493

$\int_0^{\pi} \arcsin(\sin x) dx$

- A** $\frac{\pi^2}{4}$ **B** $8\pi^2$ **C** 1 **D** 2π **E** $\frac{\pi^2}{2}$

494

$\int_0^{\pi} \arcsin(\cos^3 x) dx$

- A** $\frac{\pi^2}{4}$ **B** 0 **C** 1 **D** $\frac{\pi^2}{8}$ **E** $\frac{\pi^2}{6}$

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x}$, unde $n \in \mathbb{N}^*$ este fixat.

495 Funcția f este o funcție periodică având perioada principală egală cu:

- A** 2π **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** π **D** $\frac{\pi}{4}$ **E** alt răspuns

496 Funcția $f + c$, $c \in \mathbb{R}$, are o primitivă periodică dacă și numai dacă c are valoarea:

- A** π **B** $-\frac{1}{2}$ **C** $-\frac{\pi}{4}$ **D** $-\pi$ **E** 2π

497

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

- A** $\frac{\pi}{12}$ **B** $\frac{\pi}{8}$ **C** $\frac{\pi}{6}$ **D** 0 **E** ∞

498

$$\int_0^{2\pi} \frac{x \sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$$

- A** 0 **B** $\frac{\pi^2}{4}$ **C** $\frac{\pi^2}{2}$ **D** 2π **E** π^2

499

Se consideră funcțiile: $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{x(x^n + 1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$ și fie $F_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva funcției f_n al cărei grafic trece prin punctul $A(1, 0)$. Soluția inecuației $|\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)| \leq 1$ este:

- A** $(0, e]$ **B** $[\frac{1}{\sqrt{e}}, e]$ **C** $[\frac{1}{e}, e]$ **D** $[\frac{1}{e}, \infty)$ **E** \emptyset

500

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x t^2 e^{-t} dt$$

- A** 0 **B** $\ln 3$ **C** 2 **D** 1 **E** ∞

501

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^n \frac{x-1}{x+1} dx$$

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** e **E** ∞

502

Integrala $\int_0^1 \frac{1}{\sin(a+x)\sin(b+x)} dx$, $0 < a < b < 2$, este:

- A** $\ln \frac{\sin(a+1)\sin b}{\sin a \sin(b+1)}$ **B** $\frac{1}{\sin(b-a)} \ln \frac{\sin b}{\sin a}$ **C** $\frac{\ln(ab)}{\sin(b-a)}$ **D** $\frac{\sin(a+1)}{\sin(b+1)}$ **E** alt răspuns

Fie $I_n = \int_0^1 x^{2004} \cos(nx) dx$, $n \in \mathbb{N}$.

503

Limita șirului (I_n) este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** $\cos 1$ **E** nu există

504

Limita șirului $(n I_n)_{n \geq 0}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** $\cos 1$ **E** nu există

Să se calculeze:

505

$$\int_1^2 \frac{x^3 - x - 2}{x^3 e^x} dx;$$

- A** $-\frac{3}{4e^2}$ **B** $\frac{3}{4e^2}$ **C** $\frac{1}{e}$ **D** $\frac{1}{e^2}$ **E** $-\frac{1}{2e^2}$

Fie $I = \int_0^1 \frac{x}{1+x+x^2+x^3} dx$ și $J = \int_0^1 \frac{1+x+x^2}{1+x+x^2+x^3} dx$. Atunci

506

I este:

- A** $\frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}$ **B** $\frac{\pi}{8} + \frac{\ln 2}{4}$ **C** $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$ **D** $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$ **E** $\frac{\pi}{4} + \ln 2$

507

J este:

- A** $\frac{\pi}{8} + \frac{3 \ln 2}{4}$ **B** $\frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}$ **C** $\frac{\pi}{2} + \frac{3 \ln 2}{2}$ **D** $\frac{\pi}{2} - \frac{3 \ln 2}{2}$ **E** $\frac{\pi}{4} - \ln 2$

508

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_n^{n+3} \frac{x^3}{x^6 + 1} dx$$

- A** 0 **B** ∞ **C** 1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** 3

509

Se consideră șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $a_0 = -1$, $a_{n+1} = 2 + \int_{a_n}^1 e^{-x^2} dx$, $n = 0, 1, \dots$

Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată?

- A** $(a_{n+1} - a_n)(a_n - a_{n-1}) \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ **B** $a_n \geq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ **C** $a_n \leq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$
D șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este crescător **E** șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este descrescător

510

Fie $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^3} dt$. Atunci $F'(2)$ este:

- A** $4e^{64}$ **B** e^8 **C** $12e^8$ **D** $3e^2$ **E** $12e^6$

Fie $f_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \int_0^{x^2} t^n \cdot e^t dt$, $n \in \mathbb{N}^*$.

511

$f_1(x)$ este:

- A** $e^{x^2}(x^2 - 1) + 1$ **B** $e^{x^2}(x^2 + 1) + 1$ **C** $e^{x^2}(x^2 + 1) - 1$ **D** $e^{x^2}x^2 + 1$ **E** e^{x^2}

512

$f'_n(1)$ este:

- A** e **B** $2e$ **C** $2e - 1$ **D** $e - 1$ **E** $e + 1$

513

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1)$ este:

- A** e **B** 1 **C** 0 **D** ∞ **E** e^2

514

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_t^{2t} \frac{\ln(1+x)}{\sin x} dx$

- A** ∞ **B** 0 **C** 1 **D** 2 **E** $\frac{\ln 2}{\sin 1}$

515

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 [nx] dx$

- A** 1 **B** ∞ **C** 0 **D** $\frac{1}{2}$ **E** 2

516

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{x^3 + x + 1}}$ este:

- A** $\ln \pi$ **B** 0 **C** 1 **D** $\ln 2$ **E** $\ln 3$

517

Aria domeniului mărginit de axa Ox , curba $y = \ln x$ și de tangenta la această curbă care trece prin origine este:

- A** e **B** $\frac{e}{2} - 1$ **C** $\frac{e}{2}$ **D** $e - 1$ **E** $2e$

518

Aria cuprinsă între axa Ox , dreptele $x = 0$ și $x = \pi$ și graficul funcției $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$,

$f(x) = \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}$ este egală cu:

- A** $\frac{\pi^2}{2}$ **B** $\frac{\pi^2}{6}$ **C** $\frac{\pi^2}{4}$ **D** $\frac{\pi^2}{8}$ **E** $\frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}$

Se consideră integrala $I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx$, unde f este o funcție continuă pe un interval ce conține $[0, 1]$.

519 Are loc egalitatea:

- A** $I = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ **B** $I = \pi \int_0^\pi f(\sin x) dx$ **C** $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$
D $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$ **E** $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$

520 $I_1 = \int_0^\pi \frac{x \sin x dx}{1 + \sin^2 x}$ este:

- A** $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$ **B** $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$ **C** $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 - 2\sqrt{2})$ **D** $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \ln(3 - 2\sqrt{2})$
E $\frac{\pi}{2} \ln(3 + \sqrt{2})$

521

Aria domeniului mărginit de graficul funcției $f : [0, \frac{3\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \cos x},$$

axa Ox și dreptele $x = 0$ și $x = \frac{3\pi}{4}$, este:

- A** $\frac{\pi}{4}$ **B** $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{8}$ **C** 2π **D** $\frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} - 2$ **E** 0

Fie $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inversa funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + e^x$.

522 $g(1)$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** 1 **D** ∞ **E** $\frac{1}{3}$

523 Limita $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{g(e^x)}$ este:

- A** 1 **B** $\frac{1}{2}$ **C** 2 **D** $\frac{3}{2}$ **E** 0

524 Integrala $\int_1^{1+e} g(t) dt$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $e + \frac{1}{2}$ **C** $2e + \frac{3}{2}$ **D** $\frac{3}{2}$ **E** $e + 1$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - e^{-x}$ și fie g inversa lui f .

525 $f'(x)$ are expresia:

- A** $1 + e^x$ **B** $1 + e^{-x}$ **C** xe^{-x} **D** $1 - e^{-x-1}$ **E** e^{-x-1}

526 $g'(-1)$ este:

- A** 0 **B** -1 **C** 2 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{1}{e}$

527 $\int_0^1 f(x) dx$ este:

- A** $\frac{1}{e} - \frac{1}{2}$ **B** $\frac{3}{2} - \frac{1}{e}$ **C** $\frac{1}{2} - \frac{1}{e}$ **D** $\frac{1}{e} - \frac{3}{2}$ **E** $\frac{3}{2} + \frac{1}{e}$

528 $\int_{-1}^{1-1/e} g(x) dx$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** $\frac{3}{2} - \frac{2}{e}$ **D** $\frac{3}{2} + \frac{1}{e}$ **E** $\frac{1}{e} - \frac{1}{2}$

529 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{x^n + (1-x)^n} dx$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{3}{4}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{1}{4}$

530 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{nx}) dx$ este:

- A** 0 **B** e **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\ln 2$ **E** $\frac{1}{3}$

531 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{\ln x}{n \ln n + x \ln x} dx$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{2}$ **D** ∞ **E** $\ln 2$

532 Fie $\{x\}$ partea fracționară a numărului real x . Atunci, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^\pi \{-x\}^n dx$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** alt răspuns

533 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_{2^t}^{3^t} \frac{x}{\ln x} dx$ este:

- A** 0 **B** nu există **C** $\ln \frac{\ln 3}{\ln 2}$ **D** $\ln \frac{3}{2}$ **E** $\frac{\ln 3}{\ln 2}$

534

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-1}^0 (x + e^x)^n dx \text{ este:}$$

- A** e **B** 0 **C** ∞ **D** $1 + e$ **E** $1/2$

535

$$\int_1^3 \frac{\ln x}{x^2 + 3} dx$$

- A** $\frac{\pi \ln 3}{3\sqrt{3}}$ **B** $\frac{\pi \ln 3}{12\sqrt{3}}$ **C** $\frac{\pi \ln 6}{6\sqrt{3}}$ **D** $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ **E** alt răspuns

536

$$\int_0^2 \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 2x + 2} dx$$

- A** π **B** 2π **C** $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ **D** 0 **E** 1

537

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + x + 1} dx$$

- A** $\frac{\pi^2}{6\sqrt{2}}$ **B** $\frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}$ **C** $\frac{\pi^2}{6}$ **D** 0 **E** ∞

538

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{dx}{1 + n^2 \cos^2 x}$$

- A** 0 **B** π **C** ∞ **D** limita nu există **E** alt răspuns

Următoarele enunțuri teoretice pot fi utile pentru rezolvarea unor probleme din culegere.

539

Fie $x_n > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$, astfel ca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^n < 1.$$

Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

540

Fie $f : [0, b-a] \rightarrow (0, \infty)$ o funcție continuă și $a < b$. Atunci

$$\int_a^b \frac{f(x-a)}{f(x-a) + f(b-x)} dx = \frac{b-a}{2}.$$

541

Fie $f : (-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^1 x^n f(x) dx = f(1), \quad -1 < a < 1.$$

542

Fie $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Atunci,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x^n) dx = \int_0^1 f(t) dt.$$

543

Dacă $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă și are perioada $T > 0$, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

544

Fie $a, b > 0$. Dacă $f : [-b, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pară, atunci

$$\int_{-b}^b \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \int_0^b f(x) dx.$$

545

Fie punctele $A(\lambda, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, -1)$. Să se determine λ astfel încât punctul A să se afle pe dreapta determinată de punctele B și C .

- A** 2 **B** 3 **C** $\frac{5}{2}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{2}{3}$

546

Dreptele $4x - y + 2 = 0$, $x - 4y - 8 = 0$, $x + 4y - 8 = 0$ determină un triunghi. Centrul cercului înscris în triunghi este

- A** $(\frac{6}{5}, 0)$ **B** $(\frac{6}{5}, 1)$ **C** $(\frac{5}{6}, 0)$ **D** $(\frac{5}{6}, 1)$ **E** $(\frac{6}{5}, \frac{5}{6})$

547

Triunghiul ABC are latura $[AB]$ pe dreapta $4x + y - 8 = 0$, latura $[AC]$ pe dreapta $4x + 5y - 24 = 0$, iar vârfurile B și C pe axa Ox . Ecuația medianei corespunzătoare vârfului A este:

- A** $2x + 3y = 0$ **B** $3x + 2y = 0$ **C** $5x + y = 9$ **D** $4x + 3y - 16 = 0$
E $x + 4y - 17 = 0$

548

Se dau punctele $A(2, 1)$ și $B(0, -1)$. Ecuația simetricii dreptei AB față de dreapta OA este:

- A** $x + 2y - 1 = 0$ **B** $3x - 7y + 1 = 0$ **C** $2x + y + 5 = 0$ **D** $x + y + 1 = 0$
E $x - 7y + 5 = 0$

549

Fie triunghiul ABC , unde $B(-4, -5)$. Ecuația înălțimii duse din A este $5x + 3y - 4 = 0$. Ecuația dreptei BC este:

- A** $5y - 3x + 13 = 0$ **B** $3x - 5y + 37 = 0$ **C** $y = -5$ **D** $x + y - 2 = 0$ **E** $y - 2x = 3$

550

În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele $A(3, 4)$, $B(-3, -4)$ și $C(3, -4)$. Coordonatele centrului cercului circumscris triunghiului ABC sunt:

- A** (1, 1) **B** (-1, 0) **C** (0, 0) **D** (0, 1) **E** (0, -1)

551

Fie C simetricul punctului $A(-1, -3)$ față de punctul $B(2, 1)$. Care sunt coordonatele punctului C ?

- A** (5, 5) **B** (4, 5) **C** (6, 5) **D** (5, 6) **E** (4, 6)

552

Fie punctele $A(0, 2)$ și $B(3, 3)$. Notăm cu P proiecția punctului $O(0, 0)$ pe dreapta AB . Care sunt coordonatele punctului P ? Care este aria triunghiului OAB ?

- A** $(-\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 3$ **B** $(-\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 6$ **C** $(\frac{3}{5}, -\frac{9}{5}); 3$ **D** $(-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}); 3$ **E** $(-\frac{3}{5}, \frac{9}{5}); 6$

553

Fie $A(0, -1)$, $d_1 : x - y + 1 = 0$ și $d_2 : 2x - y = 0$. Coordonatele punctelor $B \in d_1$ și $C \in d_2$ pentru care dreptele d_1 și d_2 sunt mediane în triunghiul ABC sunt:

- A** (0, 1), (3, 6) **B** (0, 1), (0, 1) **C** (-1, 0), (1, 1) **D** (0, 0), (-1, 1)
E (-1, -1), (1, 1)

554

Fie dreptele

$$(AB) : x + 2y - 1 = 0$$

$$(BC) : 2x - y + 1 = 0$$

$$(AC) : 2x + y - 1 = 0$$

care determină triunghiul ABC . Bisectoarea unghiului B are ecuația:

- A** $x - 3y + 2 = 0$ **B** $x + y - 1 = 0$ **C** $3x - y + 2 = 0$ **D** $x - y + 1 = 0$
E $x - y + 5 = 0$

555

Pentru ce valori ale parametrului α ecuațiile $3\alpha x - 8y + 13 = 0$, $(\alpha + 1)x - 2\alpha y - 5 = 0$ reprezintă două drepte paralele:

- A** $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = \frac{1}{3}$ **B** $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = -\frac{1}{3}$ **C** $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = \frac{2}{3}$
D $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = -\frac{2}{3}$ **E** $\alpha_1 = \frac{1}{2}, \alpha_2 = 3$

556

Se consideră în plan punctele $A(0, 0)$, $B(2, 0)$ și dreapta de ecuație $d : x - 2y + 10 = 0$. Valoarea minimă a sumei $S(M) = MA + MB$, când punctul M parcurge dreapta d este:

- A** 2 **B** 10 **C** $\sqrt{101}$ **D** $\sqrt{98}$ **E** $7\sqrt{2}$

557

Dreapta care trece prin $C(1, 2)$, neparalelă cu AB față de care punctele $A(-1, 1)$ și $B(5, -3)$ sunt egal depărtate, are ecuația:

- A** $3x + y - 5 = 0$ **B** $2x + y - 4 = 0$ **C** $3x + 2y - 6 = 0$ **D** $2x + 3y - 4 = 0$
E $2x + 3y - 6 = 0$

558

Fie punctele $A(1, 1)$, $B(2, -3)$, $C(6, 0)$. Coordonatele punctului D pentru care $ABCD$ este paralelogram sunt:

- A** (4, 4) **B** (5, 4) **C** (3, 5) **D** (3, 3) **E** (4, 5)

559

Raza cercului care trece prin punctele $A(-4, 0)$, $B(4, 4)$, $O(0, 0)$ este:

- A** 6 **B** 7 **C** 8 **D** $2\sqrt{10}$ **E** $3\sqrt{5}$

560

Laturile AB , BC , CA ale triunghiului ABC au respectiv ecuațiile:

$$x + 21y - 22 = 0, \quad 5x - 12y + 7 = 0, \quad 4x - 33y + 146 = 0.$$

Distanța de la centrul de greutate al triunghiului ABC la latura BC este:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Se dau punctele $A(0, 1)$, $B(-1, 0)$, $C(6, 2)$, și $D(1, 1)$.

561

Simetricul punctului C față de dreapta AB este:

- A** $C'(-6, 2)$ **B** $C'(6, -2)$ **C** $C'(-6, -2)$ **D** $C'(1, 7)$ **E** $C'(1, 4)$

562

Coordonatele punctului $M \in AB$ pentru care suma $DM + MC$ este minimă sunt:

- A** (1, -3) **B** (1, 2) **C** (-1, 2) **D** (1, 3) **E** (2, 3)

563

Coordonatele punctului $M \in AB$ pentru care suma $DM^2 + MC^2$ este minimă sunt:

- A** (3, 4) **B** $(\frac{7}{4}, \frac{15}{4})$ **C** (2, 3) **D** $(\frac{7}{3}, 3)$ **E** (3, 5)

Se consideră în planul xOy punctele $S(0, 12)$, $T(16, 0)$ și $Q(x, y)$ un punct variabil situat pe segmentul $[ST]$. Punctele P și R aparțin axelor de coordonate astfel încât patrulaterul $OPQR$ să fie dreptunghi.

564

Ecuația dreptei ST este:

- A** $3x + 4y - 48 = 0$ **B** $-3x - 4y + 12 = 0$ **C** $3y - 4x - 36 = 0$ **D** $3x - y + 12 = 0$
E $y - 4x + 64 = 0$

565

Aria dreptunghiului $OPQR$ este:

- A** $-3x^2 + 12x$ **B** $12x - \frac{3}{4}x^2$ **C** $3x^2 + 12x$ **D** $-4x^2 + 12x$ **E** $48x - \frac{3}{4}x^2$

566

Valoarea maximă a ariei dreptunghiului $OPQR$ este:

- A** 32 **B** 48 **C** 64 **D** 96 **E** 84

Punctul $A(-4, 1)$ este un vârf al pătratului $ABCD$ parcurs în sens trigonometric, căruia îi cunoaștem o diagonală de ecuație $3x - y - 2 = 0$.

567 Aria pătratului $ABCD$ este:

- A** 45 **B** 15 **C** 90 **D** 30 **E** $\frac{45}{2}$

568 Punctul C are coordonatele:

- A** $(4, -1)$ **B** $(5, -2)$ **C** $(6, 1)$ **D** $(\frac{9}{2}, -\frac{7}{2})$ **E** $(\frac{11}{2}, -\frac{1}{2})$

Fie în planul xOy punctele $A(4, 0)$, $B(5, 1)$, $C(1, 5)$, $D(0, 4)$.

569 Patrulaterul $ABCD$ este:

- A** patrulater oarecare **B** trapez isoscel **C** romb **D** dreptunghi
E trapez dreptunghic

570 Aria patrulaterului este

- A** 4 **B** 8 **C** 1 **D** 16 **E** 2

571 Simetricul punctului A față de dreapta BC este punctul de coordonate

- A** $(1, 5)$ **B** $(5, 1)$ **C** $(5, 2)$ **D** $(6, 2)$ **E** $(6, 4)$

572

În sistemul cartezian xOy , o dreaptă variabilă d care conține punctul $A(0, 5)$ intersectează dreptele $x - 2 = 0$ și $x - 3 = 0$ în punctele B , respectiv C . Să se determine panta m a dreptei d astfel încât segmentul BC să aibă lungime minimă.

- A** $m = 0$ **B** $m = -1$ **C** $m \in \mathbb{R}$ **D** $m = 2$ **E** nu există

573

Fie dreapta $\mathcal{D} : x + y = 0$ și punctele $A(4, 0)$, $B(0, 3)$. Valoarea minimă a sumei $MA^2 + MB^2$, pentru $M \in \mathcal{D}$ este:

- A** $\frac{99}{4}$ **B** 25 **C** $\frac{101}{4}$ **D** 26 **E** $\frac{105}{4}$

Se consideră expresia $E(x, y) = x^2 + y^2 - 6x - 10y$.

574 Distanța de la punctul (x, y) la punctul $(3, 5)$ este:

- A** $\sqrt{E(x, y) + 34}$ **B** $\sqrt{E(x, y) - 34}$ **C** $\sqrt{E(x, y)}$ **D** $\sqrt{E(x, y) + 1}$
E alt răspuns

575 Valoarea minimă a lui $E(x, y)$, pentru $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, este:

- A** 0 **B** -34 **C** 34 **D** -1 **E** 1

576 Se consideră mulțimea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}$. Valoarea maximă a lui $E(x, y)$, pentru $(x, y) \in D$, este:

- A** 8 **B** 0 **C** 4 **D** 6 **E** 2

Fie ABC un triunghi. Notăm cu G centrul său de greutate, cu O centrul cercului circumscris, cu H ortocentrul, cu I centrul cercului înscris și $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

577 Punctul M din planul triunghiului ABC pentru care $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ este:

- A** G **B** H **C** I **D** O **E** A

578 Punctul N din planul triunghiului ABC pentru care $a\overrightarrow{NA} + b\overrightarrow{NB} + c\overrightarrow{NC} = \vec{0}$ este:

- A** G **B** H **C** I **D** O **E** A

579 Punctul R din planul triunghiului ABC pentru care $\overrightarrow{RA} + \overrightarrow{RB} + \overrightarrow{RC} = \overrightarrow{RH}$ este:

- A** G **B** H **C** I **D** O **E** A

* * *

580

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(4x) + \cos(\sqrt{2}x)$, are perioada:

- A** 2 **B** 2π **C** $\sqrt{2}\pi$ **D** $\sqrt{2}$ **E** nu este periodică

581

Valoarea lui $\arcsin(\sin 3)$ este:

- A** 3 **B** -3 **C** 0 **D** $\pi - 3$ **E** $-\cos 3$

582

Valoarea lui $\sin 15^\circ$ este:

- A** $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ **B** $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}$ **C** $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{4}$ **D** $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ **E** $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{4}$

Fie numerele complexe $z_k = \cos \frac{2k\pi}{5} + i \sin \frac{2k\pi}{5}$, $k = 1, 2, 3, 4$.

583

Ecuția polinomială ale cărei rădăcini sunt numerele z_k ($k = 1, 2, 3, 4$) este:

- A** $x^4 + 1 = 0$ **B** $x^5 - 1 = 0$ **C** $x^5 + 1 = 0$ **D** $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ **E** $x^4 + x^2 + 1 = 0$

584

Valoarea expresiei $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \frac{8\pi}{5}$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2}$ **D** 1 **E** 2

585

Valoarea expresiei $\cos \frac{2\pi}{5}$ este:

- A** $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ **B** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ **C** $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ **D** $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ **E** 1

586

$\cos x \cos \frac{5\pi}{4} - \sin x \sin \frac{5\pi}{4} = 1$ dacă și numai dacă:

- A** $x \in \{2k\pi - \frac{\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $x \in \{k\pi \pm \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $x \in \{k\pi - \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$
D $x \in \{2k\pi - \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $x \in \{2k\pi \pm \frac{5\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Se consideră funcția $f(x) = \cos^{2n} x + \sin^{2n} x$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $x \in \mathbb{R}$.

587

Mulțimea soluțiilor ecuației $f(x) = 1$ este:

- A** $\{2k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}}$ **B** $\{2k\pi + \frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ **C** $\{k\pi + \frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ **D** $\{k\frac{\pi}{2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ **E** \emptyset

588

Mulțimea valorilor funcției f este

- A** $[0, 1]$ **B** $[-1, 1]$ **C** $[0, \frac{1}{n}]$ **D** $[\frac{1}{2^{n-1}}, 1]$ **E** Alt răspuns

Se consideră ecuația: $(\sin x + \cos x)^n - a \sin x \cos x + 1 = 0$, $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$.

589

Pentru $n = 2$ ecuația are soluție dacă și numai dacă

- A** $a \in [2, 6]$ **B** $a \in (-\infty, -2] \cup [6, \infty)$ **C** $a \in (-2, 6)$ **D** $a \in (-1, 1]$ **E** alt răspuns

590

Pentru $n = 1$ și $a = 3$ mulțimea soluțiilor ecuației este:

- A** $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **B** \emptyset **C** $\{(2k+1)\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{2k\pi - \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$
D $\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{2k\pi + \frac{\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

591

Dacă $x \in (\pi, 2\pi)$ și $\cos x = \frac{7}{25}$, atunci $\sin x$ este:

- A** $-\frac{24}{25}$ **B** $-\frac{7}{8}$ **C** $-\frac{23}{25}$ **D** $\frac{7}{8}$ **E** $\frac{24}{25}$

592

$\operatorname{tg} \frac{\pi}{12}$ are valoarea:

- A** $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ **B** $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ **C** $\frac{\sqrt{3}}{6}$ **D** $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **E** alt răspuns

Fie x_1 și x_2 rădăcinile ecuației $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$.

593

$\operatorname{arctg} x_1 + \operatorname{arctg} x_2$ este:

- A** $\frac{\pi}{2}$ **B** $\frac{\pi}{8}$ **C** $\frac{3\pi}{8}$ **D** $\frac{3\pi}{4}$ **E** $\frac{\pi}{4}$

594

$\operatorname{arctg} x_1 \cdot \operatorname{arctg} x_2$ este:

- A** $\frac{\pi^2}{8}$ **B** $\frac{3\pi^2}{16}$ **C** $\frac{3\pi^2}{64}$ **D** $\frac{3\pi^2}{32}$ **E** $\frac{\pi^2}{16}$

595

Fie $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$ cu proprietatea că $\operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$. Atunci perechea $(\sin x, \cos x)$ este:

- A** $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ **B** $(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ **C** $(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}})$ **D** $(\frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}})$ **E** $(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$

596

Pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$ expresia $(\cos a + \cos b)^2 + (\sin a + \sin b)^2$ este egală cu:

- A** $2 \sin^2(a + b)$ **B** $2 \cos^2(a + b)$ **C** $4 \sin^2 \frac{a-b}{2}$ **D** $4 \cos^2 \frac{a-b}{2}$ **E** 2

597

Oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, suma $\sin^6 x + \cos^6 x$ este egală cu:

- A** $3 - \sin^2 x \cos^2 x$ **B** $1 - 3 \sin^2 2x$ **C** 1 **D** $\frac{2}{3}$ **E** $1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$

598

Dacă $E = \cos^2(a + b) + \cos^2(a - b) - \cos 2a \cdot \cos 2b$ atunci, pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$ are loc egalitatea:

- A** $2E = 1$ **B** $E = 1$ **C** $2E + 1 = 0$ **D** $E = 0$ **E** $E = -1$

599

Dacă numerele reale α și β satisfac egalitatea

$$(\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 2 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2},$$

atunci:

- A** $\alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$ **B** $\alpha - \beta \in \{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\alpha - \beta \in \{(2k + 1)\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
D $\alpha - \beta \in \{\frac{\pi}{2} + 4k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\alpha - \beta \in \{\frac{\pi}{6} + 10k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

600

Numărul $\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8}$ este egal cu:

- A** $\frac{\pi}{12}$ **B** $\frac{\pi}{6}$ **C** $\frac{\pi}{4}$ **D** $\frac{5\pi}{12}$ **E** $\frac{\pi}{2}$

601

Inversa funcției $f : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$, este funcția $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ definită prin:

- A** $f^{-1}(x) = \pi + \arcsin x$ **B** $f^{-1}(x) = \pi - \arcsin x$ **C** $f^{-1}(x) = \arcsin x$
D $f^{-1}(x) = 2\pi - \arcsin x$ **E** $f^{-1}(x) = -\pi + \arcsin x$

602

Egalitatea $\arcsin(\sin x) = x$ are loc pentru:

- A** orice $x \in \mathbb{R}$ **B** orice $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sin x \in (-1, 1)$
C orice $x \in [0, 2\pi)$ **D** \emptyset **E** orice $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

603

Mulțimea valorilor lui $m \in \mathbb{R}$ pentru care expresia

$$E(x) = \sqrt{\cos^4 x + m \sin^2 x} + \sqrt{\sin^4 x + m \cos^2 x}$$

este constantă pe \mathbb{R} este:

- A** $\{0\}$ **B** $\{0, 4\}$ **C** $\{1, 4\}$ **D** $\{-1, 0\}$ **E** \emptyset

604

Valorile minimă m și maximă M ale expresiei $E(x) = \cos^2 x - 4 \sin x$, unde $x \in \mathbb{R}$, sunt:

- A** $m = -1, M = 1$ **B** $m = -5, M = 5$ **C** $m = -4, M = 3$
D $m = -4, M = 4$ **E** $m = -3, M = 3$

605

Mulțimea soluțiilor ecuației $2 \cos^2 x - 11 \cos x + 5 = 0$ este:

- A** \emptyset **B** $\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
D $\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

606

Ecuația $4 \sin^2 x - 4 \sin x + 1 = 0$ are următoarea mulțime de soluții:

- A** $\{(-1)^k \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{(-1)^k \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
D $\{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{4} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

607

Dacă $x \in \mathbb{R}$ și $\sin(\pi \cos x) = \cos(\pi \sin x)$, atunci $\cos 4x$ este:

- A** $-\frac{1}{8}$ **B** $\frac{1}{8}$ **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** 0

Fie $S_n, n \in \mathbb{N}^*$, mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x \sin 2x \dots \sin nx = 1$.

608

S_1 este:

- A** $\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{(-1)^k \frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\}$ **E** \emptyset

609

S_{100} este:

- A** $\{\frac{\pi}{101} + k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{\pi}{101} + 2k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$ **C** \emptyset **D** $\bigsqcup_{n=1}^{100} \{\frac{\pi}{5n} + \frac{k\pi}{n+1}/k \in \mathbb{Z}\}$
E $\{\frac{\pi}{6} + k\pi/k \in \mathbb{Z}\}$

610

Mulțimea soluțiilor ecuației $\cos 2x = \cos x$ este:

- A** $\{\frac{2k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{2k\pi}{7} | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{2k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{2k\pi}{7} | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
E $\{\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

611

Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x = \cos 3x$ este:

- A** $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\}$ **D** $\{-\frac{4k \pm 1}{8}\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
E $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

612

Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin 5x = \sin x$ este:

- A** $\{\frac{k\pi}{5 - (-1)^k} | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{k\pi}{5} | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{k\pi}{10} | k \in \mathbb{Z}\}$
D $\{(-1)^k \arcsin \frac{1}{5} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{(-1)^k \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

613

Ecuația $2 \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 3$ are următoarele soluții în intervalul $[0, \frac{\pi}{2}]$:

- A** $\frac{\pi}{4}$ și $\frac{\pi}{6}$ **B** $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg}(-5)$ **C** $\frac{\pi}{12}$ **D** $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ **E** $\frac{\pi}{4}$ și $\operatorname{arctg} 2$

614

Dacă $\sqrt{3} \sin x + \cos x - 2 = 0$, atunci:

- A** $x = (-1)^k \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ **B** $x = \frac{\pi}{6} + (-1)^k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z};$
C $x = (-1)^k \frac{\pi}{2} + k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ **D** $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z};$ **E** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

615

Ecuația $\sin x + p \cos x = 2p$, $p \in \mathbb{R}$, are soluții pentru:

- A** $|p| > 5$ **B** $p \in [-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$ **C** $|p| > \frac{2}{3}$ **D** $|p| = 3$ **E** $3p^2 > 1$

616

Soluțiile ecuației $-2 \sin^2 x + \cos^2 x + 4 \sin x \cos x - 2 = 0$ sunt:

- A** $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **B** $\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **C** $\operatorname{arctg} \frac{1}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **D**
 $\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **E** $\operatorname{arctg} 1 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

617

Valoarea lui $\cos x$ care verifică ecuația $2 \sin^2 2x - 2 \sin x \sin 3x = 4 \cos x + \cos 2x$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** 0

618

Următoarea mulțime reprezintă soluția ecuației $\sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x = \frac{3}{2}$:

- A** $\{(-1)^k \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\}$
C $\{\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{\pm \frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

619

Mulțimea tuturor valorilor $x \in \mathbb{R}$ care verifică egalitatea

$$3(\cos^4 x + \sin^4 x) - 2(\sin^6 x + \cos^6 x) = 1$$

este:

- A** \emptyset **B** \mathbb{R} **C** $\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{2k\pi | k \in \mathbb{N}\}$

620

Mulțimea soluțiilor ecuației

$$\left(\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} - \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}} \right) \left(\sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} - \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \right) = -4$$

este:

- A** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi)$ **C** $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ((2k - 1)\frac{\pi}{2}, k\pi)$
D $\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

621

Fie $x \in \mathbb{R}$. Valoarea expresiei

$$\left(\sin x - 2\sqrt[3]{\sin x \cos^2 x} \right)^2 + \left(\cos x - 2\sqrt[3]{\sin^2 x \cos x} \right)^2$$

este:

- A** 1 **B** 2 **C** $\sin x + \cos x$ **D** $\sin^3 x + \cos^3 x$ **E** $\sqrt[3]{\sin x} + \sqrt[3]{\cos x}$

622

Ecuația $\cos^4 x - \sin^4 x = 1 + \sin 2x$ are următoarea mulțime de soluții:

- A** \emptyset **B** $\{\frac{\pi}{6} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{3\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
E $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

623

Egalitatea $\max(\sin x, \cos x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ este adevărată dacă și numai dacă:

- A** $x \in \{\frac{\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $x \in \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $x \in \{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\}$
D $x \in \{\frac{11\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$
E $x \in \{\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

624

Mulțimea soluțiilor ecuației $4 \sin x \cos^3 x - 4 \sin^3 x \cos x = 1$ este:

- A** $\{(-1)^k \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{8} | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\}$
E $\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4} | k \in \mathbb{Z}\}$

625

Soluția ecuației $2 \arcsin x = \arccos 2x$ este:

- A** $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** $\frac{\pi}{6}$ **D** $\sqrt{2} - 1$ **E** $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

626

Mulțimea tuturor valorilor parametrului real m pentru care ecuația

$(\sin x - m)^2 + (2m \sin x - 1)^2 = 0$ are soluții este:

- A** $[-1, 1]$ **B** $\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\}$ **C** $\{-1, 0, 1\}$ **D** $[-\frac{1}{2}, 0) \cup (0, \frac{1}{2}]$ **E** $\{\frac{1}{2}\}$

627

Dacă S este mulțimea soluțiilor ecuației $(1 - \cos x)^4 + 2 \sin^2 x^2 = 0$, atunci:

- A** $S = \emptyset$ **B** $S \cap \mathbb{Q} = \emptyset$ **C** $S = \{\pi\}$ **D** $S = \{0\}$ **E** $S = \{0, 2\pi\}$

628

Ecuția $\sin x + \cos 2x = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă:

- A** $m \in [0, \frac{9}{8}]$ **B** $m = 1$ **C** $m = -3$ **D** $m < -2$ **E** $m \in [-2, \frac{9}{8}]$

629

Mulțimea tuturor valorilor parametrului real m pentru care ecuația $\cos^2 x + (m + 1) \sin x = 2m - 1$ are soluții este:

- A** $[1, 2]$ **B** \emptyset **C** $\{0\}$ **D** $[0, 2]$ **E** $[3, \infty)$

630

Ecuția $\sin^6 x + \cos^6 x = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă:

- A** $m \leq 2$ **B** $\frac{1}{4} \leq m \leq 1$ **C** $m = 1$ **D** $0 \leq m \leq 2$ **E** $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$

631

Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x + \sin 2x = 2$ este:

- A** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{k\pi}{3} | k \in \mathbb{Z}\}$
D $\{\arcsin \frac{1}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** \emptyset

Se consideră funcția $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3 \cos^2 x - 4 \sin x$.

632

Soluția ecuației $f(x) = \frac{1}{4}$ este:

- A** $\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$ **B** $\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\}$ **C** $\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\}$ **D** $\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\}$ **E** $\{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}$

633

Valoarea maximă a funcției f este:

- A** -1 **B** $\frac{13}{3}$ **C** 3 **D** $\frac{11}{3}$ **E** $\frac{14}{3}$

634

Mulțimea valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție este:

- A** $[-4, \frac{13}{3}]$ **B** $[-3, \frac{11}{3}]$ **C** $[-4, \frac{14}{3}]$ **D** $[-3, \frac{13}{3}]$ **E** $[-4, \frac{11}{3}]$

635

Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 5$ este:

- A** 2 **B** 1 **C** 0 **D** 3 **E** 4

636

Să se arate că dacă $a = 41$, $b = 28$ și $c = 15$, atunci triunghiul ABC este:

- A** dreptunghic **B** ascuțitunghic **C** obtuzunghic **D** isoscel **E** echilateral

637

Să se determine unghiurile A și C ale triunghiului ABC dacă $a = \sqrt{2}$, $b = 2$, $B = \frac{\pi}{4}$.

- A** $A = \frac{\pi}{4}$, $C = \frac{\pi}{2}$ **B** $A = \frac{\pi}{6}$, $C = \frac{7\pi}{12}$ **C** $A = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{5\pi}{12}$
D $A = \frac{7\pi}{12}$, $C = \frac{\pi}{6}$ **E** $A = \frac{5\pi}{12}$, $C = \frac{\pi}{3}$

638

În triunghiul ABC avem $BC = 4$, $m(\hat{A}) = 60^\circ$, $m(\hat{B}) = 45^\circ$. Atunci AC are lungimea:

- A** $\frac{\sqrt{6}}{3}$ **B** $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ **C** $\sqrt{6}$ **D** $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ **E** $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

Fie $z = \left(1 + \frac{2i}{1-i}\right)^{2005}$.

639

Valoarea lui z este:

- A** 1 **B** $2i$ **C** $-i$ **D** i **E** $-2i + 1$

640

Modulul lui $z + i$ este:

- A** $\sqrt{2}$ **B** 2 **C** 1 **D** $\sqrt{3}$ **E** $\sqrt{5}$

641

Valoarea expresiei $2z + \bar{z}$ este

- A** $-i$ **B** $-2i$ **C** $2i + 3$ **D** 3 **E** i

Fie $x = \frac{1}{4}(\sqrt{3} + i)$. Atunci:

642

x^{2004} este

- A** $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2^{2005}}$ **B** $-\frac{1}{2^{2004}}$ **C** 0 **D** $\frac{1}{2^{2004}}$ **E** $\frac{\sqrt{3}+i}{2^{2005}}$

643

x^{2008} este

- A** $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2^{2009}}$ **B** $-\frac{1}{2^{2008}}$ **C** 0 **D** $\frac{1}{2^{2008}}$ **E** $\frac{\sqrt{3}+i}{2^{2009}}$

644

Dacă $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ și $S = \{z \in \mathbb{C} \mid (z+i)^n = (z-i)^n\}$, atunci:

- A** S are n elemente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$;
B $S = \{(-1)^{n-1} + \operatorname{tg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n; k \in \mathbb{N}; k \neq \frac{n}{2}\}$
C $S = \{(-1)^{n-1} + \operatorname{ctg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n-1; k \in \mathbb{N}\}$
D $S = \{\operatorname{ctg} \frac{k\pi}{n} \mid 1 \leq k \leq n-1; k \in \mathbb{N}\}$
E $S \cap \mathbb{R}$ are cel mult două elemente, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

645

Fie triunghiul ABC pentru care $\operatorname{tg} \frac{A}{2} = \frac{a}{b+c}$. Atunci triunghiul este:

- A** echilateral **B** dreptunghic cu $A = \frac{\pi}{2}$ **C** dreptunghic cu $B = \frac{\pi}{2}$ sau $C = \frac{\pi}{2}$
D ascuțitunghic **E** obtuzunghic

646

Fie $z = \frac{(\sqrt{3} + i)^n}{(\sqrt{3} - i)^m}$, $m, n \in \mathbb{N}$. Să se determine relația dintre m și n astfel încât z să fie real.

- A** $n - m = 6k, k \in \mathbb{N}$ **B** $n + m = 3k, k \in \mathbb{N}$ **C** $n - m = 3k, k \in \mathbb{Z}$ **D** $n - m = 0$
E $n + m = 6k, k \in \mathbb{N}$

647

Numărul $E = (\cos \alpha - i \sin \alpha)(\cos 5\alpha + i \sin 5\alpha)$ este real pentru

- A** $\alpha = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z};$ **B** $\alpha = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z};$ **C** $\alpha = k\pi, k \in \mathbb{Z};$
D $\alpha = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z};$ **E** $\alpha = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$

Fie numărul complex $u = 2 + 2i$.

648

Forma trigonometrică a numărului complex u este:

- A** $u = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$ **B** $u = \sqrt{8}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ **C** $u = 2\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4})$
D $u = \sqrt{8}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$ **E** $u = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$

649

u^{100} este:

- A** 2^{100} **B** $2^{100}i$ **C** $-2^{150}i$ **D** -2^{150} **E** -2^{200}

650

Fie mulțimea $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq |z - i| \text{ și } |z - u| \leq 1\}$. Modulul lui $z \in A$ pentru care argumentul lui z este minim este:

- A** 3 **B** $\sqrt{8}$ **C** $\sqrt{7}$ **D** 1 **E** $\sqrt{6}$

Se consideră numerele complexe

$$z_1 = \sin a - \cos a + i(\sin a + \cos a), \quad z_2 = \sin a + \cos a + i(\sin a - \cos a).$$

651

Mulțimea valorilor lui a pentru care numărul complex $w = z_1^n + z_2^n$ are modulul maxim este:

- A** $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{\frac{2k\pi}{n} | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** $\{\frac{k\pi}{n} | k \in \mathbb{Z}\}$ **E** alt răspuns

652

Mulțimea valorilor lui a pentru care $z_1 + z_2 \in \mathbb{R}$ este:

- A** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **B** $\{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ **C** $\{k\pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ **D** \emptyset **E** $\{2k\pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

653

Valorile lui n pentru care $z_1^n z_2^n, n \in \mathbb{N}^*$, este real și pozitiv sunt:

- A** $n = 5$ **B** $n = 4k, k \in \mathbb{N}^*$ **C** $n = 8k + 1, k \in \mathbb{N}^*$ **D** $n = 0$ **E** $n = 8k + 2, k \in \mathbb{Z}$

Pentru n și k numere naturale nenule cu n fixat, notăm $a_k = \cos \frac{2k\pi}{n} - 2 + i \sin \frac{2k\pi}{n}$.

654

Valoarea $\overline{a_n}$ este:

- A** 1 **B** i **C** -1 **D** 0 **E** $-i$

655

Valoarea sumei $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, $n > 1$, este:

- A** $-2n$ **B** $2n$ **C** $1 - 2^n$ **D** $ni - 2n$ **E** $i + 2n$

656

Valoarea produsului $a_1 a_2 \dots a_n$ este:

- A** $2^n - 1$ **B** $(-1)^{n-1}(2^{n+1} - 1)$ **C** $(2n - 1)(-1)^n$ **D** $(-1)^n(2^n - 1)$ **E** 0

657

Să se calculeze expresia $E = (\sqrt{3} - i)^8 (-1 + i\sqrt{3})^{11}$:

- A** $E = 2^{11}$; **B** $E = 2^{19}$; **C** $E = 2^{15}$; **D** $E = 2^5$; **E** 2^7

658

Dacă $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \alpha$, atunci expresia $E = z^n + z^{-n}$ are, pentru orice $n \in \mathbb{Z}$ și pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$, valoarea:

- A** $z i \sin n\alpha$ **B** $\cos n\alpha + i \sin n\alpha$ **C** $\operatorname{tg} n\alpha$ **D** $2 \cos n\alpha$ **E** $\sin n\alpha + \operatorname{tg} n\alpha$

659

Câte rădăcini complexe are ecuația $z^3 = \bar{z}$?

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

660

Câte rădăcini complexe are ecuația $z^{n-1} = i\bar{z}$, $n > 2$, $n \in \mathbb{N}$?

- A** $n - 2$ **B** $n - 1$ **C** n **D** $n + 1$ **E** $n + 2$

661

Fie numărul complex $z = \left(\frac{\sqrt{3} - i}{1 + i}\right)^{12}$. Este adevărată afirmația

- A** $z = 2^6$ **B** $\arg z = \pi$ **C** $|z| = 2^{12}$ **D** $z = 64i$ **E** $\arg z = 2\pi$

Exemplu Test Admitere

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 9, & x < 0, \\ 2x + 9, & x \geq 0. \end{cases}$

662 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ este:

A 10

B $\frac{35}{4}$

C 9

D -9

E 2

663 Valoarea inversei funcției f în punctul 8 este:

A -3

B -1

C 1

D 3

E f nu este inversabilă

Fie a o rădăcină a ecuației $x^2 + x + 1 = 0$.

664 a^3 este:

A 0

B 1

C i

D $1 + i\sqrt{3}$

E -1

665 $(1 + a)^{2016} + (1 + \bar{a})^{2016}$ este:

A -1

B $1 + i\sqrt{3}$

C 2

D 1

E i

Se consideră sistemul de ecuații

$$\begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y + az = b \end{cases}$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$.

666 Sistemul are soluție unică dacă și numai dacă:

- A** $a \neq -2$ **B** $a \neq 0$ **C** $a \neq 2$ **D** $a > 0$ **E** $a \leq 0$

667 Sistemul are o infinitate de soluții dacă și numai dacă:

- A** $a = b = 1$ **B** $a = -2, b = 0$ **C** $a = 2, b = 1$ **D** $a = -1, b = 1$ **E** $a = -2, b = -2$

Pe \mathbb{R} se consideră legea de compoziție $x * y = ax + ay - xy$, $x, y \in \mathbb{R}$, unde a este un parametru real.

668 Mulțimea valorilor lui a pentru care legea este asociativă este:

- A** $[0, \infty)$ **B** \mathbb{R} **C** $\{-1, 0, 1\}$ **D** $\{0, 1\}$ **E** $[0, 1]$

669 Mulțimea valorilor lui a pentru care intervalul $[0, 1]$ este parte stabilă a lui $(\mathbb{R}, *)$ este:

- A** $[\frac{1}{2}, 1]$ **B** $[0, \frac{1}{2}]$ **C** $[0, 1]$ **D** $[1, \infty)$ **E** \mathbb{R}

670 Mulțimea perechilor $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pentru care $(\mathbb{R} \setminus \{b\}, *)$ este grup este:

- A** $\{(0, 0), (1, 0)\}$ **B** $\{(0, 0), (1, 1)\}$ **C** $\{(0, 0), (0, 1)\}$ **D** $\{(-1, 0), (1, 0)\}$
E $\{(-1, -1), (1, 0)\}$

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$.

671 A^2 este:

- A** 0_2 **B** I_2 **C** A **D** $I_2 + A$ **E** $-A$

672 Numărul soluțiilor din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ale ecuației $X^{25} = A$ este:

- A** 2 **B** 0 **C** 10 **D** 25 **E** ∞

Se consideră polinomul $P = X^3 + X^2 + aX + b \in \mathbb{Z}[X]$.

673 Perechea (a, b) pentru care $x = 1$ este rădăcina dublă a polinomului P este:

- A** $(5, 3)$ **B** $(5, -3)$ **C** $(3, 5)$ **D** $(-5, 3)$ **E** $(0, 0)$

Să se calculeze integralele:

674 $\int_0^1 |2x - 1| dx$

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{4}$ **D** 2 **E** $\frac{1}{2}$

675 $\int_0^{2\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx$

- A** 0 **B** π **C** π^2 **D** $2\pi^2$ **E** $4\pi^2$

Să se calculeze:

676 $\int_{-1}^1 \frac{2x + 2}{x^2 + 1} dx$

- A** $\frac{\pi}{4}$ **B** 0 **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** π **E** $\ln 2 + \pi$

677 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \operatorname{arctg} x \cdot \cos(nx) dx$

- A** ∞ **B** 1 **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** π **E** 0

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{|x^2 - 4|}$.

678 Mulțimea de derivabilitate a funcției f este:

- A** $\mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$ **B** \mathbb{R} **C** \emptyset **D** $\{-2, 2\}$ **E** $(-2, 2)$

679 Numărul punctelor de extrem local a lui f este:

- A** 0 **B** 3 **C** 1 **D** 2 **E** 4

680 Numărul asimptotelor lui f este:

- A** 1 **B** 0 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Să se calculeze limitele:

681

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 3n + 2}$$

A 0

B 1

C 2

D 3

E $\frac{2}{3}$

682

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

A 0

B 1

C $\sqrt{2}$

D 2

E nu există

683

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sin n}{n + \sin n}$$

A 0

B 1

C nu există

D $\frac{1}{2}$

E ∞ .

684

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+3)!}{n!n^3} \right)^n$$

A e

B e^2

C e^4

D e^6

E ∞

685

$$\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x$$

A 0

B 1

C e

D ∞

E nu există

Se consideră punctul $A(-1, 1)$ și dreapta $(d) : x - y = 2$.

686

Simetricul punctului A față de origine este:

A (1, 1)

B (-1, -1)

C (1, -1)

D (2, -1)

E (-1, 2)

687

Distanța de la punctul A la dreapta (d) este:

A $\sqrt{2}$

B 2

C $3\sqrt{2}$

D $2\sqrt{2}$

E 1.

688

Simetricul punctului A față de dreapta (d) este:

A (1, -1)

B (2, -2)

C $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$

D $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

E (3, -3)

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^2 x + 4 \cos x$.

689

$f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ este:

A $\frac{11}{4}$

B $\frac{5}{2}$

C π

D 0

E $\frac{1}{2}$

690

Valoarea maximă a lui f este:

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

691

Ecuția $f(x) = m$, $m \in \mathbb{R}$, are soluții dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

A $[0, 1]$

B $[-1, 1]$

C $[-4, 4]$

D $[-2, 0]$

E $[0, 3]$

* * *

692

Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care $x^2 + 2x + m \geq 0$ pentru orice x real este:

- A** $(1, \infty)$ **B** $[1, \infty)$ **C** $[0, \infty)$ **D** \mathbb{R} **E** \emptyset

693

Mulțimea soluțiilor ecuației $\frac{2 \lg(x-2)}{\lg(5x-14)} = 1$ este:

- A** \emptyset **B** $\{3, 6\}$ **C** $\{4\}$ **D** $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ **E** $\{6\}$

694

$\sin^2 \frac{\pi}{3} + \cos^2 \frac{\pi}{3}$ este:

- A** $\sqrt{2}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{1}{3}$ **D** 1 **E** $\sqrt{3}$

695

Numărul soluțiilor din intervalul $[0, 2\pi]$ ale ecuației $\sin x = \cos x$ este:

- A** 4 **B** 0 **C** 1 **D** 3 **E** 2

696

Valoarea minimă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$, este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{4}$ **C** $\frac{3}{4}$ **D** $\frac{1}{3}$ **E** 0

Se consideră punctele $A(0, 3)$, $B(1, 0)$ și $C(6, 1)$.

697 Coordonatele mijlocului segmentului AC sunt:

- A** (2, 2) **B** (3, 2) **C** (3, 4) **D** (3, 3) **E** (4, 3)

698 Coordonatele punctului D pentru care $ABCD$ este paralelogram sunt:

- A** (5, 4) **B** (5, 5) **C** (4, 4) **D** (6, 4) **E** (2, 4)

699 Centrul de greutate al triunghiului ABC are coordonatele:

- A** $\left(3, \frac{4}{3}\right)$ **B** $\left(\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)$ **C** $\left(4, \frac{4}{3}\right)$ **D** $\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ **E** (1, 1)

Se consideră sistemul
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + az = 1 \\ 3x + y + 4z = 2b^3 \end{cases}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

700 Sistemul este compatibil determinat dacă și numai dacă:

- A** $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}; b \in \mathbb{R}$ **B** $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}; b = 1$ **C** $a = b = 2$ **D** $a = 1; b \in \mathbb{R}$
E $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; b \in \mathbb{R}$

701 Numărul perechilor $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** infinit

Să se calculeze:

702 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{n + 2}$

- A** ∞ **B** 1 **C** 0 **D** 2 **E** e

703 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$

- A** nu există **B** 2 **C** 0 **D** ∞ **E** 1

704 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - \sin x}{x + \sin x}$

- A** 0 **B** 1 **C** 3 **D** ∞ **E** -1

705 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n^2}} \right)$

- A** ∞ **B** -1 **C** e **D** 0 **E** $-\frac{1}{2}$

Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^{\frac{a}{x}}$, unde a este un parametru real.

706 Mulțimea valorilor lui a pentru care graficul funcției f admite asimptota $y = x + 2$ este:

- A** $\{-2, 2\}$ **B** $\{1\}$ **C** $\{2\}$ **D** $\{-1\}$ **E** \emptyset

707 Mulțimea valorilor lui a pentru care graficul funcției f are două asimptote este:

- A** $(0, 1)$ **B** $(1, \infty)$ **C** $(-\infty, 0)$ **D** $(0, \infty)$ **E** \emptyset

Se consideră polinomul

$$P(x) = (x^2 + x + 1)^{100} = a_0 + a_1x + \dots + a_{199}x^{199} + a_{200}x^{200}$$

având rădăcinile x_1, x_2, \dots, x_{200} .

708 Valoarea lui $P(0)$ este:

- A** 30 **B** 0 **C** 200 **D** 100 **E** 1

709 Valoarea lui a_1 este:

- A** 100 **B** 200 **C** 199 **D** 1 **E** 0

710 Restul împărțirii polinomului P la $x^2 + x$ este:

- A** $100x - 1$ **B** 0 **C** 99 **D** $100x + 1$ **E** 1

711 Suma $\sum_{k=1}^{200} \frac{1}{1 + x_k}$ este:

- A** 100 **B** 200 **C** -100 **D** 0 **E** 1

Pe mulțimea \mathbb{Z} se definește legea de compoziție “*” prin

$$x * y = xy + mx + my + 2, \quad \text{unde } m \in \mathbb{Z}.$$

712

$0 * 0$ este:

A 4

B 3

C 2

D 5

E 6

713

Fie $m = -1$. Știind că “*” este asociativă, $(-4) * (-3) * (-2) * (-1) * 0 * 1 * 2 * 3 * 4$ este:

A 1

B -1

C 2

D -2

E 0

714

Mulțimea valorilor parametrului m pentru care legea “*” admite element neutru este:

A $\{-1, 0, 2\}$

B $\{-1, 1, 2\}$

C $\{-1, 2\}$

D $\{-1\}$

E $\{2\}$

715

Dacă $m = 2$, atunci numărul elementelor simetrizabile în raport cu “*” este:

A 1

B 2

C 0

D 4

E infinit

716

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^1 |t - x|^3 dt$, are valoare minimă pentru x egal cu:

A 1

B 0

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{4}$

E -1

Să se calculeze:

717

$$\int_0^1 x^9 dx$$

A $\frac{1}{8}$

B $\frac{2}{9}$

C $\frac{1}{9}$

D $\frac{1}{10}$

E 10

718

$$\int_0^2 \frac{1}{4+x^2} dx$$

A $\frac{\pi}{6}$

B $\frac{\pi}{8}$

C $\frac{\pi}{4}$

D $\frac{\pi}{2}$

E π

719

$$\int_0^1 \ln(x+1) dx$$

A $\ln \frac{e}{2}$

B $\ln \frac{2}{3}$

C 0

D $\ln \frac{4}{e}$

E $\ln 2$

720

$$\int_0^1 \frac{1+x^2}{1+x^2+x^4} dx$$

A $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

B $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$

C $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

D $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$

E $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$

721

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^n \frac{\operatorname{arctg}(x^2)}{1+x^2} dx$$

A $\frac{\pi^2}{2}$

B $\frac{\pi^2}{4}$

C $\frac{\pi^2}{8}$

D π^2

E $\frac{\pi^2}{6}$

* * *

Admitere 16 iulie 2017

722

Fie șirul $a_n = n\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - a\sqrt{n} + \sqrt{n-1})$, $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{R}$.
Dacă șirul (a_n) este convergent, atunci limita lui este:

- A** 0 **B** -1 **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $-\frac{1}{4}$

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{16x^2 + 1} + 4x - 5$.

723

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ este:

- A** $-\infty$ **B** -5 **C** 4 **D** 8 **E** 0

724

Numărul asimptotelor funcției f este:

- A** 2 **B** 0 **C** 1 **D** 3 **E** 4

Se consideră ecuația $a^x = 2x + 1$, unde $a \in (0, \infty)$ este fixat.

725

Valoarea lui a pentru care ecuația admite rădăcina $x = 1$ este:

- A** 2 **B** 1 **C** 3 **D** $\ln 2$ **E** e

726

Mulțimea valorilor lui a pentru care ecuația admite o singură rădăcină reală este:

- A** $(0, +\infty) \setminus \{e^2\}$ **B** $(0, 1] \cup \{e^2\}$ **C** $(0, e^2]$ **D** $[1, +\infty)$ **E** $(0, 1] \cup \{e\}$

727

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[5]{x^3 - \operatorname{tg}^3 x}$. Valoarea lui $f'(0)$ este:

- A** -1 **B** $-\frac{1}{5}$ **C** $\frac{1}{5}$ **D** $\sqrt[5]{\frac{1}{5}}$ **E** $-\sqrt[5]{\frac{1}{5}}$

Să se calculeze:

728

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 3^x}{2 \cdot 3^x + 1}$$

- A** 2 **B** 0 **C** $+\infty$ **D** 3 **E** $\frac{1}{2}$

729

$$\lim_{x \rightarrow +0} ((x+9)^x - 9^x)^x$$

- A** nu există **B** 0 **C** e **D** 1 **E** $\ln 9$

Să se calculeze:

730

$$\int_0^3 \frac{dx}{x^2 + 9}$$

- A** $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ **B** $\frac{\pi}{6}$ **C** $\frac{\pi}{4}$ **D** $\frac{\pi}{18}$ **E** $\frac{\pi}{12}$

731

$$\int_1^e \ln \frac{1}{x} dx$$

- A** -1 **B** 1 **C** $2e - 1$ **D** $1 - 2e$ **E** $e + 1$

732

$$\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{1+x^2} dx$$

- A** 0 **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** $\frac{\pi^2}{2}$ **D** $\frac{\pi}{2}$ **E** $\frac{\pi^2}{4}$

733

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_2^e (\ln x)^n dx$$

- A** e **B** 0 **C** 1 **D** $\ln 2$ **E** ∞

734

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x + 2$ și fie f^{-1} inversa funcției f .
Valoarea $(f^{-1})'(-2)$ este:

- A** 15 **B** $\frac{1}{6}$ **C** 3 **D** $\frac{1}{3}$ **E** 2

În planul xOy se consideră punctele $A(3, 0)$ și $B(0, 4)$.

735

Distanța de la originea planului la dreapta AB este:

- A** 2 **B** $\frac{4}{3}$ **C** $\frac{12}{5}$ **D** 3 **E** $2\sqrt{2}$

736

Ecuția mediatoarei segmentului $[AB]$ este:

- A** $(x - \frac{3}{2}) + (y - 2) = 0$ **B** $4x + 3y + 4 = 0$ **C** $3x - 4y + 4 = 0$ **D** $6x - 8y + 7 = 0$
E $x - y = 0$

737

Se consideră familia de funcții $f_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = x^2 - (4m + 3)x + 4m + 2$, $m \in \mathbb{R}$. Punctul din plan prin care trec toate graficele funcțiilor f_m este situat pe:

- A** axa Oy **B** axa Ox **C** prima bisectoare **D** a doua bisectoare **E** alt răspuns

Fie e baza logaritmului natural. Pe intervalul $(0, +\infty)$ definim legea de compoziție $x * y = x^{2 \ln y}$, $\forall x > 0, y > 0$.

738

Elementul neutru este:

- A** \sqrt{e} **B** 1 **C** e **D** $\frac{1}{\sqrt{e}}$ **E** e^2

739

Pentru $x \neq 1$, simetricul lui x în raport cu legea “*” este:

- A** e^{-x} **B** $\frac{1}{x}$ **C** $e^{\frac{1}{4 \ln x}}$ **D** $x^{-2 \ln x}$ **E** $\frac{1}{2 \ln x}$

740

Valoarea lui $a > 0$ pentru care structura algebrică $((0, \infty) \setminus \{a\}, *)$ este grup, este:

- A** e **B** 1 **C** $\frac{1}{e}$ **D** e^2 **E** \sqrt{e}

741

Numărul $e * e * \dots * e$, unde e apare de 10 ori, este:

- A** e^{256} **B** e^{10} **C** e^{512} **D** $10^{\ln 10}$ **E** e^{1024}

Se consideră sistemul
$$\begin{cases} ax + y + z = -1 \\ x + ay + z = -a \\ x + y - z = -2 \end{cases}, \text{ unde } a \in \mathbb{R}.$$

742 Determinantul sistemului este:

- A** a^2 **B** $a^2 + 2a - 3$ **C** $a^2 - 2a + 3$ **D** $-a^2 - 2a + 3$ **E** $2a + 3$

743 Sistemul este incompatibil dacă și numai dacă:

- A** $a = -1$ **B** $a = 1$ **C** alt răspuns **D** $a \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$ **E** $a = -3$

744 Numărul valorilor lui $a \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul admite soluții (x, y, z) , cu x, y, z în progresie aritmetică în această ordine, este:

- A** 0 **B** 3 **C** 1 **D** 2 **E** ∞

Se consideră funcția $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x + \cos 2x$.

745 $f(0)$ este:

- A** 3 **B** -1 **C** 2 **D** $1/2$ **E** 1

746 Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 1$ este:

- A** 1 **B** 3 **C** 2 **D** 5 **E** 0

747 Mulțimea valorilor parametrului real m pentru care ecuația $f(x) = m$ are soluții este:

- A** $[0, \frac{9}{8}]$ **B** $[-2, 0]$ **C** $[-2, \frac{9}{8}]$ **D** \mathbb{R} **E** alt răspuns

748 Numărul soluțiilor reale ale ecuației $16^x = 3^x + 4^x$ este:

- A** 2 **B** 1 **C** 3 **D** 0 **E** 4

Se dă ecuația $x^4 - 4x^3 + 2x^2 - x + 1 = 0$, cu rădăcinile $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$.

749 Valoarea sumei $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ este:

- A** -2 **B** -4 **C** 2 **D** 4 **E** 1

750 Ecuația cu rădăcinile $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}, \frac{1}{x_4}$ este:

- A** $x^4 + 4x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$ **B** $x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 1 = 0$
C $x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$ **D** $x^4 - 4x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$
E $x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$

751 Valoarea sumei $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2}$ este:

- A** -3 **B** 3 **C** -2 **D** 2 **E** 1

* * *

752 $\int_{-1}^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$ este:

- A** $-e$ **B** $\ln 2$ **C** $-\ln 2$ **D** 0 **E** $2 \ln 2$

753 $\int_0^1 \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1}$ este:

- A** π **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** $\ln 2$ **E** $\frac{\pi}{2} \ln 2$

754 $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1+x^3}} dx$ este:

- A** $\frac{3}{2} \ln 3$ **B** $\frac{2}{3} \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ **C** $\frac{2}{3} \ln 2$ **D** $\frac{2}{3} \ln(1 + \sqrt{2})$ **E** $\frac{3}{2} \ln 2$

755 $\int_{-1}^1 \frac{x}{e^x + x + 1} dx$ este:

- A** 0 **B** $\ln \frac{e}{1+e}$ **C** $\ln \frac{e+1}{e-1}$ **D** $\frac{e+1}{e-1}$ **E** $\ln \frac{e}{2+e}$

756

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x+1}$ este:

- A** 0 **B** 2 **C** 1 **D** ∞ **E** e

757

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\ln(e^x + 2^x) - \sqrt{x^2 - 4x + 1} \right)$ este:

- A** ∞ **B** 0 **C** 2 **D** $\ln 2$ **E** 4

758

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x^a} - x^{x^b}}{\ln^2 x}$, $a, b \in \mathbb{R}$, este:

- A** $\frac{a-b}{2}$ **B** $b-a$ **C** $e^a - e^b$ **D** $ab(a-b)$ **E** $a-b$

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x}(x^2 + x + m)$, unde m este un parametru real.

759

$f(0)$ este:

- A** 0 **B** $m+3$ **C** $e^2(m+3)$ **D** m **E** $-m$

760

f este monotonă pe \mathbb{R} dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $[\frac{1}{4}, 1]$ **B** $[0, \infty)$ **C** $(0, \infty)$ **D** \mathbb{R} **E** $[\frac{1}{2}, \infty)$

761

f are două puncte de extrem dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $(-\infty, \frac{1}{2})$ **B** $[0, \infty)$ **C** $(-2, 2)$ **D** \mathbb{R} **E** $(-1, 1)$

762

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x-a| \sin x$, unde a este un parametru real. Numărul valorilor lui a pentru care f este derivabilă pe \mathbb{R} este:

- A** 2 **B** 0 **C** 1 **D** infinit **E** 4

763

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin formula de recurență $x_{n+1} = x_n^2 - 2x_n + 2$, $x_0 = a \in \mathbb{R}$. Șirul este convergent dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

- A** $[1, 2]$ **B** $[-1, 1]$ **C** $[0, 2]$ **D** $[0, 1]$ **E** $[-1, 0]$

764

Dacă $a = \log_6 2$, atunci $\log_3 12$ este:

- A** 4 **B** $\frac{2+a}{2-a}$ **C** $\frac{a+4}{a+3}$ **D** $\frac{1+a}{1-a}$ **E** $\frac{1}{4}$

Ecuția $x^2 - 2mx + 2m^2 - 2m = 0$, unde m este un parametru real, are rădăcinile reale x_1 și x_2 .

765 Suma $x_1 + x_2$ este:

- A** $2m$ **B** 2 **C** $2m^2 - 2m$ **D** m **E** $-m$

766 Mulțimea valorilor produsului $x_1 x_2$ este:

- A** $[0, 4]$ **B** $[-\frac{1}{2}, 4]$ **C** $[\frac{1}{2}, 2]$ **D** $[-1, 2]$ **E** \mathbb{R}

Se consideră ecuația $x^5 + a^2x^4 + 1 = 0$, $a \in \mathbb{R}$, cu rădăcinile x_i , $i = 1, \dots, 5$.

767 Valoarea sumei $\sum_{i=1}^5 x_i$ este:

- A** $-5a$ **B** a^4 **C** $-a^2$ **D** 0 **E** $-a^4$

768 Valoarea sumei $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i^4}$ este:

- A** 0 **B** a^4 **C** $-5a^4$ **D** $-4a^2$ **E** a^3

769 Mulțimea valorilor lui a pentru care două dintre rădăcinile ecuației au partea imaginară negativă este:

- A** $[-1, 1]$ **B** \emptyset **C** $(-\infty, 0]$ **D** $(-\infty, 0)$ **E** \mathbb{R}

770

Numărul valorilor parametrului real a pentru care sistemul
$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3 \end{cases}$$

are cel puțin o soluție este:

- A** 0 **B** 2 **C** 1 **D** 3 **E** infinit

771

Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel ca $A^2 - \lambda A + \lambda^2 I_2 = O_2$. Matricea A^{2018} este:

- A** $\lambda^{2018} I_2$ **B** A **C** $\lambda^{2016} A^2$ **D** $\lambda^2 A^2$ **E** O_2

Se consideră grupul (G, \star) , unde $G = (-1, 1)$ și $x \star y = \frac{x + y}{1 + xy}$.

772 $\frac{2}{3} \star \frac{3}{4}$ este:

- A** $\frac{9}{12}$ **B** 0 **C** 1 **D** $\frac{14}{15}$ **E** $\frac{17}{18}$

773 Elementul neutru al grupului (G, \star) este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** 0 **C** $-\frac{1}{2}$ **D** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$

774 Dacă $((0, \infty), \cdot)$ este grupul multiplicativ al numerelor reale pozitive, atunci funcția crescătoare $f: G \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = \frac{a+x}{b-x}$, este un izomorfism de grupuri pentru:

- A** $a = b = 2$ **B** $a = -b = 1$ **C** $a = -b = -1$ **D** $a = b = -1$ **E** $a = b = 1$

775 $\frac{1}{2} \star \frac{1}{4} \star \dots \star \frac{1}{10}$ este:

- A** $\frac{5}{6}$ **B** $\frac{10}{13}$ **C** $\frac{11}{15}$ **D** $\frac{7}{9}$ **E** $\frac{8}{9}$

776

Numărul valorilor parametrului real m pentru care ecuația $\sqrt{\cos^4 x + 4 \sin^2 x} + \sqrt{\sin^4 x + 4 \cos^2 x} = m$ are soluții este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** infinit

Fie $f: [0, 3\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x + \cos(4x)$.

777 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ este:

- A** 2 **B** 1 **C** 0 **D** $\sqrt{2}$ **E** $2\sqrt{2}$

778 Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 2$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 6

779

Ecuațiile dreptelor care sunt la distanță 2 de punctul $A(2, 1)$ și trec prin originea $O(0, 0)$ sunt:

- A** alt răspuns **B** $3x + 4y = 0$ **C** $y = \pm x$ **D** $2x \pm y = 0$ **E** $x \pm 2y = 0$

Se consideră punctele $A(6, 0)$, $B(0, 3)$ și $O(0, 0)$ în plan.

780 Ecuția înălțimii din O a triunghiului AOB este:

A $x = 2y$

B $2y = 3x$

C $y = 2x$

D $x = y$

E $3x = y$

781 Coordonatele centrului de greutate al triunghiului AOB sunt:

A $(2, 1)$

B $(1, 1)$

C $(1, 2)$

D $(2, 2)$

E $(3, 2)$

* * *

Admitere 16 iulie 2018

Calculați:

782

$$\int_1^5 \frac{dx}{x+3}$$

- A** $\ln 2$ **B** $\ln 3$ **C** $\ln 4$ **D** $\ln 5$ **E** $\ln 8$

783

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$$

- A** $\operatorname{arctg} \frac{e}{e+1}$ **B** $\operatorname{arctg} e - \frac{\pi}{4}$ **C** $\operatorname{arctg} \frac{e}{e^2+1}$ **D** $\ln \frac{e}{e+1}$ **E** $\ln(2e)$

784

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(4x)}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$$

- A** $\ln 2$ **B** $\pi \ln 4$ **C** $\pi \ln 8$ **D** $\ln \left(\frac{\pi}{4}\right)$ **E** $\ln(\pi e)$

785

Fie $\{x\}$ partea fracționară a numărului real x . Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\pi} \{x\}^n dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{2}$ **B** 4 **C** 2 **D** π **E** 3

786

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 9^x + 5^x + 4}{9^{x+1} - 5^x + 2^x}$ este:

- A** $\frac{2}{9}$ **B** 2 **C** 1 **D** $\frac{1}{9}$ **E** $+\infty$

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + ax$, unde a este un parametru real.

787 $f'(0)$ este:

- A** $1 + a$ **B** a **C** $1 - a$ **D** 1 **E** 0

788 Graficul lui f este tangent axei Ox dacă:

- A** $a = 2$ **B** $a = -1$ **C** $a = 1$ **D** $a = 0$ **E** $a = 3$

789 Pentru $a = -3$, numărul punctelor de extrem local ale funcției $g(x) = |f(x)|$, $x \in \mathbb{R}$, este:

- A** 4 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 5

790 Pentru $a = 1$, $(f^{-1})'(2)$ este:

- A** $1/2$ **B** $1/4$ **C** $1/3$ **D** 0 **E** $+\infty$

Se consideră în plan punctul $A(0, -1)$, dreptele $d_1: x - y + 1 = 0$, $d_2: 2x - y = 0$ și punctele $B \in d_1$, $C \in d_2$, astfel încât d_1 și d_2 sunt mediane în triunghiul ABC .

791 Intersecția dreptelor d_1 și d_2 are coordonatele:

- A** $(-1, 2)$ **B** $(2, 3)$ **C** $(1, 2)$ **D** $(-1, 0)$ **E** $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$

792 Punctul B are coordonatele:

- A** $(3, 6)$ **B** $(0, 1)$ **C** $(1, 2)$ **D** $(-1, 0)$ **E** $(-2, -1)$

793 Se consideră punctele $A(2, 3)$ și $B(4, 5)$. Mediatoarea segmentului $[AB]$ are ecuația:

- A** $2x - y = 2$ **B** $2x + y = 10$ **C** $x + 2y = 11$ **D** $-x + y = 1$ **E** $x + y = 7$

Se consideră polinomul $P(X) = X^{20} + X^{10} + X^5 + 2$, având rădăcinile $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{20}$. Notăm cu $R(X)$ restul împărțirii polinomului $P(X)$ prin $X^3 + X$.

794 $P(i)$ este:

- A** $2 + i$ **B** $1 + i$ **C** 2 **D** i **E** 0

795 $R(X)$ este:

- A** $2 + X + X^2$ **B** $2 + X$ **C** $2 + X - X^2$ **D** X **E** 1

796 $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{x_k - x_k^2}$ este:

- A** $\frac{15}{2}$ **B** 5 **C** 6 **D** 8 **E** 7

Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și fie $A^n = \begin{pmatrix} x_n & -y_n \\ y_n & x_n \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Notăm $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

797 $2A - A^2$ este:

- A** $A + I_2$ **B** I_2 **C** $2I_2$ **D** O_2 **E** $A - I_2$

798 A^{48} este:

- A** O_2 **B** $2^{12}I_2$ **C** $2^{48}I_2$ **D** $2^{48}A$ **E** $2^{24}I_2$

799 $\frac{x_{10}^2 + y_{10}^2}{x_8^2 + y_8^2}$ este:

- A** 16 **B** 2 **C** 8 **D** 4 **E** 1

800

Perechea $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, pentru care $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 2} - ax - b) = 0$, este:

- A** $\left(2, \frac{3}{2}\right)$ **B** $(-2, -1)$ **C** $(-2, -2)$ **D** $(2, -2)$ **E** $\left(-2, -\frac{3}{2}\right)$

801

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} \cdot \sin x$ este:

- A** nu există **B** 0 **C** ∞ **D** $-\infty$ **E** 1

802

Se consideră șirul cu termeni pozitivi $(a_n)_{n \geq 0}$, $a_0 = 1$, $a_1 = a$, $a_{n+1}^3 = a_n^2 a_{n-1}$, $n \geq 1$. Valoarea lui a , pentru care $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 8$, este:

- A** 2 **B** 16 **C** 8 **D** 32 **E** 4

Se consideră ecuația: $\cos^3 x \cdot \sin x - \sin^3 x \cdot \cos x = m$, $m \in \mathbb{R}$.

803

Ecuția admite soluția $x = \frac{\pi}{2}$ pentru:

- A** $m = \frac{1}{4}$ **B** $m = 1$ **C** $m = 0$ **D** $m = -1$ **E** $m = -\frac{1}{4}$

804

Ecuția are soluție dacă și numai dacă m aparține intervalului:

- A** $[-1, 1]$ **B** $[-4, 4]$ **C** $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ **D** $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$ **E** $[-2, 2]$

805

Dacă $x \in (\pi, 2\pi)$ și $\cos x = \frac{3}{5}$, atunci $\sin x$ este:

- A** $\frac{3}{4}$ **B** $\frac{4}{5}$ **C** $-\frac{4}{5}$ **D** 1 **E** $-\frac{3}{4}$

806

Dacă $\lg 5 = a$ și $\lg 6 = b$, atunci $\log_3 2$ este:

- A** $\frac{1+a}{a+b+1}$ **B** $\frac{1+a}{a-b+1}$ **C** $\frac{1-a}{a+b+1}$ **D** $\frac{1-a}{a+b-1}$ **E** $\frac{1-a}{b-1}$

807

Dacă $x, y \in \mathbb{R}$ verifică relația $2 \lg(x - 2y) = \lg x + \lg y$, atunci mulțimea valorilor expresiei $\frac{x}{y}$ este:

- A** $\{4\}$ **B** $\{1\}$ **C** $\{1, 4\}$ **D** $\{1, 2, 4\}$ **E** \emptyset

808

Dacă $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\alpha^3 = 1$, atunci $(1 + \alpha)(1 + \alpha^2)(1 + \alpha^3)(1 + \alpha^4)(1 + \alpha^5)(1 + \alpha^6)$ este:

- A** 64 **B** 0 **C** 16 **D** 4 **E** $8i$

Pe intervalul $(-1, 1)$ se definește legea de compoziție $*$ prin

$$x * y = \frac{2xy + 3(x + y) + 2}{3xy + 2(x + y) + 3}, \quad x, y \in (-1, 1).$$

809 Elementul neutru al legii $*$ este:

- A** 0 **B** $\frac{2}{3}$ **C** $-\frac{2}{3}$ **D** $\frac{1}{3}$ **E** $-\frac{1}{3}$

810 Dacă funcția $f : (-1, 1) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = a \frac{1-x}{1+x}$ verifică relația $f(x * y) = f(x)f(y)$, $\forall x, y \in (-1, 1)$, atunci a este:

- A** $-\frac{2}{3}$ **B** $\frac{2}{3}$ **C** $-\frac{1}{3}$ **D** $\frac{1}{5}$ **E** $-\frac{1}{5}$

811 Numărul soluțiilor ecuației $\underbrace{x * x * \dots * x}_{x \text{ de } 10 \text{ ori}} = \frac{1}{10}$ este:

- A** 2 **B** 0 **C** 1 **D** 10 **E** 5

* * *

812

Se consideră mulțimea $A = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$. Câte dintre submulțimile lui A îl conțin pe 3 și îl au pe 7 ca fiind cel mai mare element?

- A** 2^5 **B** 2^7 **C** $2^7 - 1$ **D** C_7^3 **E** 2^6

Se consideră sistemul $(S) : \begin{cases} x - 2y - 3z = b \\ 2x + y + az = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}.$

813

Sistemul (S) este compatibil determinat dacă și numai dacă:

- A** $a \neq 1$ **B** $a \neq -1$ **C** $a = 1, b = 2$ **D** $a = 3, b \neq 2$ **E** $a \neq -2$

814

Sistemul (S) este compatibil nedeterminat dacă și numai dacă:

- A** $a = 1, b = -5$ **B** $a = -1, b = 4$ **C** $a = -1, b = 6$ **D** $a = -1, b = -6$
E $a = 1, b = 5$

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (2m + 1)x^2 - 2(m + 2)x + m + 2$, unde m este un parametru real, $m \neq -\frac{1}{2}$.

815

Ecuția $f(x) = 0$ are o unică soluție dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $\{-1, 2\}$ **B** $\{-1, 1\}$ **C** $\{-2, 2\}$ **D** $\{-2, 1\}$ **E** $\{0, 1\}$

816

Funcția f admite un minim global negativ dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ **B** $[-1, 2)$ **C** $\left(-\frac{1}{2}, 1\right]$ **D** $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (1, \infty)$ **E** $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (1, \infty)$

817

Soluțiile reale x_1, x_2 ale ecuației $f(x) = 0$ verifică $x_1 < 2$ și $x_2 > 2$ dacă și numai dacă m aparține mulțimii:

- A** $\left[0, \frac{2}{5}\right)$ **B** $\left[-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right)$ **C** $\left(-\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right]$ **D** $\left(-\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right)$ **E** \mathbb{R}

Pe mulțimea $(0, \infty)$ se definește legea de compoziție “ \star ” prin $x \star y = x^{\frac{\lg y}{\lg a}}$, unde $a \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ este fixat.

818 Elementul neutru este:

- A** 1 **B** $-\lg a$ **C** $\lg a$ **D** a^{-1} **E** a

819 Simetricul unui element $x \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ în raport cu legea “ \star ” este:

- A** $e^{\frac{\lg^2 a}{\lg x}}$ **B** $10^{\frac{\lg^2 a}{\lg x}}$ **C** $10^{\frac{\lg x}{\lg^2 a}}$ **D** $e^{\frac{\lg x}{\lg^2 a}}$ **E** x^{-1}

820 $\underbrace{x \star x \star \dots \star x}_x$ este:
 x apare de n ori

- A** $10^{\frac{\lg^n x}{\lg^{n-1} a}}$ **B** $e^{\frac{\lg^n x}{\lg^n a}}$ **C** $10^{n \frac{\lg x}{\lg a}}$ **D** $e^{n \frac{\lg x}{\lg^2 a}}$ **E** $10^{\frac{\lg x}{n \lg a}}$

821

Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ și $\text{tr}(A) = a + d$. Atunci $\det(A + I_2) - 1 - \det A$ este:

- A** $2 \text{tr}(A) + 1$ **B** $\text{tr}(A) + 1$ **C** $2 \text{tr}(A)$ **D** $\text{tr}(A) - 1$ **E** $\text{tr}(A)$

Fie ε rădăcina pozitivă a ecuației $x^2 - x - 1 = 0$

și matricea $A = \begin{pmatrix} -\varepsilon + 1 & \frac{1}{\varepsilon} \\ 1 & \varepsilon - 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

822 ε^3 este egal cu:

- A** $\varepsilon - 2$ **B** $2\varepsilon - 1$ **C** $2\varepsilon + 1$ **D** $-\varepsilon + 2$ **E** ε

823 $\det(A^{2019})$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** 2019 **D** -1 **E** ε

824 Matricea A^{2019} este:

- A** εI_2 **B** $-A$ **C** I_2 **D** $-\varepsilon I_2$ **E** A

825

Fie polinomul $P(x) = x^3 + 3x + 2$, cu rădăcinile x_1, x_2, x_3 .

Polinomul cu rădăcinile $1 + x_1, 1 + x_2, 1 + x_3$ este:

- A** $x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ **B** $x^3 - 3x^2 - 5x - 1$ **C** $x^3 - 3x^2 - x + 2$ **D** $x^3 - 3x^2 + x - 1$
E $x^3 - 3x^2 - x - 5$

826

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x + x^n} dx$ este:

- A** 1 **B** $\ln 2$ **C** $\ln \frac{3}{2}$ **D** 2 **E** $2 \ln 2$

827

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sum_{k=1}^n \cos \frac{2k}{n\sqrt{n}} \right)$ este:

- A** 2 **B** $\frac{1}{2}$ **C** 1 **D** $\frac{2}{3}$ **E** $+\infty$

Se consideră funcția $f : [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x}(x^2 + x - 1)$.

828 Numărul asimptotelor lui f este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4ex]

829 Numărul punctelor de extrem local ale lui f este:

- A** 4 **B** 2 **C** 0 **D** 1 **E** 3

830

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 2n}}$ este:

- A** 0 **B** $\frac{2}{3}$ **C** 1 **D** $\sqrt{2}$ **E** 2

831

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos x}}$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\sqrt{2}$ **D** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **E** nu există

832

Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |2x^2 - 3x + 1| \cdot \cos(ax)$, unde $a \in [0, 2\pi]$ este un parametru real. Numărul valorilor lui a pentru care funcția f este derivabilă pe \mathbb{R} este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** infinit

833

$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $2\sqrt{3}$ **C** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **D** 2 **E** $\frac{7}{12}$

Fie $a \in \mathbb{R}$ și fie funcțiile $f, g : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin

$f(x) = ax^2 + x$, $g(x) = \ln(1+x)$.

834 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ este:

- A** 0 **B** $2a + 1$ **C** 1 **D** ∞ **E** $a + 1$

835 Mulțimea valorilor lui a pentru care graficele funcțiilor f și g au tangență comună într-un punct comun este:

- A** $\mathbb{R} \setminus \left\{1 - \frac{1}{e}\right\}$ **B** $(-\infty, 0]$ **C** $[0, \infty)$ **D** $\left[-\frac{1}{2}, \infty\right)$ **E** \mathbb{R}

Fie șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = x_n \sqrt{1 - x_n^2}$, unde $x_0 = a \in (0, 1)$.

836

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** a **D** $\sqrt{1 - a^2}$ **E** nu există

837

$\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** a^2 **D** $1 - a^2$ **E** $+\infty$

Fie $ABCD$ paralelogram, cu $A(-1, 4)$, $B(1, 6)$ și $C(3, -8)$.

838

Punctul de intersecție a diagonalelor are coordonatele:

- A** $(2, -1)$ **B** $(0, 5)$ **C** $(1, -2)$ **D** $(2, -4)$ **E** $(1, -10)$

839

Simetricul lui D față de dreapta AB are coordonatele:

- A** $(-14, 5)$ **B** $(6, -15)$ **C** $(-13, 4)$ **D** $(-15, 6)$ **E** $(-5, 14)$

840

Aria paralelogramului $ABCD$ este:

- A** 32 **B** 16 **C** 8 **D** 48 **E** 24

841

Mulțimea soluțiilor ecuației $\sin x + \sin(3x) = \frac{8}{3\sqrt{3}}$ este:

- A** $\left\{ (-1)^k \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$ **B** $\left\{ \frac{k\pi}{6} : k \in \mathbb{Z} \right\}$
C $\left\{ (-1)^k \arcsin \frac{3\sqrt{3}}{8} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$ **D** \emptyset **E** $\left\{ \frac{k\pi}{8} : k \in \mathbb{Z} \right\}$

Admitere 24 iulie 2019

842

Se consideră mulțimea $A = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$. Care este numărul submulțimilor lui A care îl conțin pe 5 și au cel puțin un element mai mare decât 5?

- A** 224 **B** 217 **C** 64 **D** 192 **E** 240

Pentru orice $m \in \mathbb{R}^*$ se definește funcția

$$f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_m(x) = mx^2 + 2(m+1)x + m + 2.$$

843

Numărul punctelor din plan comune tuturor graficelor funcțiilor f_m este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** infinit

844

Mulțimea valorilor m pentru care funcția f_m are ambele rădăcini reale și strict negative este:

- A** $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$ **B** $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ **C** \emptyset **D** $(0, \infty)$ **E** $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$

Pe mulțimea \mathbb{Z} se definește legea de compoziție “*” prin $x * y = x + y + axy$, unde $a \in \mathbb{Z}$ este fixat.

- 845 Numărul valorilor lui a pentru care legea de compoziție are element neutru este:
A 1 **B** 2 **C** 4 **D** 5 **E** infinit

- 846 Dacă $a = -2$, atunci numărul elementelor simetrizabile este:
A 1 **B** 2 **C** 4 **D** 5 **E** infinit

- 847 Dacă $a = -2$, atunci $\underbrace{1 * 1 * \dots * 1}_{1 \text{ apare de } 2019 \text{ ori}}$ este:
A -1 **B** 1 **C** $\frac{3^{2019} - 1}{2}$ **D** $\frac{3^{2019} + 1}{2}$ **E** 0

- 848 Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ inversabilă astfel încât $A + A^{-1} = I_2$.
 Atunci matricea $I_2 + A + A^2 + \dots + A^{2019}$ este:
A $2A - I_2$ **B** $2A + I_2$ **C** $-2A + I_2$ **D** $-2A - I_2$ **E** $A + I_2$

- 849 Fie $z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$. Atunci $(1 - z)(1 - z^2)(1 - z^4)(1 - z^5)$ este:
A 9 **B** 0 **C** i **D** 1 **E** z

Se consideră sistemul
$$\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = b \\ x + y + az = 1 \end{cases} \quad \text{cu } a, b \in \mathbb{R}.$$

- 850 Sistemul este compatibil determinat dacă și numai dacă:
A $a \neq \frac{2}{3}$ **B** $a = \frac{2}{3}$ **C** $a \neq \frac{3}{2}$ **D** $a = \frac{3}{2}$ **E** $a \neq 2$

- 851 Sistemul este compatibil nedeterminat dacă și numai dacă:
A $a = \frac{2}{3}, b = 2$ **B** $a = \frac{2}{3}, b \neq 2$ **C** $a = \frac{3}{2}, b = 2$ **D** $a = \frac{2}{3}, b = 3$ **E** $a \neq \frac{2}{3}, b = 2$

Se consideră polinomul $P(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$, cu rădăcinile x_1, x_2, x_3, x_4 .

- 852 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ este:
A 2 **B** 0 **C** 1 **D** -1 **E** -2

- 853 $x_1^{2019} + x_2^{2019} + x_3^{2019} + x_4^{2019}$ este:
A -4 **B** 4 **C** 1 **D** -1 **E** 0

Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = x_n - x_n^2$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

854 Dacă $x_{100} = 1$, atunci valoarea lui x_0 este:
A -2 **B** 1 **C** -1 **D** 2 **E** nu există

855 Șirul este convergent dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:
A $[-1, 1]$ **B** $(-\infty, 0]$ **C** $[0, 1]$ **D** $[1, \infty)$ **E** $(-1, 1)$

856 Dacă $x_0 = \frac{1}{2}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}$ este:
A 1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2}$ **D** nu există **E** $+\infty$

857 Numărul punctelor de extrem ale funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 1)^2(x^2 - 9)^3$, este:
A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Fie $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x(x^2 + x + m)$, $m \in \mathbb{R}$.

858 $f(0)$ este:
A 0 **B** $m - 1$ **C** m **D** $m + 1$ **E** $m + 2$

859 Funcția f are un singur punct de extrem local dacă și numai dacă m aparține mulțimii:
A $(-5, 1)$ **B** $\{-5, 1\}$ **C** $[-5, 1)$ **D** $(-5, 2)$ **E** $\left\{\frac{5}{4}\right\}$

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 1}$.

860 Numărul asimptotelor la graficul funcției f este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** alt răspuns

861 Imaginea funcției f este:
A $\left(-1, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right]$ **B** $[-1, 0)$ **C** $(-1, 0)$ **D** $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ **E** $[-1, \sqrt{2}]$

862 $\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} dx$ este:

- A** $\ln 1$ **B** $\ln 2$ **C** $\frac{\pi}{8}$ **D** $\ln 3$ **E** $\frac{\pi}{2}$

863 $\int_1^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$ este:

- A** $\ln 1$ **B** $\ln 2$ **C** π **D** $\ln 4$ **E** $-\ln 2$

864 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x - x^2}{(x^2 + 1)(x^3 + 1)} dx$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\log \frac{3}{2}$ **D** $\log \frac{2}{3}$ **E** -1

865 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^n \frac{1}{(x^2 + 1)(x^7 + 1)} dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{3}$ **B** $\frac{\pi}{4}$ **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** $\frac{\pi}{8}$ **E** alt răspuns

În planul xOy se consideră punctele $A(8, 0)$ și $B(0, 6)$, iar M este un punct variabil pe segmentul $[AB]$. Fie P și N proiecțiile lui M pe axele Ox , respectiv Oy .

866 Ecuația dreptei AB este:

- A** $3x + 4y = 24$ **B** $3x + 2y = 24$ **C** $x + y = 10$ **D** $2x + y = 22$ **E** $x - y = 1$

867 Lungimea minimă a lui $[OM]$ este:

- A** 4 **B** 6 **C** 5 **D** $\frac{24}{5}$ **E** $\frac{16}{3}$

868 Valoarea maximă a ariei dreptunghiului $MNOP$ este:

- A** 10 **B** 12 **C** 13 **D** 14 **E** 15

Se dă ecuația $\cos^2 x - 2 \sin x \cos x = a + \sin^2 x$, $a \in \mathbb{R}$.

869 Ecuația are soluția $\frac{\pi}{4}$ dacă a este:

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

870 Ecuația admite soluții dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

- A** $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ **B** $[-2, 2]$ **C** $[-1, 1]$ **D** $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ **E** $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

871 Dacă $\sin x + \cos x = 1$, $x \in \mathbb{R}$, atunci valoarea minimă pe care o poate lua expresia $\sin^{2019} x + \cos^{2019} x$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** $\frac{1}{2^{2019}}$ **D** 1 **E** $\frac{1}{4}$

* * *

Câte numere naturale de 3 cifre distincte (în baza 10) au cifrele scrise în ordine ...

872

crescătoare?

A 168**B** 120**C** 126**D** 504**E** 84**873**

descrescătoare?

A 84**B** 720**C** 126**D** 168**E** 120

Fie $(G, *)$ un grup astfel încât funcția

$$f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (G, *), \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

să fie un izomorfism de grupuri.

874

Mulțimea G este:

- A** $(-1, 1)$ **B** $[0, \infty)$ **C** $[-1, 1]$ **D** \mathbb{R} **E** $[0, 1)$

875

Inversa $f^{-1}(y)$ are expresia:

- A** $\frac{y}{\sqrt{1+y^2}}$ **B** $\frac{|y|}{\sqrt{1+y^2}}$ **C** $\frac{y}{\sqrt{y^2-1}}$ **D** $\frac{|y|}{\sqrt{1-y^2}}$ **E** $\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$

876

Valoarea expresiei $(f \circ f \circ \dots \circ f)(1)$, unde f apare de 2021 de ori, este:

- A** $\frac{1}{2021}$ **B** $\frac{1}{\sqrt{2022}}$ **C** $\frac{1}{\sqrt{2021}}$ **D** $\sqrt{\frac{2020}{2021}}$ **E** $\frac{1}{\sqrt{2020 \cdot 2021}}$

877

$\frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{\sqrt{2}}{2}$ este:

- A** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ **B** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **C** $\sqrt{2}$ **D** 1 **E** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

878

Elementul neutru în $(G, *)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** $\ln 2$

879

Valoarea expresiei $\frac{1}{\sqrt{2021}} * \frac{1}{\sqrt{2021}} * \dots * \frac{1}{\sqrt{2021}}$, unde $\frac{1}{\sqrt{2021}}$ apare de 2020 de ori, este:

- A** $\frac{1}{2021}$ **B** $\frac{1}{\sqrt{2022}}$ **C** $\frac{1}{\sqrt{2021}}$ **D** $\sqrt{\frac{2020}{2021}}$ **E** $\frac{1}{\sqrt{2020 \cdot 2021}}$

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

880 Determinantul matricei A este:

- A** 1 **B** 0 **C** -1 **D** -7 **E** 3

881 $(A - I_3)^2$ este:

- A** O_3 **B** I_3 **C** A **D** $A - I_3$ **E** $-I_3$

882 A^{2021} este:

- A** $2021A - 2020I_3$ **B** $A - I_3$ **C** $A + 2020I_3$ **D** $2020A - 2021I_3$
E $2021A + 2020I_3$

883 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x^2 - \pi^2}$ este:

- A** $-\frac{1}{2\pi}$ **B** $\frac{1}{\pi^2}$ **C** $\frac{1}{2\pi}$ **D** 0 **E** $\frac{1}{\pi}$

884 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 + x^2} \cos x}{x^4}$ este:

- A** $\frac{1}{4}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** $\frac{1}{3}$ **D** $\frac{1}{6}$ **E** $\frac{1}{12}$

885 $\int_0^1 x^3 \operatorname{arctg} x \, dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{\pi}{4}$ **D** $\frac{1}{5}$ **E** $\frac{1}{6}$

886 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \, dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{6}$ **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** $\frac{\pi}{3}$ **D** $\frac{\pi}{4}$ **E** $\frac{\pi}{12}$

887 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** e **D** $\frac{1}{e}$ **E** $\frac{2}{e}$

888

Fie $\{x\}$ partea fracționară a numărului real x . Limita șirului

$$\int_0^n \frac{\{x\}^n}{1 + \{x\}} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad \text{este:}$$

- A** $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** 1 **D** $\ln 2$ **E** ∞

Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin relația de recurență

$$x_{n+1} = x_n + 2^{-x_n} \quad \text{pentru orice } n \geq 0, \quad x_0 = 0.$$

889

x_1 este:

- A** 1 **B** 2 **C** $\frac{3}{2}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** 0

890

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este:

- A** 2 **B** e **C** ∞ **D** e^2 **E** nu există

891

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ln n}$ este:

- A** $\log_2 e$ **B** $\ln 2$ **C** 1 **D** 2 **E** $\frac{1}{\sqrt{e}}$

Fie $a \in \mathbb{R}$ și fie funcția $f : (-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $f(x) = \ln(2+x) + ax^2 + 4x$.

892

Dacă tangenta la graficul funcției f în punctul de abscisă -1 este perpendiculară pe dreapta de ecuație $x + y + 1 = 0$, atunci valoarea lui a este:

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** -1

893

Dacă $f''(0) = 0$, atunci valoarea lui a este:

- A** $\frac{1}{8}$ **B** $\frac{1}{2}$ **C** 2 **D** $-\frac{1}{4}$ **E** 0

894

Funcția f este concavă dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

- A** $(-\infty, 0]$ **B** $(-\infty, 0)$ **C** $(0, \infty)$ **D** $[0, \infty)$ **E** \mathbb{R}^*

În planul xOy se consideră punctele $A(0, 2)$, $B(-1, -2)$ și $C(1, 0)$.

895 Centrul de greutate al triunghiului ABC are coordonatele:

- A** $(0, 0)$ **B** $(1, 0)$ **C** $(0, -1)$ **D** $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ **E** $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$

896 Dacă D este un punct din plan cu proprietatea că $ABCD$ este paralelogram, atunci OD este:

- A** 4 **B** $2\sqrt{5}$ **C** 5 **D** $3\sqrt{3}$ **E** $3\sqrt{2}$

897 Dacă M este un punct din plan cu proprietatea că $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 37$, atunci OM este:

- A** 2 **B** $2\sqrt{2}$ **C** 3 **D** $2\sqrt{3}$ **E** 4

898 Numărul complex $(1 + i)(1 + 2i)(1 + 3i)$ este:

- A** -10 **B** $10i$ **C** $1 - 3i$ **D** $3 - i$ **E** $9 + i$

899 Valoarea expresiei $\operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arctg} 2 + \operatorname{arctg} 3$ este:

- A** $\frac{5\pi}{6}$ **B** π **C** $\frac{3\pi}{2}$ **D** $\frac{3\pi}{4}$ **E** $\frac{5\pi}{4}$

Fie funcția $f : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^5 x + \cos^5 x$.

900 $f(\pi)$ este:

- A** -1 **B** 0 **C** 1 **D** 2 **E** -2

901 Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 1$ este:

- A** 4 **B** 5 **C** 7 **D** 9 **E** 10

* * *

Admitere 22 iulie 2021

902

Numărul complex $1 - i + i^2 - i^3 + \dots - i^{2021}$ este:

- A** $1 - i$ **B** $1 + i$ **C** $-i$ **D** 1 **E** 0

903

Dacă $a = \lg 5$, atunci $\log_3 5 \cdot \log_{20} 9$ este:

- A** $\frac{2a}{2-a}$ **B** $\frac{2-a}{2a}$ **C** $\frac{1-a}{2a}$ **D** $\frac{a}{2-a}$ **E** $\frac{2-a}{a}$

904

Câte numere naturale de patru cifre (în baza 10) se pot scrie, dacă se pot folosi doar cifrele 1, 2, 3, 4 iar cifra 1 se folosește obligatoriu?

- A** 256 **B** 252 **C** 110 **D** 192 **E** 175

Pe \mathbb{C} se definește legea de compoziție $z_1 * z_2 = z_1 z_2 - i(z_1 + z_2) - 1 + i$, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

905

 $i * i$ este:

- A** 1 **B** 0 **C** i **D** $-i$ **E** 2

906

Elementul neutru al legii “*” este:

- A** $-i$ **B** $-1 + i$ **C** $-1 - i$ **D** $1 + i$ **E** $1 - i$

907

Mulțimea elementelor inversabile în monoidul $(\mathbb{C}, *)$ este:

- A** $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ **B** $\{-1 + i, 1 + i\}$ **C** $\{1 - i, -1 - i\}$ **D** $\{i\}$ **E** $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$

908

Dacă $\varepsilon = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$, atunci valoarea expresiei $(\varepsilon + i) * (\varepsilon + i) * \dots * (\varepsilon + i)$, unde $\varepsilon + i$ apare de 2022 ori, este:

- A** $1 + i$ **B** $-1 + i$ **C** $1 - i$ **D** i **E** $-i$

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și fie sistemul (S) în necunoscutele x, y, z :

$$(S) : \begin{cases} x - 2y - 3z = b \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x + y + az = 4 \end{cases} .$$

909 Sistemul (S) este compatibil determinat dacă și numai dacă:

- A** $a \neq -2$ **B** $a = -2$ **C** $a \neq 2$ **D** $a \neq -1$ **E** $a = 2$

910 Sistemul (S) este compatibil nedeterminat dacă și numai dacă perechea (a, b) este:

- A** $(-2, 6)$ **B** $(-2, -6)$ **C** $(-2, 5)$ **D** $(2, 5)$ **E** $(2, -6)$

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

911 A^{2022} este:

- A** $4^{2021}A$ **B** $4^{2022}A$ **C** $4A$ **D** $4^{2022}I_2$ **E** O_2

912 Numărul matricelor $X \in M_2(\mathbb{R})$ care verifică ecuația $X^{2022} = A$ este:

- A** 2 **B** 0 **C** 2022 **D** 4 **E** 1

Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \frac{1}{x}$ pentru orice $x > 0$.

913 Numărul soluțiilor ecuației $f(x^2) = f(x)$ este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

914 Mulțimea valorilor $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție este:
A \mathbb{R} **B** $(0, \infty)$ **C** $(-1, 1)$ **D** $(-1, \infty)$ **E** \mathbb{R}^*

915 Numărul asimptotelor la graficul funcției f este:
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

916 $f'(x)$ este:
A $1 + \frac{1}{x^2}$ **B** $1 - \ln x$ **C** $\frac{x^2}{2} - \ln x$ **D** $1 - \frac{1}{x^2}$ **E** $x^2 + \frac{1}{x^2}$

917 Ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de intersecție a graficului cu axa Ox este:
A $x + 2y = 1$ **B** $x - y = 1$ **C** $2x - y = 2$ **D** $2x + y = 2$ **E** $y = 0$

918 $\int_1^{\sqrt{e}} f(x) dx$ este:
A $\frac{e}{2} - 1$ **B** $\frac{e}{2}$ **C** $1 - \frac{1}{e}$ **D** $e - \frac{1}{2}$ **E** $1 + \frac{1}{e}$

919 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^n e^{-|f(x)|} dx$ este:
A 0 **B** 1 **C** $\frac{1}{e}$ **D** e **E** $e - \frac{1}{e}$

920 $\int_0^1 2^{-x} dx$ este:
A $\frac{1}{2 \ln 2}$ **B** $\frac{\ln 2}{2}$ **C** $-\frac{1}{2 \ln 2}$ **D** $-\frac{\ln 2}{2}$ **E** $2^{\ln 2} - 1$

921 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos x} dx$ este:
A 2 **B** $2\sqrt{2} - 2$ **C** $2\sqrt{2}$ **D** $2 + \sqrt{2}$ **E** $2 - \sqrt{2}$

Fie funcția continuă $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ cu $f(x) = \frac{x - e}{\ln x - 1}$ pentru orice $x \in (0, \infty) \setminus \{e\}$.

922 $f(e)$ este:

- A** 0 **B** e **C** 1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** 2

923 $f'(e)$ este:

- A** 0 **B** e **C** 1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{e}{2}$

Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin relația de recurență $x_{n+1} = x_n^2 + 2x_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, unde $x_0 \in \mathbb{R}$.

924 Dacă $x_0 \in (0, 1)$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este:

- A** ∞ **B** nu există **C** 0 **D** $1 + \sqrt{5}$ **E** e^2

925 Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:

- A** $[-2, 0]$ **B** $[-1, 0]$ **C** $[-1, 1)$ **D** $\{-1, 0\}$ **E** $(-\infty, 1)$

926

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2^x - 1) \cdot \ln(1 + \sin^2 x)}{(\sqrt{1 + x^2} - 1) \cdot \operatorname{tg} x}$ este:

- A** $2 \ln 2$ **B** $\ln 2$ **C** 0 **D** $\frac{\ln 2}{2}$ **E** 1

În planul xOy se consideră punctele $A(2, 3)$, $B(-2, -3)$ și $C(3, -3)$.

927 Centrul de greutate al triunghiului ABC are coordonatele:

- A** $(1, -1)$ **B** $(0, 0)$ **C** $(0, -1)$ **D** $\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ **E** $\left(\frac{7}{3}, 3\right)$

928 Dacă D este un punct din plan cu proprietatea că $COAD$ este paralelogram, atunci CD este:

- A** 5 **B** $\sqrt{13}$ **C** $3\sqrt{2}$ **D** $2\sqrt{3}$ **E** $\sqrt{19}$

929 Dacă M este un punct oarecare din plan, atunci valoarea minimă a expresiei $MA^2 + MB^2 + MC^2$ este:

- A** 35 **B** 44 **C** 38 **D** 41 **E** 53

Fie $a \in \mathbb{R}$ și fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x + \cos(ax)$.

930

$f(0)$ este:

A 2

B 0

C 1

D π

E -2

931

Ecuția $f(x) = 2$ are soluție unică dacă și numai dacă a aparține mulțimii:

A $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

B $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

C $\{-\pi, \pi\}$

D \mathbb{R}^*

E $(-1, 1)$

* * *

Se consideră mulțimea $M = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$. Care este numărul submulțimilor lui M ce conțin ...

932 cel puțin un element mai mic decât 5?

- A** 496 **B** 480 **C** 448 **D** 248 **E** 240

933 cel puțin un element mai mic decât 5 și cel puțin un element mai mare decât 5?

- A** 434 **B** 448 **C** 217 **D** 224 **E** 248

Pe \mathbb{Z} se definește legea de compoziție $x * y = x + (-1)^x y$, pentru orice $x, y \in \mathbb{Z}$. Care este ...

934 elementul neutru în raport cu legea “*”?

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** 2 **E** nu există element neutru

935 simetricul lui 2022 în raport cu legea “*”?

- A** -2023 **B** 2022 **C** 2022 nu are element simetric **D** 2021 **E** -2022

936 numărul soluțiilor ecuației $x * x = 2022$ ($x \in \mathbb{Z}$)?

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 2022 **E** 2023

937 Numărul soluțiilor complexe ale ecuației $z^2 = -2\bar{z}$ este:

- A** 4 **B** 0 **C** 1 **D** 2 **E** 3

Pentru orice $m \in \mathbb{R}^*$ se definește funcția

$$f_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_m(x) = mx^2 - (2m + 1)x + m + 1, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

938 Valoarea lui m pentru care $x = 2$ este soluție a ecuației $f_m(x) = 0$ este:

- A** -2 **B** -1 **C** 1 **D** 2 **E** 3

939 Vârfulurile parabolilor reprezentate de graficele funcțiilor f_m se află pe dreapta de ecuație:

- A** $x + 2y = 1$ **B** $2x + y = 1$ **C** $x - 2y = 1$ **D** $2x - y = 1$ **E** $x - 2y = 2$

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

940 A^2 este:

- A** $-A$ **B** A **C** I_2 **D** $-4I_2$ **E** O_2

941 Numărul soluțiilor $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ale ecuației $X^2 = A$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** infinit

942 Dacă $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ verifică ecuația $X^2 = A$, atunci X^{2022} este:

- A** A **B** $2022 \cdot I_2$ **C** $-A$ **D** $i \cdot I_2$ **E** $i \cdot A$

943

Valoarea expresiei $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x \, dx + \int_0^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} x \, dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ **B** 1 **C** $\frac{2\pi}{3} - \ln 2$ **D** $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ **E** $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \ln 2$.

Fie funcția continuă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cu $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$.

944 $f(0)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\sqrt{2}$

945 Mulțimea soluțiilor ecuației $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}$ este:

- A** {1} **B** {0, 1} **C** \emptyset **D** $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ **E** {0}.

946 $f'(0)$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\sqrt{2}$

947 Mulțimea valorilor funcției f este:

- A** $(-1, 1)$ **B** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ **C** \mathbb{R} **D** $[-2, 2]$ **E** $[1 - \sqrt{2}, \sqrt{2} - 1]$.

948 Numărul soluțiilor ecuației $f(\operatorname{tg} x) = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ din intervalul $[0, 4\pi]$ este:

- A** 1 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** infinit

949 $\int_0^{2\sqrt{2}} f(x) dx$ este:

- A** $1 + \sqrt{2}$ **B** $\sqrt{2} - \frac{1}{2} \ln 2$ **C** 0 **D** $1 - \ln \frac{3}{2}$ **E** $2 - \ln 2$

950 $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ este:

- A** $\frac{1}{2}$ **B** 1 **C** 2 **D** e **E** $\frac{e^2}{2}$.

951 $\int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}} \cdot \sin \frac{\pi x}{2} dx$ este:

- A** $\frac{2}{\pi}$ **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** $2\sqrt{2}$ **D** $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ **E** $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$.

952 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} dx$ este:

- A** $2 \ln 3$ **B** $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ **C** $2\sqrt{3}$ **D** $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ **E** $\frac{\pi \ln 3}{2}$.

953 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{x^2}$ este:

- A** 7 **B** 6 **C** 3 **D** $\frac{11}{2}$ **E** $\frac{15}{2}$

Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, unde $x_0 \in \mathbb{R}$.

954 $x_3 = 0$ dacă și numai dacă x_0 aparține mulțimii:

- A** $\{-1, 0\}$ **B** $\{0\}$ **C** $\{1\}$ **D** $\{-1, 0, 1\}$ **E** $[-1, 1]$

955 Dacă șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent, atunci limita sa este:

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

956 Dacă $x_0 = -\frac{1}{2}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** -1 **D** $\frac{1}{2}$ **E** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

În planul xOy se consideră pătratul $ABCD$, astfel încât vârfurile lui sunt ordonate în sens trigonometric, $A(2, 7)$ iar $M(-2, 1)$ este punctul de intersecție a diagonalelor.

957 Panta dreptei BD este:

- A** $-\frac{2}{3}$ **B** $\frac{3}{2}$ **C** $-\frac{3}{5}$ **D** $\frac{5}{3}$ **E** $-\frac{1}{2}$

958 Aria pătratului $ABCD$ este:

- A** 104 **B** 61 **C** 85 **D** 101 **E** 122

959 Punctul B are coordonatele:

- A** $(-8, 5)$ **B** $(-9, 5)$ **C** $(-8, 6)$ **D** $(-9, 6)$ **E** $(-7, 5)$

960

Numărul soluțiilor ecuației $\sin x \cdot \sin 2x = 1$ din intervalul $[0, 4\pi]$ este:

- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

961

Dacă $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$, atunci $\sin^6 x + \cos^6 x$ este:

- A** $\frac{1}{4}$ **B** 1 **C** $\frac{1}{8}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{3}{2}$

* * *

Admitere 15 iulie 2022

Se consideră mulțimea $M = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$. Care este numărul submulțimilor lui M ce conțin ...

962 cel puțin un număr impar?

- A** 496 **B** 480 **C** 448 **D** 248 **E** 240

963 cel puțin un număr par mai mic decât 5 și cel puțin un număr par mai mare decât 5?

- A** 434 **B** 336 **C** 217 **D** 352 **E** 416

Fie numărul complex $z = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$.

964 z^2 este:

- A** $-i$ **B** $\frac{i}{2}$ **C** $\frac{z}{2}$ **D** i **E** $2z$

965 Valoarea expresiei $1 + z + z^2 + \dots + z^{2022}$ este:

- A** $-\bar{z}$ **B** $-z$ **C** z **D** 1 **E** i

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

966 Valoarea lui $x \in \mathbb{R}$ pentru care $A^2 = x \cdot A$ este:
A 5 **B** 1 **C** 2 **D** 6 **E** 3

967 A^{2022} este:
A $5^{2021}A$ **B** $5A$ **C** $5^{2021}I_2$ **D** $6^{2021}A$ **E** 0_2

968 $\det(A + A^2 + \dots + A^{2022})$ este:
A 0 **B** 2022 **C** 5^{4044} **D** $\frac{5^{2023} - 1}{4}$ **E** 6^{2023}

Pe $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ se definește legea de compoziție $x * y = x \cdot y^{\frac{x}{|x|}}$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

969 Elementul neutru în raport cu legea „*” este:
A 1 **B** 0 **C** -1 **D** $\sqrt{2}$ **E** -2

970 Simetricul lui -2022 în raport cu legea „*” este:
A $\frac{1}{2022}$ **B** 2022 **C** $-\frac{1}{2022}$ **D** -2022 **E** Numărul -2022 nu este simetrizabil

971 Numărul soluțiilor ecuației $x * x = 1$ este:
A 4 **B** 1 **C** 2 **D** 0 **E** infinit

Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{k-1}{k!}$, pentru orice $n \geq 0$.

972 x_1 este:
A -2 **B** -1 **C** 0 **D** 1 **E** 2

973 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ este:
A e **B** -1 **C** 0 **D** 1 **E** e - 1

974 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{|x_n|}$ este:
A e **B** $\frac{1}{e}$ **C** 0 **D** 1 **E** e - 1

975 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$ este:

A $\frac{1}{2}$ **B** 1 **C** 2 **D** $-\frac{1}{2}$ **E** -1

976 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^\pi - (\sin x)^\pi}{x^{\pi+2}}$ este:

A $\frac{\pi}{2}$ **B** $\frac{\pi}{3}$ **C** $\frac{\pi}{4}$ **D** $\frac{\pi}{6}$ **E** limita nu există

977 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x^2}{\sqrt{x^4+1}} dx$ este:

A 1 **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** ∞ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\ln 2$

Fie funcția $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, cu $f(x) = \frac{2-x}{1+2x}$, pentru orice $x \geq 0$.

978 Numărul soluțiilor ecuației $f(f(x)) = x$ este:

A infinit **B** 0 **C** 1 **D** 2 **E** 4

979 $f'(x)$ este:

A $-\frac{2x}{(1+2x)^2}$ **B** $\frac{4}{(1+2x)^2}$ **C** $\frac{3-4x}{(1+2x)^2}$ **D** $\frac{5}{(1+2x)^2}$ **E** $\frac{2}{1+2x}$

980 Mulțimea valorilor funcției f este:

A $\left(-\frac{1}{2}, 2\right]$ **B** $\left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$ **C** $(-2, 2]$ **D** $(-\infty, 2]$ **E** \mathbb{R}

981 Mulțimea valorilor $a \in \mathbb{R}$ pentru care expresia $\operatorname{arctg}(x+a) + \operatorname{arctg}(f(x)+a)$ nu depinde de x este:

A $\{0, 1\}$ **B** $\{0\}$ **C** $\{-1, 0\}$ **D** \emptyset **E** $\{-1, 0, 1\}$

982 $\int_0^2 \operatorname{arctg} f(x) dx$ este:

A $\frac{\ln 5}{2}$ **B** $\operatorname{arctg} 2$ **C** $\frac{\pi \ln 5}{2}$ **D** $2 \cdot \ln 5 \cdot \operatorname{arctg} 2$ **E** $2 \cdot \operatorname{arctg} 2$

Fie $a > 0$ și fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cu $f(x) = a^x - 2x - 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

983

$f(0)$ este:

- A** 0 **B** 1 **D** $a - 1$ **E** -1 **E** $a + 1$

984

Mulțimea valorilor lui a pentru care $f(x) \geq 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$ este:

- A** $(0, 1) \cup \{e^2\}$ **B** $(1, e^2] \setminus \{e\}$ **C** $\left(\frac{1}{e}, e^2\right)$ **D** $\{e^2\}$ **E** $\{2e, e^2\}$

985

Dacă $a = e$, atunci $\int_0^1 f(x) dx$ este:

- A** $e - 3$ **B** 1 **C** 0 **D** $e - 2$ **E** $e + 2$

986

Valoarea expresiei $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{x \cos^2 x}{1 + \sin x} dx$ este:

- A** $\frac{\pi}{2} - 1$ **B** $\frac{\pi}{2} + 1$ **C** $\frac{3\pi}{2} + 1$ **D** $\frac{\pi - 1}{2}$ **E** $\frac{\pi + 1}{2}$

În planul xOy se consideră un triunghi ABC , în care $A(0, 4)$, mediana din B are ecuația $x - 4y + 6 = 0$, iar mediana din C are ecuația $x + 6y - 14 = 0$.

987

Centrul de greutate al triunghiului ABC are coordonatele:

- A** (2, 2) **B** (2, 1) **C** (1, 2) **D** (1, 3) **E** (2, 3)

988

Mijlocul laturii $[BC]$ are coordonatele:

- A** (3, 1) **B** (2, 1) **C** (2, 0) **D** (3, 0) **E** (4, 0)

Fie funcția $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = 2 \cos^2 x + \sin 2x$, pentru orice $x \in [0, 2\pi]$.

989

$f\left(\frac{\pi}{12}\right)$ este:

A $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

B $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$

C $1 + \sqrt{2}$

D $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

E $1 + \sqrt{6}$

990

Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = 2$ este:

A 5

B 4

C 3

D 2

E 1

991

Maximul funcției f este:

A $1 + \sqrt{2}$

B 2

C $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

D $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

E $1 + \sqrt{3}$

* * *

Problemele au fost propuse/prelucrate/alese de către:

1 - Maria Câmpian	44 - Daniela Roșca	87 - Alexandru Mitrea
2 - Daria Dumitraș	45 - Eugenia Duca	88 - Ioan Rașa
3 - Maria Câmpian	46 - Eugenia Duca	89 - Ioan Rașa
4 - Eugenia Duca	47 - Alexandru Mitrea	90 - Ioan Rașa
5 - Liana Timboș	48 - Alexandru Mitrea	91 - Ioan Rașa
6 - Liana Timboș	49 - Alexandru Mitrea	92 - Mircea Ivan
7 - Liana Timboș	50 - Alexandru Mitrea	93 - Mircea Ivan
8 - Dalia Cîmpean	51 - Alexandru Mitrea	94 - Daria Dumitraș
9 - Dalia Cîmpean	52 - Eugenia Duca	95 - Daria Dumitraș
10 - Dalia Cîmpean	53 - Tania Lazar	96 - Vasile Pop
11 - Maria Câmpian	54 - Gheorghe Toader	97 - Silvia Toader
12 - Maria Câmpian	55 - Daniela Marian	98 - Nicolaie Lung
13 - Maria Câmpian	56 - Ioan Rașa	99 - Nicolaie Lung
14 - Alexandra Ciupa	57 - Ioan Rașa	100 - Daniela Roșca
15 - Alexandra Ciupa	58 - Ioan Rașa	101 - Dorian Popa
16 - Viorica Muresan	59 - Ioan Rașa	102 - Neculae Vornicescu
17 - Viorica Muresan	60 - Ioan Rașa	103 - Neculae Vornicescu
18 - Dalia Cîmpean	61 - Alexandru Mitrea	104 - Vasile Miheșan
19 - Radu Peter	62 - Ioan Rașa	105 - Daria Dumitraș
20 - Mircea Ivan	63 - Daniela Roșca	106 - Vasile Miheșan
21 - Daria Dumitraș	64 - Daniela Roșca	107 - Daniela Roșca
22 - Daniela Inoan	65 - Floare Tomuța	108 - Daniela Roșca
23 - Nicolaie Lung	66 - Daniela Roșca	109 - Daniela Roșca
24 - Daria Dumitraș	67 - Daniela Roșca	110 - Vasile Pop
25 - Daniela Roșca	68 - Daniela Roșca	111 - Vasile Pop
26 - Daniela Roșca	69 - Alexandru Mitrea	112 - Silvia Toader
27 - Adela Novac	70 - Alexandru Mitrea	113 - Silvia Toader
28 - Adela Novac	71 - Gheorghe Toader	114 - Gheorghe Toader
29 - Floare Tomuța	72 - Eugenia Duca	115 - Rozica Moga
30 - Mircea Dan Rus	73 - Silvia Toader	116 - Rozica Moga
31 - Mircea Dan Rus	74 - Silvia Toader	117 - Viorica Mureșan
32 - Mircea Dan Rus	75 - Silvia Toader	118 - Dorian Popa
33 - Floare Tomuța	76 - Ioan Gavrea	119 - Mircea Ivan
34 - Iuliu Crivei	77 - Ioan Gavrea	120 - Iuliu Crivei
35 - Viorica Mureșan	78 - Bogdan Gavrea	121 - Iuliu Crivei
36 - Neculae Vornicescu	79 - Bogdan Gavrea	122 - Daniela Roșca
37 - Neculae Vornicescu	80 - Alexandra Ciupa	123 - Ioan Gavrea
38 - Alexandra Ciupa	81 - Mihaela Bercheșan	124 - Ioan Gavrea
39 - Vasile Pop	82 - Mihaela Bercheșan	125 - Vasile Pop
40 - Vasile Câmpian	83 - Mihaela Bercheșan	126 - Alexandru Mitrea
41 - Ioan Gavrea	84 - Eugenia Duca	127 - Viorica Mureșan
42 - Ioan Gavrea	85 - Mircea Ivan	128 - Ovidiu Furdui
43 - Ioan Gavrea	86 - Alexandra Ciupa	129 - Ovidiu Furdui

130 - Alina Sîntămărian	190 - Iuliu Crivei	250 - Ioan Gavrea
131 - Vasile Pop	191 - Iuliu Crivei	251 - Dorian Popa
132 - Mircea Ivan	192 - Daniela Roșca	252 - Dorian Popa
133 - Mircea Ivan	193 - Vasile Miheșan	253 - Dorian Popa
134 - Eugenia Duca	194 - Vasile Miheșan	254 - Dorian Popa
135 - Neculae Vornicescu	195 - Vasile Miheșan	255 - Dorian Popa
136 - Iuliu Crivei	196 - Vasile Pop	256 - Dorian Popa
137 - Gheorghe Toader	197 - Vasile Pop	257 - Dorian Popa
138 - Alexandra Ciupa	198 - Vasile Pop	258 - Dorian Popa
139 - Silvia Toader	199 - Vasile Pop	259 - Dorian Popa
140 - Vasile Câmpian	200 - Silvia Toader	260 - Dorian Popa
141 - Daniela Inoan	201 - Silvia Toader	261 - Dorian Popa
142 - Dorian Popa	202 - Silvia Toader	262 - Mircea Ivan
143 - Neculae Vornicescu	203 - Ioan Rașa	263 - Mircea Ivan
144 - Mircea Ivan	204 - Ioan Rașa	264 - Mircea Ivan
145 - Vasile Pop	205 - Ioan Rașa	265 - Mircea Ivan
146 - Mircea Ivan	206 - Mircea Gurzău	266 - Vasile Pop
147 - Daniela Inoan	207 - Vasile Pop	267 - Adela Novac
148 - Dorian Popa	208 - Vasile Pop	268 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian
149 - Gheorghe Toader	209 - Alexandru Mitrea	269 - Daniela Roșca
150 - Viorica Mureșan	210 - Gheorghe Toader	270 - Ioan Rașa
151 - Vasile Pop	211 - Dorian Popa	271 - Maria Câmpian
152 - Floare Tomuța	212 - Dorian Popa	272 - Maria Câmpian
153 - Vasile Miheșan	213 - Dorian Popa	273 - Maria Câmpian
154 - Ioan Gavrea	214 - Iuliu Crivei	274 - Adela Novac
155 - Ioan Gavrea	215 - Iuliu Crivei	275 - Viorica Mureșan
156 - Radu Peter	216 - Daniela Inoan	276 - Daniela Roșca
157 - Ioan Rașa	217 - Dorian Popa	277 - Alexandra Ciupa
158 - Vasile Pop	218 - Ioan Rașa	278 - Ioan Rașa
159 - Vasile Pop	219 - Adela Novac	279 - Nicolai Lung
160 - Neculae Vornicescu	220 - Adela Novac	280 - Alexandra Ciupa
161 - Alexandru Mitrea	221 - Dorian Popa	281 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian
162 - Alexandru Mitrea	222 - Dorian Popa	282 - Ioan Rașa
163 - Floare Tomuța	223 - Dorian Popa	283 - Daria Dumitraș
164 - Daniela Roșca	224 - Mircea Ivan	284 - Adela Capătă
165 - Mircea Ivan	225 - Nicolai Lung	285 - Ioan Gavrea
166 - Mircea Dan Rus	226 - Nicolai Lung	286 - Ioan Gavrea
167 - Mircea Dan Rus	227 - Nicolai Lung	287 - Ioan Gavrea
168 - Alexandra Ciupa	228 - Constantin Todea	288 - Mircea Ivan
169 - Vasile Miheșan	229 - Vasile Pop	289 - Alina Sîntămărian
170 - Vasile Pop	230 - Ioan Gavrea	290 - Mircea Ivan
171 - Floare Tomuța	231 - Vasile Pop	291 - Neculae Vornicescu
172 - Alexandru Mitrea	232 - Vasile Pop	292 - Silvia Toader
173 - Alexandru Mitrea	233 - Vasile Pop	293 - Marius Birou
174 - Alexandru Mitrea	234 - Mircea Rus	294 - Alexandra Ciupa
175 - Alexandru Mitrea	235 - Mircea Rus	295 - Adrian Holhos
176 - Alexandru Mitrea	236 - Mircea Rus	296 - Adrian Holhos
177 - Alexandru Mitrea	237 - Mircea Rus	297 - Ioan Rașa
178 - Alexandru Mitrea	238 - Mircea Rus	298 - Eugenia Duca
179 - Dorian Popa	239 - Mircea Rus	299 - Mircea Ivan
180 - Dorian Popa	240 - Mircea Rus	300 - Adela Capătă
181 - Dorian Popa	241 - Mircea Rus	301 - Adela Capătă
182 - Dorian Popa	242 - Mircea Rus	302 - Viorica Mureșan
183 - Dorian Popa	243 - Mircea Rus	303 - Mircea Ivan
184 - Vasile Pop	244 - Mircea Rus	304 - Vasile Pop
185 - Gheorghe Toader	245 - Mircea Rus	305 - Mircea Ivan
186 - Viorica Mureșan	246 - Silvia Toader	306 - Radu Peter
187 - Viorica Mureșan	247 - Silvia Toader	307 - Adrian Holhos
188 - Daniela Roșca	248 - Daniela Roșca	
189 - Nicolai Lung	249 - Alexandru Mitrea	

308 - Floare Tomuța	368 - Mircea Ivan	426 - Mihaela Bercheșan
309 - Floare Tomuța	369 - Mircea Ivan	427 - Mihaela Bercheșan
310 - Dorian Popa	370 - Ioan Gavrea	428 - Mihaela Bercheșan
311 - Alexandra Ciupa	371 - Neculae Vornicescu	429 - Alexandru Mitrea
312 - Vasile Pop	372 - Mircea Ivan	430 - Adela Novac
313 - Radu Peter	373 - Mircea Ivan	431 - Daniela Roșca
314 - Radu Peter	374 - Mircea Ivan	432 - Silvia Toader
315 - Alexandru Mitrea	375 - Daniela Marian	433 - Gheorghe Toader
316 - Ovidiu Furdui	376 - Daniela Marian	434 - Silvia Toader
317 - Mircea Ivan	377 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian	435 - Gheorghe Toader
318 - Mircea Ivan	378 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian	436 - Mircia Gurzău
319 - Mircea Ivan		437 - Mircia Gurzău
320 - Mircea Ivan		438 - Vasile Miheșan
321 - Daniela Roșca	379 - Mircea Ivan	439 - Mircea Ivan
322 - Daniela Roșca	380 - Alexandra Ciupa	440 - Vasile Câmpian
323 - Lucia Blaga	381 - Alexandru Mitrea	441 - Dorian Popa
324 - Lucia Blaga	382 - Daniela Roșca	442 - Mircea Ivan
325 - Alexandra Ciupa	383 - Daniela Roșca	443 - Mircea Ivan
326 - Alexandra Ciupa	384 - Mircea Dan Rus	444 - Mircea Ivan
327 - Alexandra Ciupa	385 - Mircea Dan Rus	445 - Mircea Ivan
328 - Vasile Pop	386 - Mircea Dan Rus	446 - Daniela Inoan
329 - Maria Câmpian	387 - Dorian Popa	447 - Mircea Ivan
330 - Neculae Vornicescu	388 - Ioan Gavrea	448 - Teodor Potra
331 - Daniela Inoan	389 - Alexandru Mitrea	449 - Alexandru Mitrea
332 - Tania Lazar	390 - Mircea Ivan	450 - Viorica Mureșan
333 - Tania Lazar	391 - Dorian Popa	451 - Daniela Marian
334 - Daniela Inoan	392 - Vasile Ile	452 - Gheorghe Toader
335 - Dorian Popa	393 - Alexandru Mitrea	453 - Ioan Rașa
336 - Vasile Pop	394 - Lucia Blaga	454 - Rozica Moga
337 - Maria Câmpian	395 - Mircea Ivan	455 - Alexandra Ciupa
338 - Radu Peter	396 - Daniela Roșca	456 - Ovidiu Furdui
339 - Iuliu Crivei	397 - Alexandru Mitrea	457 - Maria Câmpian
340 - Alexandra Ciupa	398 - Gheorghe Toader	458 - Alexandru Mitrea
341 - Vasile Câmpian	399 - Gheorghe Toader	459 - Mircea Ivan
342 - Adrian Holhoș	400 - Mircea Dan Rus	460 - Rozica Moga
343 - Alina-Ramona Baias	401 - Mircea Dan Rus	461 - Rozica Moga
344 - Adrian Holhoș	402 - Mircea Dan Rus	462 - Alina Sîntămărian
345 - Neculae Vornicescu	403 - Dorian Popa	463 - Rozica Moga
346 - Mircea Ivan	404 - Dorian Popa	464 - Nicolaie Lung
347 - Mircea Ivan	405 - Dorian Popa	465 - Maria Câmpian
348 - Mircea Ivan	406 - Ioan Gavrea	466 - Maria Câmpian
349 - Mircea Dan Rus	407 - Ioan Gavrea	467 - Neculae Vornicescu
350 - Mircea Dan Rus	408 - Alexandru Mitrea	468 - Vasile Miheșan
351 - Mircea Dan Rus	409 - Dalia Cîmpean	469 - Viorica Mureșan
352 - Neculae Vornicescu	410 - Dorian Popa	470 - Ovidiu Furdui
353 - Neculae Vornicescu	411 - Vasile Pop	471 - Viorica Mureșan
354 - Daniela Roșca	412 - Vasile Pop	472 - Mircea Ivan
355 - Vasile Pop	413 - Vasile Pop	473 - Luminita Cotirla
356 - Alexandru Mitrea	414 - Neculae Vornicescu	474 - Daniela Roșca
357 - Dorian Popa	415 - Iuliu Crivei	475 - Luminita Cotirla
358 - Tania Lazar	416 - Mircea Ivan	476 - Luminita Cotirla
359 - Adela Novac	417 - Alexandru Mitrea	477 - Luminita Cotirla
360 - Adela Novac	418 - Ioan Rașa	478 - Luminita Cotirla
361 - Mircea Ivan	419 - Vasile Pop	479 - Ovidiu Furdui
362 - Daniela Roșca	420 - Vasile Pop	480 - Alina-Ramona Baias
363 - Ioan Rașa	421 - Mircia Gurzău	481 - Alina-Ramona Baias
364 - Alexandru Mitrea	422 - Neculae Vornicescu	482 - Alina-Ramona Baias
365 - Alexandru Mitrea	423 - Daniela Marian	483 - Ovidiu Furdui
366 - Daniela Marian	424 - Daniela Marian	484 - Alexandru Mitrea
367 - Vasile Pop	425 - Neculae Vornicescu	485 - Alexandru Mitrea

486 - Floare Tomuța	544 - Mircea Ivan	604 - Vasile Pop
487 - Daniela Inoan	545 - Vasile Cămpian	605 - Vasile Miheșan
488 - Daniela Inoan	546 - Ioan Rașa	606 - Maria Cămpian
489 - Daniela Inoan	547 - Maria Cămpian	607 - Alexandru Mitrea
490 - Floare Tomuța	548 - Maria Cămpian	608 - Alexandru Mitrea
491 - Maria Cămpian	549 - Alexandra Ciupa	609 - Alexandru Mitrea
492 - Iuliu Crivei	550 - Vasile Miheșan	610 - Vasile Miheșan
493 - Dorian Popa	551 - Viorica Mureșan	611 - Gheorghe Toader
494 - Mircea Ivan	552 - Viorica Mureșan	612 - Mircea Ivan
495 - Ioan Gavrea	553 - Teodor Potra	613 - Alexandru Mitrea
496 - Ioan Gavrea	554 - Silvia Toader	614 - Daria Dumitraș
497 - Mircea Ivan	555 - Daria Dumitraș	615 - Radu Peter
498 - Alexandru Mitrea	556 - Vasile Pop	616 - Luminita Cotirla
499 - Alexandru Mitrea	557 - Vasile Pop	617 - Mircea Ivan
500 - Vasile Miheșan	558 - Dorian Popa	618 - Vasile Miheșan
501 - Vasile Miheșan	559 - Dorian Popa	619 - Dorian Popa
502 - Adela Novac	560 - Mircia Gurzău	620 - Silvia Toader
503 - Dorian Popa	561 - Mihaela Bercheșan	621 - Alina Sîntămărian
504 - Dorian Popa	562 - Mihaela Bercheșan	622 - Alexandru Mitrea
505 - Alina Sîntămărian	563 - Mihaela Bercheșan	623 - Silvia Toader
506 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian	564 - Alina-Ramona Baias	624 - Viorica Mureșan
507 - Ovidiu Furdui & Alina Sîntămărian	565 - Alina-Ramona Baias	625 - Mircea Ivan
508 - Vasile Pop	566 - Alina-Ramona Baias	626 - Maria Cămpian
509 - Ioan Gavrea	567 - Liana Timboș	627 - Alexandru Mitrea
510 - Alexandra Ciupa	568 - Liana Timboș	628 - Dorian Popa
511 - Liana Timboș	569 - Floare Tomuța	629 - Alexandru Mitrea
512 - Liana Timboș	570 - Floare Tomuța	630 - Dorian Popa
513 - Liana Timboș	571 - Floare Tomuța	631 - Dorian Popa
514 - Vasile Pop	572 - Daniela Inoan	632 - Daniela Inoan
515 - Daniela Roșca	573 - Vasile Pop	633 - Daniela Inoan
516 - Alexandra Ciupa	574 - Vasile Pop	634 - Daniela Inoan
517 - Alexandra Ciupa	575 - Vasile Pop	635 - Daniela Inoan
518 - Mircia Gurzău	576 - Vasile Pop	636 - Vasile Miheșan
519 - Daniela Marian	577 - Vasile Pop	637 - Vasile Miheșan
520 - Daniela Marian	578 - Vasile Pop	638 - Ioan Rașa
521 - Nicolaie Lung	579 - Vasile Pop	639 - Dalia Cîmpean
522 - Alexandru Mitrea	580 - Rozica Moga	640 - Dalia Cîmpean
523 - Alexandru Mitrea	581 - Mircea Ivan	641 - Dalia Cîmpean
524 - Alexandru Mitrea	582 - Mircia Gurzău	642 - Marius Birou
525 - Mircea Dan Rus	583 - Mircea Dan Rus	643 - Marius Birou
526 - Mircea Dan Rus	584 - Mircea Dan Rus	644 - Alexandru Mitrea
527 - Mircea Dan Rus	585 - Mircea Dan Rus	645 - Vasile Miheșan
528 - Mircea Dan Rus	586 - Viorica Mureșan	646 - Alexandra Ciupa
529 - Ovidiu Furdui	587 - Bogdan Gavrea	647 - Daria Dumitraș
530 - Ovidiu Furdui	588 - Bogdan Gavrea	648 - Alina-Ramona Baias
531 - Mircea Ivan	589 - Ioan Gavrea	649 - Alina-Ramona Baias
532 - Mircea Ivan	590 - Ioan Gavrea	650 - Alina-Ramona Baias
533 - Mircea Ivan	591 - Vasile Miheșan	651 - Ioan Gavrea
534 - Mircea Ivan	592 - Adrian Holhoș	652 - Ioan Gavrea
535 - Mircea Ivan	593 - Alina Sîntămărian	653 - Ioan Gavrea
536 - Mircea Ivan	594 - Alina Sîntămărian	654 - Daniela Inoan
537 - Mircea Ivan	595 - Marius Birou	655 - Daniela Inoan
538 - Mircea Ivan	596 - Maria Cămpian	656 - Daniela Inoan
539 - Mircea Ivan	597 - Floare Tomuța	657 - Daria Dumitraș
540 - Vasile Miheșan	598 - Vasile Miheșan	658 - Dorian Popa
541 - Mircea Ivan	599 - Eugenia Duca	659 - Vasile Pop
542 - Mircea Ivan	600 - Vasile Cămpian	660 - Vasile Miheșan
543 - Mircea Ivan	601 - Daniela Roșca	661 - Eugenia Duca
	602 - Daniela Roșca	
	603 - Dorian Popa	

Răspunsuri

1: C	31: D	61: B	91: D	121: B	151: C
2: C	32: B	62: B	92: E	122: E	152: E
3: C	33: C	63: C	93: B	123: E	153: D
4: D	34: D	64: D	94: E	124: C	154: A
5: A	35: C	65: D	95: E	125: C	155: A
6: B	36: B	66: A	96: D	126: B	156: A
7: C	37: C	67: A	97: B	127: B	157: C
8: B	38: B	68: C	98: D	128: A	158: C
9: C	39: D	69: B	99: A	129: B	159: C
10: D	40: C	70: C	100: B	130: B	160: C
11: B	41: C	71: B	101: B	131: B	161: B
12: C	42: D	72: C	102: A	132: D	162: D
13: C	43: C	73: A	103: D	133: B	163: D
14: B	44: C	74: B	104: C	134: A	164: D
15: D	45: B	75: C	105: D	135: C	165: C
16: A	46: E	76: D	106: A	136: C	166: C
17: B	47: A	77: C	107: C	137: A	167: D
18: B	48: D	78: C	108: B	138: A	168: B
19: E	49: D	79: E	109: D	139: B	169: D
20: B	50: C	80: C	110: B	140: C	170: C
21: A	51: D	81: A	111: C	141: D	171: B
22: E	52: D	82: B	112: E	142: D	172: B
23: B	53: C	83: D	113: B	143: C	173: A
24: C	54: D	84: E	114: A	144: C	174: B
25: B	55: A	85: E	115: A	145: D	175: D
26: C	56: D	86: D	116: B	146: B	176: B
27: D	57: C	87: C	117: C	147: A	177: A
28: A	58: B	88: A	118: C	148: D	178: E
29: C	59: A	89: B	119: E	149: C	179: C
30: C	60: E	90: A	120: B	150: E	180: A

181: B	225: B	269: D	313: A	357: A	401: E
182: C	226: A	270: C	314: C	358: B	402: B
183: D	227: B	271: C	315: E	359: C	403: C
184: C	228: E	272: D	316: B	360: D	404: B
185: C	229: A	273: B	317: B	361: B	405: B
186: C	230: B	274: E	318: E	362: E	406: D
187: C	231: E	275: D	319: E	363: E	407: C
188: A	232: D	276: A	320: A	364: E	408: E
189: C	233: B	277: D	321: E	365: D	409: D
190: C	234: A	278: D	322: D	366: A	410: B
191: B	235: E	279: B	323: B	367: E	411: C
192: E	236: C	280: A	324: A	368: C	412: A
193: E	237: A	281: A	325: B	369: B	413: A
194: D	238: B	282: B	326: C	370: C	414: B
195: B	239: D	283: C	327: D	371: E	415: A
196: D	240: A	284: A	328: E	372: D	416: D
197: E	241: C	285: B	329: D	373: B	417: B
198: C	242: D	286: A	330: D	374: A	418: B
199: C	243: A	287: A	331: A	375: A	419: D
200: B	244: B	288: A	332: D	376: A	420: D
201: D	245: C	289: B	333: B	377: A	421: B
202: A	246: A	290: B	334: B	378: A	422: C
203: B	247: C	291: B	335: A	379: C	423: A
204: B	248: A	292: D	336: E	380: C	424: A
205: B	249: D	293: C	337: C	381: A	425: C
206: C	250: B	294: C	338: B	382: B	426: C
207: C	251: D	295: A	339: D	383: D	427: E
208: D	252: B	296: C	340: A	384: B	428: E
209: B	253: B	297: E	341: B	385: A	429: D
210: C	254: E	298: E	342: A	386: C	430: B
211: D	255: A	299: D	343: A	387: C	431: E
212: D	256: C	300: B	344: A	388: D	432: E
213: B	257: A	301: E	345: E	389: B	433: D
214: B	258: A	302: E	346: E	390: E	434: A
215: A	259: A	303: A	347: D	391: E	435: C
216: B	260: B	304: C	348: B	392: A	436: B
217: D	261: A	305: E	349: C	393: B	437: B
218: A	262: E	306: E	350: E	394: D	438: D
219: A	263: A	307: C	351: B	395: E	439: E
220: B	264: A	308: A	352: B	396: C	440: E
221: B	265: A	309: B	353: B	397: E	441: B
222: B	266: D	310: E	354: C	398: C	442: D
223: E	267: B	311: E	355: A	399: A	443: A
224: A	268: A	312: D	356: E	400: D	444: C

445: E	489: B	533: C	577: A	621: A	665: C
446: B	490: C	534: E	578: C	622: D	666: A
447: C	491: D	535: B	579: D	623: E	667: E
448: E	492: B	536: C	580: E	624: C	668: D
449: C	493: A	537: B	581: D	625: E	669: A
450: C	494: B	538: E	582: D	626: B	670: B
451: A	495: C	539:	583: D	627: D	671: A
452: A	496: B	540:	584: A	628: E	672: B
453: A	497: A	541:	585: C	629: D	673: D
454: B	498: E	542:	586: D	630: B	674: E
455: C	499: D	543:	587: D	631: E	675: A
456: A	500: C	544:	588: D	632: A	676: D
457: C	501: B	545: C	589: B	633: B	677: E
458: D	502: E	546: A	590: C	634: A	678: A
459: B	503: A	547: D	591: A	635: C	679: B
460: A	504: E	548: E	592: B	636: C	680: C
461: E	505: A	549: A	593: A	637: B	681: B
462: A	506: A	550: C	594: C	638: D	682: A
463: A	507: A	551: A	595: C	639: D	683: B
464: B	508: E	552: D	596: D	640: B	684: D
465: D	509: A	553: A	597: E	641: A	685: B
466: A	510: A	554: A	598: B	642: D	686: C
467: A	511: A	555: D	599: C	643: A	687: D
468: A	512: B	556: B	600: C	644: D	688: E
469: D	513: C	557: A	601: B	645: C	689: A
470: D	514: C	558: B	602: E	646: E	690: D
471: B	515: D	559: D	603: B	647: A	691: C
472: A	516: B	560: C	604: D	648: B	692: B
473: A	517: B	561: D	605: D	649: D	693: E
474: B	518: C	562: B	606: C	650: C	694: D
475: A	519: A	563: C	607: A	651: B	695: E
476: A	520: B	564: A	608: A	652: A	696: A
477: A	521: D	565: B	609: C	653: B	697: B
478: A	522: B	566: B	610: B	654: C	698: A
479: C	523: C	567: A	611: E	655: A	699: D
480: A	524: D	568: B	612: A	656: D	700: A
481: C	525: B	569: D	613: D	657: B	701: B
482: D	526: D	570: B	614: C	658: D	702: D
483: B	527: A	571: D	615: B	659: E	703: E
484: A	528: C	572: A	616: A	660: D	704: C
485: C	529: C	573: A	617: A	661: B	705: E
486: B	530: C	574: A	618: E	662: A	706: C
487: E	531: E	575: B	619: B	663: B	707: D
488: A	532: E	576: E	620: C	664: B	708: E

709: A	753: C	797: C	841: A	885: E	929: C
710: E	754: D	798: E	842: A	886: E	930: A
711: A	755: E	799: D	843: B	887: A	931: A
712: C	756: B	800: E	844: E	888: A	932: A
713: A	757: C	801: A	845: E	889: A	933: A
714: C	758: E	802: B	846: B	890: C	934: A
715: B	759: D	803: C	847: B	891: A	935: E
716: C	760: E	804: D	848: A	892: B	936: A
717: D	761: A	805: C	849: A	893: A	937: A
718: B	762: D	806: D	850: A	894: A	938: C
719: D	763: C	807: A	851: A	895: A	939: A
720: B	764: D	808: D	852: D	896: B	940: C
721: C	765: A	809: C	853: D	897: C	941: A
722: E	766: B	810: D	854: E	898: A	942: A
723: B	767: C	811: C	855: C	899: B	943: A
724: A	768: D	812: E	856: A	900: A	944: A
725: C	769: E	813: B	857: D	901: B	945: A
726: B	770: B	814: C	858: C	902: A	946: D
727: A	771: C	815: D	859: A	903: A	947: A
728: E	772: E	816: A	860: C	904: E	948: E
729: D	773: B	817: D	861: A	905: C	949: E
730: E	774: E	818: E	862: C	906: D	950: A
731: A	775: A	819: B	863: D	907: A	951: A
732: E	776: B	820: A	864: A	908: A	952: A
733: A	777: A	821: E	865: B	909: A	953: A
734: B	778: B	822: C	866: A	910: A	954: A
735: C	779: A	823: D	867: D	911: A	955: A
736: D	780: C	824: E	868: B	912: A	956: C
737: B	781: A	825: A	869: C	913: B	957: A
738: A	782: A	826: C	870: E	914: A	958: A
739: C	783: B	827: D	871: D	915: C	959: A
740: B	784: A	828: B	872: E	916: A	960: A
741: C	785: E	829: E	873: E	917: C	961: A
742: D	786: A	830: E	874: A	918: A	962: B
743: E	787: B	831: E	875: E	919: B	963: B
744: D	788: D	832: A	876: B	920: A	964: A
745: E	789: E	833: D	877: A	921: B	965: A
746: D	790: B	834: C	878: A	922: B	966: A
747: C	791: C	835: E	879: D	923: D	967: A
748: B	792: B	836: B	880: A	924: A	968: A
749: D	793: E	837: B	881: A	925: A	969: A
750: C	794: A	838: C	882: A	926: A	970: D
751: A	795: B	839: D	883: A	927: A	971: E
752: D	796: E	840: A	884: C	928: B	972: B

973: C	977: A	981: A	985: A	989: A
974: A	978: A	982: A	986: A	990: A
975: E	979: D	983: A	987: A	
976: D	980: A	984: D	988: A	991: A

- 2** $\lg 2^x = \lg(2^x + x - 1)$.
- 5** $f(1) = 0 \Rightarrow a + b = -2, f'(1) = 0 \Rightarrow 99a + b = -100 \Rightarrow a = -1; b = -1$.
- 6** $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ este rădăcina polinomului $X^2 + X + 1$ și $\omega^3 = 1$. Din $f(\omega) = 0 \Rightarrow a = -1; b = -1$.
- 7** $f = (X - 1)^2(X + 1) \cdot q + X^2 + X + 1$. Avem că $f(1) = 3, f(-1) = 1 \Rightarrow a + b = 1$ iar din $f'(1) = 3 \Rightarrow 99a + b = -97$, deci $a = -1; b = 2$.
- 15** Coordonatele vârfului unei parabole sunt $x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{1-m}{m}, y_V = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{m-1}{m}$. Se observă relația $y_V = -x_V$.
- 23** Ecuație echivalentă cu $9^{x-1} + 7 = 4(3^{x-1} + 1), \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 2$.
- 24** $1+x > 0, x \neq 0, 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1 > 0$. Ecuația se mai scrie $2x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = (1+x)^3$.
- 26** Din $(a + b + c)^2 \geq 0$ rezultă $ab + bc + ac \geq -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$. Minimul se atinge pentru $a + b + c = 0$, de exemplu, $a = 1/\sqrt{2}, b = -1/\sqrt{2}, c = 0$.
- 37** Ambele polinoame se divid cu $x^2 + x + 1$, iar primul nu se divide cu $x - 1$.
- 49** $\det(A) = V(1, -i, -1, i)$ și $A^4 = 16I_4$.
- 55** Se calculează mai întâi AA^t iar apoi determinantul acestei matrici,
 $x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -2m, x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -3n, x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 2m^2$.
- 65** Se obține ecuația $2(x^3 + 1) = 0$.
- 81** Se verifică ușor faptul ca $A \in P_1$ și $B \in P_1$. Pe de altă parte, $A \in P_2$ și $B \in P_2$ este echivalent cu

$$\begin{cases} 5 \cdot m + 2 \cdot n = 8 \\ m = -2. \end{cases}$$

Prin urmare, $m = -2$ și $n = 9$ este soluția.

82 Se observă că $C \in P_1$. Punem condiția ca $C \in P_2$ și obținem relația $10m + 3n = 19$. Pentru că parabolele nu sunt tangente, ecuația

$$(m - 1)x^2 + (4m + n - 5)x + 5m + 2n - 4 = x^2 + 5x + 4$$

este de gradul I și atunci $m = 2$. Din relația $10m + 3n = 19$, rezultă $n = -\frac{1}{3}$. Prin urmare, soluția este $m = 2$ și $n = -\frac{1}{3}$.

83 Din faptul că $T \in P_2$ rezultă că $m = -2$. Dacă parabolele sunt tangente, ecuația $-4x^2 + (n - 17)x + 2n - 18 = 0$ are rădăcină dublă și din condiția $\Delta = 0$ obținem $n = 1$. Soluția este $m = -2$ și $n = 1$.

100 Notăm $y = 2^x + 2^{-x}$. Ecuația devine $8y^2 - 54y + 85 = 0$, cu soluțiile $y_1 = \frac{17}{4}$, $y_2 = \frac{5}{2}$. Soluțiile ecuației date sunt $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$, $x_4 = -2$.

105 Pentru ca $f(x)$ să fie surjectivă trebuie ca $m > 0$ și $2m - 1 \leq 1 + m \Rightarrow m \in (0, 2]$.

106 Se obține ecuația $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = a + \frac{1}{2}$.

163 Suma coeficienților unui polinom este valoarea sa pentru $x = 1$.

178 Fie a, b, c, d elementele matricii X . Se consideră situațiile:
 $a + d = \text{Tr}(X) \neq 2$ și $a + d = 2$.

179 $\text{rang}(A \cdot B) \leq \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$.

216 Se scriu toți logaritmi în baza x .

228 Avem: $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$, $\alpha^3 = 1$, $\alpha^2 = -\alpha - 1$, $\alpha^2 = \frac{1}{\alpha}$.
Deducem: $\det(I_2 + \alpha A + \alpha^2 A^2) = \det(I_2 + \alpha A - \alpha A^2 - A^2)$
 $= \det((I_2 - A)(I_2 + A) + \alpha A(I_2 - A)) = \det((I_2 - A)(I_2 + (\alpha + 1)A))$
 $= \det(I_2 - A) \cdot \det(I_2 - \alpha^2 A) = \det(I_2 - A) \cdot \det(\frac{\alpha I_2 - A}{\alpha}) = 1$.
(Un exemplu de astfel de matrice $A \neq O_2$ este $A = (1 + \alpha)I_2$.)

229 Avem $A^2 - (a + d)A + I_2 \det(A) = O_2$. Deducem: $A^n = O_2 \Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow A^n = (a + d)^{n-1}A \Rightarrow a + d = 0 \Rightarrow A^2 = O_2$.

233 $f : (-1, 1) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = f^{-1}(x) = \frac{1-x}{1+x}$ izomorfism de la $((-1, 1), *)$ la $((0, \infty), \cdot)$.
 $\prod_{k=2}^n f(1/k) = \frac{2}{n+n^2}$; $f^{-1}(\frac{2}{n+n^2}) = \frac{-2+n+n^2}{2+n+n^2}$.

236 Este suficient ca dintre cele două submulțimi să se precizeze doar aceea care îl conține pe 8 (cealaltă submulțime va fi complementară). Această submulțime se poate obține reunind cu $\{8\}$ oricare submulțime a mulțimii $A' = \{1, 2, \dots, 7\}$ însă exceptând-o pe A' (în acest caz, ar rezulta că submulțimea obținută este chiar A , deci cea de a doua submulțime ar fi vidă). Sunt $2^7 - 1$ submulțimi ale mulțimii A' , excluzând-o pe ea însăși.

237 Și în acest caz, este suficient să precizăm doar una dintre submulțimi (spre exemplu, pe aceea care îl conține pe 8). Pentru a completa submulțimea, mai rămân de ales oricare 3 elemente din $A' = \{1, 2, \dots, 7\}$.

239 Este suficient să se elimine din cele 2^8 submulțimi ale lui A pe cele care nu conțin niciun număr impar (în număr de 2^4).

240 Similar cu problema anterioară, se elimină din cele 2^8 submulțimi ale lui A pe cele care nu conțin numere pare (2^4 submulțimi) și pe cele care nu conțin numere impare (tot 2^4). Deoarece mulțimea vidă (este singura submulțime care) se elimină de două ori, răspunsul trebuie ajustat adunând înapoi 1. Rezultă răspunsul $2^8 - 2^4 - 2^4 + 1$.

241 Orice distribuție a bilelor în cutii este o funcție de la mulțimea bilelor la mulțimea cutiilor.

242 Similar cu punctul anterior, cu deosebirea că se mai introduce o cutie pentru bilele care ar putea rămâne nedistribuite.

252 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{x_n} > 0$, deci șirul este crescător. Rezultă că șirul are o limită L , finită sau infinită. Dacă presupunem că L este finită, avem $L = L + 2/L$, deci $2/L = 0$, fals. Prin urmare $L = \infty$. Conform Lemei Stolz-Cesaro avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2 - x_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 4/x_n^2 = 4$. Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = 2$.

254 $f(x_n) := x_{n+1} - x_n = e^{x_n} - x_n - 1 \geq 0, \forall n \geq 0$, deci șirul este crescător.

255 Cum șirul este crescător rezultă că există $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \overline{\mathbb{R}}$. Dacă presupunem că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, x \in \mathbb{R}$, din recurență obținem $x = e^x - 1$, de unde $x = 0$ contradicție cu $x_0 > 0$ și monotonia lui $(x_n)_{n \geq 0}$. Deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

256 Pentru $x_0 \leq 0$, șirul este crescător și mărginit superior de 0.

257 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}}$ și se aplică Stolz-Cesaro.

258 $x_{100} = 1 \Rightarrow x_{99} \in \{0, 1\}$. $x_{99} = 0$ nu convine deoarece $x_{98}^2 - x_{98} + 1 = 0!!!$, etc.

259 $x_{n+1} - x_n = (x_n - 1)^2, n \geq 1$ deci șirul este nedescrescător. Dacă presupunem că există $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l, l \in \mathbb{R}$, obținem $l = l^2 - l + 1$, deci $l = 1$. Dacă $x_1 < 0$ sau $x_1 > 1$ obținem $x_n > 1, \forall n \geq 1$. Dacă $x_1 \in [0, 1]$, obținem $x_n \in [0, 1], \forall n \geq 1$. Deci șirul este convergent pentru $x_1 \in [0, 1]$ și are limita $l = 1$.

260 $x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1). \prod_{k=1}^n x_k = \frac{x_{n+1}-1}{x_1-1}$

261 $x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1). \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{x_{n+1}-1}; \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} = \frac{1}{x_1-1} - \frac{1}{x_{n+1}-1}$

262 Mai general, fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție strict crescătoare și strict convexă astfel încât există $a < b$ pentru care $f(a) = a, f(b) = b$. Atunci șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin relația de recurență $x_{n+1} = f(x_n)$ converge spre a dacă și numai dacă $x_0 \in (-\infty, b)$.

265 Vezi problema 539.

268 Termenul general al șirului se poate scrie sub forma $n e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}-\ln n)} \left(e^{\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{2n}} - 2 \right)$.

276 $\frac{1}{(k+1)\sqrt{k+k}\sqrt{k+1}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$.

277 $\frac{2^{k-1}}{(1+2^k)(1+2^{k+1})} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+2^k} - \frac{1}{1+2^{k+1}} \right)$.

281 Se observă că $k! \cdot (k^2 + 1) = (k + 2)! - 3(k + 1)! + 2k!$.

284 Se scade $2n\pi$ la argumentul funcției cosinus.

286 Se pot folosi, de exemplu, inegalitățile $n \leq a_n \leq n + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

287 $n \leq a_n \leq n + 1$ și Stolz-Cesaro

288 Se aplică Problema 539.

294 $p_n = \frac{\sin 2^n x}{2^n \sin x}$.

302
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(a^{\frac{n}{1}} + a^{\frac{n}{2}} + \dots + a^{\frac{n}{n}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \ln a + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a^{-\frac{n}{2}} + \dots + a^{-n+1})}{n} = \ln a.$$

303 Se folosește $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. Aceeași rezolvare dacă în loc de $(\sin n)$ se consideră un șir mărginit oarecare.

307 $x_n = [n \lg_3 2 + \lg_3 2008]$.

313 $x_{2n} = y_n + \frac{1}{4}x_n$.

318 Se scrie:

$$x - \overbrace{\sin(\sin(\dots(\sin x)\dots))}^{\text{de } n \text{ ori sin}} = (x - \sin x) + \left(\frac{\overbrace{\sin x - \sin(\sin(\dots(\sin x)\dots))}^{\text{de } n \text{ ori sin}}}{(\sin x)^3} \right) \cdot (\sin x)^3.$$

$$L_n = \frac{1}{6} + L_{n-1}; L_n = \frac{n}{6}.$$

331 Se pune $t = \frac{1}{x}$ și apoi se aplică regula lui L'Hospital:

$$\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} (1+t)^{\frac{1}{t}} \left[\frac{1}{t(t+1)} - \frac{\ln(1+t)}{t^2} \right] = e \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{t - (t+1)\ln(t+1)}{t^3 + t^2} = -\frac{e}{2}.$$

334 Se aplică regula lui L'Hospital de două ori.

342 Se folosește limita $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = 1$.

344 $|1/a| < 1$ și $(1/a)^n \rightarrow 0$.

357 Se scrie ecuația sub forma $x e^{-\frac{2}{x-1}} = m$ și se aplică șirul lui Rolle.

365 Trebuie ca derivata funcției f să aibă două rădăcini strict pozitive.

369 Pentru $b \neq 0$ se consideră $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} b - \operatorname{arctg} \frac{x+b}{1-xb}$, $x \neq 1/b$. Se obține $f'(x) = 0$.

376 f surjectiva $\Leftrightarrow f([-2, 1]) = M$, deci $M = [0, 4]$, studiind graficul funcției.

378 Avem $g'(x) = f'(f(f(x))) \cdot f'(f(x)) \cdot f'(x)$.

$$\boxed{381} \quad f'(0) = \sqrt[5]{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3 - x + \sin x}{x^5}}.$$

395 Se demonstrează imediat și elementar că

$$(x^m \log x)^{(k+m)} = m! (-1)^{k-1} (k-1)! x^{-k}, \quad m = 0, 1, \dots, k = 1, 2, \dots$$

424 $f'(x) = 0$ deci f este constantă pe fiecare din intervalele din domeniu.

426 Tinând cont de domeniile funcțiilor care intervin în definiția funcției f avem: $|\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1$ și $|x| \in \mathbb{R}$ ceea ce este echivalent cu $x \in \mathbb{R}$.

427 Calculăm derivata funcției f și obținem

$$f'(x) := \begin{cases} \frac{-2}{1+x^2}, & x \in (-\infty, -1); \\ 0, & x \in (-1, 0) \cup (1, \infty); \\ \frac{2}{1+x^2}, & x \in (0, 1). \end{cases}$$

Prin urmare, pe intervalul $[1, \infty)$ funcția este constantă, deci $f(\pi) = f(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{2}$.

428 $f'(x) < 0$ pentru orice $x \in (-\infty, -1)$.

446 Notăție $t = \sqrt{\frac{x}{x+3}}$.

449 $x - 1 = t$; se obține $\int_{-1}^1 f(t) dt$ unde $f(t) = \frac{2t^3+3t}{(t^2+4)^n}$ este funcție impară.

450

$$\int_0^1 \frac{2}{(1+x^2)^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^2+1-x^2}{(1+x^2)^2} dx.$$

451 Facem schimbarea de variabilă $x = 3 - t$.

452 Schimbare de variabilă $\sqrt{x+1} = t$.

454 $P(n) = n^5 - (n-1)^5, n \geq 2$.

475 Se integrează prin părți de două ori.

476 Se face schimbarea de variabilă $y = \arcsin \sqrt{x}$ în a doua integrală.

477 Prin schimbarea de variabilă $x = \frac{\pi}{4} - y$, integrala se reduce la $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 x dx$.

$$\boxed{478} \quad \frac{1}{x^2+x+1} = \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}.$$

480 Se folosește substituția $u = \operatorname{tg} x$.

482 Se folosește relația $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ și se aplică problema 480.

484 $L(0) = 1$ și $L(a) = \frac{1}{a}(e^a - 1)$ pentru $a > 0$; $e^2 \equiv 7.29 \dots$

485 Limita este $\int_0^1 x^2 \arcsin x \, dx$.

486 Se integrează prin părți, după ce s-a utilizat formula $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$.

489 Avem $f(a) = \begin{cases} \frac{1}{2} - a, & a \leq 0, \\ \frac{1}{2} - a + a^2, & 0 < a < 1, \\ -\frac{1}{2} + a, & a \geq 1. \end{cases}$

493 $\arcsin(\sin x) = x$, dacă $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin(\sin x) = \pi - x$, dacă $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$.

505 Avem

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{x^3 - x - 2}{x^3 e^x} \, dx &= \int_1^2 \frac{1}{e^x} \, dx - \int_1^2 \frac{1}{x^2 e^x} \, dx - \int_1^2 \frac{2}{x^3 e^x} \, dx = \\ &= -\frac{1}{e^x} \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x^2 e^x} \, dx + \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2}\right)' \frac{1}{e^x} \, dx. \end{aligned}$$

507 $I + J = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$ și $J - I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx = \ln 2$.

509 $a_{n+1} - a_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} e^{-x^2} \, dx = (a_{n+1} - a_n)e^{-c^2}$.

510 Dacă $G(x) = \int_0^x e^{t^3} \, dt$, $G'(x) = e^{x^3}$, $F(x^2) = G(x^2)$, $F'(x) = e^{x^6} 2x$.

511 $f_1(x) = \int_0^{x^2} t \cdot e^t \, dt = e^t(t-1) \Big|_0^{x^2} = e^{x^2}(x^2-1) + 1$.

512 $f'_n(x) = (F(x^2) - F(0))' = 2x \cdot F'(x^2) = 2x(x^2)^n e^{x^2} = 2x^{2n+1} e^{x^2}$, pentru $n = 1$ se obține $f'_1(1) = 2e$.

513 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n \cdot e^t \, dt \leq \lim_{n \rightarrow \infty} e \int_0^1 t^n \, dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{n+1} = 0$.

515 $nx - 1 \leq [nx] \leq nx$

518 Schimbare de variabilă $x = \pi - t$.

520 $I = \int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi x f(\sin x) \, dx$. Facem schimbarea de variabilă $x = \pi - y$ în a doua integrală și obținem $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - y) f(\sin y) \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x) \, dx$. Pentru calcularea integralei I_1 aplicăm rezultatul de la întrebarea de mai sus și avem $I_1 = \int_0^\pi \frac{x \sin x \, dx}{1 + \sin^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \, dx}{1 + \sin^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \, dx}{2 - \cos^2 x} = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x \, dx}{\cos^2 x - 2} = \pi \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\cos x - \sqrt{2}}{\cos x + \sqrt{2}} \right| \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln(3 + 2\sqrt{2})$.

528 Deoarece $f(0) = -1$, rezultă că $g(-1) = 0$ și, deci, $g'(-1) = \frac{1}{f'(0)}$. Prin schimbarea de variabilă $x = f(y)$, se obține $\int_{-1}^{1-1/e} g(x) \, dx = \int_0^1 y f'(y) \, dy = y f(y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(y) \, dy$.

529 Fie $I_n = \int_0^1 \sqrt[n]{x^n + (1-x)^n} dx$. Avem că

$$I_n \leq \int_0^{1/2} \sqrt[n]{(1-x)^n + (1-x)^n} dx + \int_{1/2}^1 \sqrt[n]{x^n + x^n} dx = \frac{3}{4} \sqrt[n]{2}.$$

$$I_n \geq \int_0^{1/2} (1-x) dx + \int_{1/2}^1 x dx = \frac{3}{4}.$$

530

$$\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{nx}) dx - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(e^{nx}) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1 + e^{-nx}) dx \leq \frac{\ln 2}{n}.$$

533 $x = e^u$, $\int_{t \ln 2}^{t \ln 3} \frac{e^{2u}}{u} du$; se aplică teorema de medie sau inegalități pentru e^{2u} ;

$$\int_{2^t}^{3^t} x \frac{x-1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x-1} dx = c \frac{c-1}{\ln c} \cdot \int_{2^t}^{3^t} \frac{1}{x-1} dx \sim \frac{c-1}{\ln c} \ln \left(\frac{3^t-1}{2^t-1} \right) \sim 1 \cdot \ln \left(\frac{\ln 3}{\ln 2} \right)$$

Mai general (Ivan 2004): Fie, de exemplu, $a, b > 1$ și fie f o funcție continuă pe o mulțime de forma $(1 - \varepsilon, 1) \cup (1, 1 + \varepsilon)$ astfel încât să existe limita $\lim_{c \rightarrow 1} (c-1)f(c)$. Conform primei

teoreme de medie a calculului integral există c în intervalul de capete a^t și b^t astfel ca

$$\int_{a^t}^{b^t} f(x) dx = \int_{a^t}^{b^t} (x-1)f(x) \cdot \frac{1}{x-1} dx = (c-1)f(c) \cdot \int_{a^t}^{b^t} \frac{1}{x-1} dx = (c-1)f(c) \cdot \ln \left(\frac{b^t-1}{a^t-1} \right),$$

$$\text{deci } \lim_{t \rightarrow 0} \int_{a^t}^{b^t} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow 1} (c-1)f(c) \cdot \ln \left(\frac{\ln b}{\ln a} \right).$$

534 Se folosește substituția $f(x) = x + e^x = y$, $x = f^{-1}(y)$ și problema 541.

535 Schimbare de variabilă $x = 3/t$.

536 Schimbare de variabilă $x = (2-t)/(1+2t)$.

537 Se folosește egalitatea $\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, $x > 0$.

538 Se folosește periodicitatea funcției de integrat și egalitatea $\int_0^\pi \frac{1}{1+n^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{\sqrt{1+n^2}}$.

539 Mai general, fie $x_n, a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$, astfel ca $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_n} = \infty$ și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{a_n} < 1.$$

Să demonstrăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Fie $0 < q < 1$ și $p \in \mathbb{N}^*$ astfel ca

$$\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{a_n} < q, \quad n \geq p.$$

Rezultă

$$x_{n+1} < x_p q^{\frac{1}{a_p} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad n \geq p,$$

de unde $x_n \rightarrow 0$.

540 $x = a + b - t$.

$$\begin{aligned} \text{543} \quad \int_0^1 f(nx) dx &= \frac{1}{n} \int_0^n f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{T\lfloor \frac{n}{T} \rfloor + T\{\frac{n}{T}\}} f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{T\lfloor \frac{n}{T} \rfloor} f(x) dx \\ &+ \frac{1}{n} \int_{T\lfloor \frac{n}{T} \rfloor}^{T\lfloor \frac{n}{T} \rfloor + T\{\frac{n}{T}\}} f(x) dx = \frac{\lfloor \frac{n}{T} \rfloor}{n} \int_0^T f(x) dx + \frac{1}{n} \int_0^{T\{\frac{n}{T}\}} f(x) dx \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx + 0. \end{aligned}$$

561 Panta dreptei AB este $m_{AB} = 1$ iar panta perpendiculară pe ea, este $m = -1$. Ecuația perpendiculară, scrisă prin punctul C , este: $x + y - 8 = 0$. Ecuația dreptei AB este $x - y + 1 = 0$. Intersectând cele două drepte, obținem proiecția punctului C pe dreapta AB , punctul $P(\frac{7}{2}, \frac{15}{4})$. Urmează că simetricul punctului C față de dreapta AB este $C'(1, 7)$.

562 Suma $DM + MC$ este minimă dacă punctul M este la intersecția dreptelor DC' și AB . Ecuația dreptei DC' este $x = 1$, prin urmare, rezultă $M(1, 2)$.

563 Fie punctul $M(x, x + 1) \in AB$. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = DM^2 + MC^2$, adică $f(x) = (x - 1)^2 + (x + 1 - 1)^2 + (6 - x)^2 + (2 - x - 1)^2$, sau $f(x) = 4 \cdot x^2 - 16 \cdot x + 38$. Funcția f își atinge minimumul pentru $x = 2$. Obținem $M(2, 3)$.

567 $A(-4, 1) \notin d: 3x - y - 2 = 0$, $d(A, BD) = \frac{3\sqrt{10}}{2} \Rightarrow BD = 3\sqrt{10} \Rightarrow l = 3\sqrt{5} \Rightarrow \mathcal{A} = 45$.

568 C este simetricul punctului A față de d , $AC \perp d \Rightarrow AC: x + 3y + 1 = 0$, $AC \cap d = \{M(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\}$, M este mijlocul $[AC] \Rightarrow C(5, -2)$.

$$\text{577} \quad \overrightarrow{MG} = \frac{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}}{3} = \vec{0} \Rightarrow M = G.$$

$$\text{578} \quad \overrightarrow{NI} = \frac{a\overrightarrow{NA} + b\overrightarrow{NB} + c\overrightarrow{NC}}{a+b+c} = \vec{0} \Rightarrow N = I.$$

$$\text{579} \quad \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Rightarrow P = O.$$

$$\text{607} \quad \sin x + \cos x = \frac{1}{2} \text{ sau } \cos x - \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\text{608} \quad (\sin x)^2 (\sin 2x)^2 \dots (\sin nx)^2 = 1; (\sin x)^2 = 1, (\sin 2x)^2 = 1$$

$$\text{614} \quad \text{Ecuația se scrie } \sin(x + \frac{\pi}{6}) = 1$$

616 Se verifică $\cos x \neq 0$. Prin împărțirea cu $\cos^2 x$ în ambii membri, se obține o ecuație de gradul al doilea în $t = \tan x$.

$$\text{647} \quad E = \cos 4\alpha + i \sin 4\alpha, \quad \sin 4\alpha = 0 \Rightarrow 4\alpha = k\pi.$$

650 Se folosește reprezentarea geometrică a numerelor complexe.

656 $\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$, $k = 1, \dots, n$ sunt rădăcinile complexe ale ecuației $z^n - 1 = 0$; se folosesc relațiile lui Viète.

$$\text{657} \quad \sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right); \quad -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

663 Se rezolvă ecuația $f(x) = 8$.

$$\text{665} \quad 1 + a + a^2 = 0, 1 + a = -a^2 \text{ și analog } 1 + \bar{a} = -\bar{a}^2.$$

666 Determinantul sistemului este diferit de zero.

667 Se pune condiția ca determinantul sistemului și determinantul caracteristic al sistemului să fie egale cu zero.

668 $(x * y) * z = x * (y * z) \iff (a^2 - a)(x - z) = 0, \forall x, y, z \in \mathbb{R}.$

669 $x * y \in [0, 1], \forall x, y \in [0, 1] \iff 0 * 0 \in [0, 1], 0 * 1 \in [0, 1], 1 * 1 \in [0, 1],$ de unde $0 \leq a \leq 1$ și $0 \leq 2a - 1 \leq 1.$

670 Avem două legi asociative, pentru $a \in \{0, 1\}$:
 $a = 0, x * y = -xy, e = -1, x' = -1/x,$ deci $b = 0$;
 $a = 1, x * y = x + y - xy, e = 0, x' = x/(x - 1),$ deci $b = 1.$

672 Avem $\det(X) = 0,$ deci $X^2 = (\text{tr}(X)) X.$

673 $P(1) = 0$ și $P'(1) = 0.$

675 $\int_0^{2\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \arcsin(\sin(2x)) dx = 0.$

676 $\int_{-1}^1 \frac{2x + 2}{x^2 + 1} dx = \int_{-1}^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx + 2 \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx.$

677 $I_n = \int_0^1 \arctg x \cdot \cos(nx) dx = \int_0^1 \arctg x \cdot \left(\frac{\sin(nx)}{n}\right)' dx$ apoi se integrează prin părți.

678 Se studiază derivabilitatea în -2 și $2.$

679 -2 și 2 sunt puncte de întoarcere, iar 0 este punct de maxim local.

680 Asimptotele sunt $y = x$ și $y = -x.$

683 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$

684 $\left(\frac{(3+n)!}{n!n^3}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n \rightarrow e^1 e^2 e^3 = e^6.$

685 Folosim $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1.$ Avem:

$\lim_{x \rightarrow +0} ((1+x)^x - 1)^x = \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{e^{x \ln(1+x)} - 1}{x \ln(1+x)}\right)^x x^x \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^x x^x = 1.$

690 $f(x) = -\cos^2 x + 4 \cos x + 1 = 5 - (2 - \cos x)^2, \cos x \in [-1, 1].$

691 $\max f(x) = 4, \min f(x) = -4,$ deci $m \in [-4, 4].$

864 Pentru $a, b \geq 1, x \geq 0,$ avem

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{b-1} - x^{a-1}}{(x^a + 1)(x^b + 1)} dx &= \int \frac{x^{b-1} + x^{a+b-1} - x^{a+b-1} - x^{a-1}}{(x^a + 1)(x^b + 1)} dx \\ &= \int \left(\frac{x^{b-1}}{x^b + 1} - \frac{x^{a-1}}{x^a + 1}\right) dx = \ln \frac{(x^b + 1)^{1/b}}{(x^a + 1)^{1/a}} + C. \end{aligned}$$

865 Pentru $a \in \mathbb{R}$ și $b \in (0, \infty),$ avem $\int_{\frac{1}{b}}^b \frac{1}{(x^2 + 1)(x^a + 1)} dx \stackrel{x=1/y}{=} \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{b}}^b \frac{1}{x^2 + 1} dx.$

939 $V_{f_m}(x_m, y_m)$, unde $x_m = \frac{2m+1}{2m} = 1 + \frac{1}{2m}$, iar $y_m = f_m(x_m) = -\frac{1}{4m}$. Atunci $x_m - 1 = (-2)y_m$, deci $x_m + 2y_m = 1$.

943 Schimbare de variabilă / integrare prin părți / calcul separat al integralelor, sau direct:

$$\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x \, dx}_{t=\operatorname{tg} x, x=\operatorname{arctg} t} + \int_0^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} x \, dx = \int_0^{\sqrt{3}} (t \cdot \operatorname{arctg}' t + \operatorname{arctg} t) \, dt = t \cdot \operatorname{arctg} t \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ = \sqrt{3} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

949 $\int_0^{2\sqrt{2}} f(x) \, dx = \int_0^{2\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1} \, dx$. Facem schimbarea de variabilă

$$y = \sqrt{1+x^2}, \quad y^2 = 1+x^2, \quad y \, dy = x \, dx,$$

astfel că $\int_0^{2\sqrt{2}} f(x) \, dx = \int_1^3 \frac{y}{y+1} \, dy = (y - \ln(y+1)) \Big|_1^3 = 2 - \ln 2$.